



19634/B

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28764213>



SYSTEMA
AEGRITVDINVM,

CONDITVM

PER

NOSOLOGIAM,
PATHOLOGIAM,

TAM

GENERALEM, QVAM SPECIALEM,

ET

SYMPTOMATOLOGIAM,
AETIOLOGIAE

SVPERSTRVCTAS

A

CHRIST. FRID. DANIEL.

Quod ipsa natura dictauit systema non illico turbandum, si
qua forsan parte ob cognitionis humanae defectum hiat.

GAVBIVS.

LIPSIAE,

SVMTV ADAM. FRID. BOEHMII.

1781.

M. J. Langi Langcardi

AMSTERDAM

ANATOMICAL

1672

1672

1672

1672



1672

1672

1672

1672

1672

1672

1672

1672

1672

1672



PRAEFATIO.

Dignitatem medicinae cum eius indole et medici officiis comparaturus, demum consilium cepi, experiundi, quid valeant ferre humeri, atque in proprium vsum componendi, imo edendi, aegritudinum systema.

Etenim medicinam scientiam facile vtilissimam existere posse, si rite exculta sit, quis neget? Est enim, quae aegrotos, per vitam dissolutam ab aeterna salute suscipiunda adhuc alienos, vel per eximias animi corporisue, aut vtriusque, dotes, patriae, cognatis, carissimos, si per vim aegritudinis medico, etiam summo, homini tamen, licet, seruet, donec vita, egregie mutata, indeque enata recte factorum conscientia, vtae aeternae viuendae desiderium in ipso aegrotto excitet, seniumque sensim et laudabiliter

a 2

super-

superueniens faciat, vt patria, cognatique, ciuis atque amici mortem non tam lugeant, quam gratulentur: vel, nisi feruare hominem liceat, tamen, vt, quidquid superest vitae viuendae, minori viuat molestia, efficiat.

Quis igitur est, qui neget, patriae, cognatis, aegrotis demum iplis, carum atque gratum, acceptum, se reddere medicum, qui, aegritudinum naturam bene perspicuens, viriumque vitae egregia conamina probe dirigens, aegritudinibus ita prospicit, vt, tum multorum, tum paucorum, hominum aegritudines tam auertendo futuras, quam iam praesentes congrue curando, vitae hominum conseruatoris, et, vel foecunda subiecta, vel prolem futuram, conseruaturus, numeri maioris ciuium auctoris laudem mereri, nec parum sibi iure vindicare possit gloriae. Quis e contrario vituperatione indignum iudicet eum, qui aegritudinum naturam ignorans, nec virium vitae conamina attendens et dirigens, prorsus empiricam medicinam faciendo, impune nocet?

Nonne igitur erat, quod medicinam facere incipiens, dicto HIPPOCRATIS: *Vide, vt, nisi prosis, saltem ne obsis*, faciles praeberem aures, audirem etiam GALENUM: *morbi cognitionem, inquentem, viae esse principium, ad unumquemque morbum inueniendi remedia?* Erat omnino. Quare, praecipuum pon-

nendum esse laborem in aegritudinum semiotice diagnostica, bonis fundamentis innitente, et sic adumbrata, ut affinitas et discrepantia aegritudinum leui constet negotio, facile intellexi. SWIETENII enim effatum, „quidquid medicina frugi habeat, esse, quod chemiae affinis sit:“, equidem sic muto, ut eloquar, medicinam tum demum esse commendandam, quum, chemiae instar, subiecti, adeoque praecipue aegritudinum, affinitatem et discrepantiam exponit et sistit, cuiusmodi labori superstructum aegritudinum systema, quod citra signa diagnostica, quibus medicinae utilitas praecipua continetur, componi nequit, multa non indiget commendatione.

Neque enim aegritudinum doctrinam absolui earum aetiologia, non raro arbitraria, neque comprehendendi simplici aegritudinum historia, quum earum decursus si vel adumbrari possit, ob inconstantiam certe (id quod librorum, epidemias potissimum describentium, lectio testatur) absque utilitate vera adumbretur, non est, quod multis comprobeatur. Totam enim medicinam niti congruis et fideliter conquisitis aegritudinum characteribus et congrua earundem ordinatione, testantur summi omnis aetatis medici ^a).

Quae-

a) „Ex his primum est, secundum legem nomina diuidere, ut nulli morbo idem nomen sit, deinde autem se-

cun-

Quaeritur autem, quomodo aegritudinum systema stabiliendum sit? igitur

a. Natura sanitatis et aegritudinis scrutanda, ita certe, vt, vtramque sibi oppositam esse statuens, vires praeternaturaliter constitutas nemo esse easdem putet, atque om-

cundum vniuscuiusque naturam ideas separatim considerare., HIPPOCRATES de nat. hum.

„Perpicuum est, tum aegroti naturam esse considerandam, tum cuiusque hominis propriam esse curationem, tum supra haec illud tertium, nempe quoniam cuiusque naturae proprietas ineffabilis est, nec exactissima scientia comprehensibilis, *hunc esse optimum cuiusque particularis aegritudinis medicum, qui iam methodum quamdam sibi comparauit, ex qua et dignoscere naturas possit, et coniectura consequi, quae sint cuique propria remedia.* „ GALENVS.

„Nisi in ordines redigantur, et velut castrorum acies distribuuntur in suas classes, ordines, genera et species, omnia fluctuari, necesse est. „ CAESALPINVS.

„Ex his deduci iure poterit, magnae vtilitatis fore, vt morbi in tot species diuidantur, quot sunt *morbi principales aut caussae vehementes*, a quibus fouentur. Nam si nos haberemus exactam et fidelem historiam signorum prognosticorum et diagnosticorum. methodi curatiuae et praeceptorum generalium, morbi numquam sub alia persona nos decipere possent. Non institutis vero talibus diuisionibus et multi errores suboriuntur, et magna confusio in historia morborum. „ BAGLIV.

„Variis titulis vnus idemque morbus insigniri solet, vbi tamen eadem est morbi causa, indicationes quoque

omnino naturales, quos quamuis vix credas esse futuros, dantur tamen. Certe in physiologia de vi contractili et sentiente multa docentur, quae ad hominem tantum sanum ducas, imo fatentur physiologi, fassus est HALLERVS, aliam esse vtramque in statu praeternaturali, latius hic

que eadem, atque eadem symptomata, solo gradu diuersa., MORTON.

„Methodus morbos ordinandi ita comparata esse debet, vt non in nominibus duntaxat morborum inueniendis sese vtilem praestet, sed praecipue facilem ad eruendas curationes viam expediat., GAVBIVS.

„Quamdiu pro speciebus habemus morbos, qui vere sunt genera, suis scilicet essentialibus characteribus discreta, errores in praxi euitare sane non poterimus, aegritudines, tota sua natura discrepantes, eadem methodo tunc pertractaturi., HEBENSTREIT.

Die simple Natur, in allen Jahrhunderten sich gleich, verträgt so wenig einen falschen Putz, als eine ehrwürdige Matrone. Man nehme jene, wie sie sich zeigt, sammle ihre Wirkungen, ohne alle Anhänglichkeit an großväterliche Lehrmeinungen, ordne sie in gewisse Klassen und führe dann ein System auf, das wirklich natürlich ist, das seinen Werth vor dem Krankenbette bewährt, und dem Iünglinge Zeit, Mühe, Kosten und Verdruss erspart. Dann wird die Arzneywissenschaft, die jetzt bald durch ekelhaftes Demonstrieren gemisbraucht, bald wieder durch falsche oder halb wahre Erfahrungen zur schimpflichsten Empirie erniedrigt wird, mit schnellen Schritten ihrer Vollkommenheit entgegen eilen, und der vernünftige Arzt deren Andenken segnen, die ihren Theil dazu beygetragen haben. A. d. B.

hic saltem patere irritabilitatem et sensibilitatem; nec tamen minus plerique in aegritudinum doctrina, huius rei obliti, irritabilitatem et sensibilitatem perfecte ad physiologorum doctrinam aestimauerunt: quod profecto absque rei detrimento fieri nequit ^{b)}).

- b. Aegritudines probe distinguendae sunt in morbos, passiones, symptomata). Cuius rei neglectus certe fecit, ut in aegritudinum natura reuelanda frustra desudarent multi, et maiores in ea cognoscenda prehenderent difficultates, quam vere sub omni conditione hic existunt. Distinctionem enim similem clari iam dudum viri ad rationalem aegritudinum doctrinam stabilendam commendarunt, licet obiectiones, quae tamen non difficulter discutiantur, proferri posse, agnoscerent ^{d)}).

c. In

- b) Sed forte in eo posita est a vero aberratio, quod physiologi irritabilitatis et sensibilitatis naturam haud bene adumbrarent huc usque. Incipiunt hodierni, non repugnante multum, nouissimo vitae suae tempore, HAL- LERO, contractilitatis, seu irritabilitatis, notionem magis extendere, et docere, gradu tantum differre vim mortuam, palpitationem, irritabilitatem, ut vim contractilem eminere tantum in musculis, adesse etiam in aliis partibus doceant. Quam sententiam me ipsum iam ante aliquot annos publice professum esse, lactor.

- c) Cf. introd. p. 4.

- d) „Ratio differentis morborum nomenclaturae rite peten-

c. In his definiendis (b) vtendum est largo obseruationum fide dignarum, a celebribus viris omnis aetatis propositarum, numero, atque inde aegritudinum character eruen-
 dus, dum simul et aliis satisfit. Recte certe edixit FR. HOFFMANNVS, vnum virum non sufficere conscribendae aegritudinum doctrinae, si propriis velit superstruere ob-
 fer-

tenda est a differenti earum caussa, symptomatis et indicationibus curatiuis differentibus. „ MORTON.

„Namque nouum non est, eundem morbum saepe ad plura genera referri posse; — quo in casu plures deteguntur proprietates morborum, pluresque adeo medendi methodi, indicationesque. „ PITCARNIVS.

„Neutiquam vero est, quod mihi quis obiiciat, hoc ad causas proximas respectu morborum genera augeri immaniter. Namque tantum abest, vt hoc cuidam naturae scrutatori vitio vertendum sit, vt potius in laudem illi cedat, res et notiones eo vsque, donec omne characterum essentialium discrimen penitus aboletur, ab inuicem discerpere. Scilicet hoc demum industria est, non abblandiri ignauiae et conceptus rerum imminuere, si illi per naturam tamen adsunt, sed eruditi viri est, minima quaeuis momenta, si differentia aliqua realis in illis latet, quae et consilium mutare posset, penitus euoluere, et auctis etiam, si opus est, generibus, species imminuere, quod quoque in methodo medendi non, nisi vtiliter, perfici posse, arbitror. „ HEBENSTREIT.

„Namque nouum non est, secundum hanc causallam aegritudinum contemplationem, eundem morbum alio sub initiis, alio sub summo statu, alio demum prope finem respectu, ad diuersa referri capita. „ HEBENSTREIT.

seruationibus, quod certe, ne senex quidem, omnes aegritudines viderit, et toties viderit, vt posset characterem potius aegritudinum, quam earum historiam, definire. Quare plus vtilitatis exspectes ab aegritudinum doctrina, frequenti clarorum omnis aetatis virorum obseruationum numero stabilita.

- d. Sed obseruationes auctorum non statim pro eo accipiendae sunt, ac proponuntur. Saepe enim auctores fideliter quidem obseruarunt, at vel aegritudinum naturam non omnino perspexerunt, nomineque conueniente insigniuerunt, vel methodum medendi sequentes, quam facile perspicias aegritudini non competisse, effecerunt, vt aegritudo corrumpetur, quare ab iis enarrata symptomata, decursus, curationis potius, saltem ex parte, progenies sunt, vt tales obseruationes aut omnino negligi, aut caute adhiberi possint.
- e. Ceterum autem rariores etiam obseruationes attendendae sunt. Quamuis enim admirabilia venari non debeas, nemo tamen medicorum, ne tiro quidem, quod ipse expertus sum, euitare potest, quo minus ob rariores casus consulatur. Quo igitur tum omnes aegritudines sufficienter dignosci, tum rariores agnosci possint, hae omnino attentionem sibi vindicant.

Vt

f. Vt aegritudinum characteres, in praxi utiles, componere, et de dignitate atque affinitate aegritudinum rite statuere liceat, opus est potissimum, ut methodus medendi, seu quae iuuabant et laedebant aegritudines, aestimentur ^{e)}). A cuius rei neglectu factum est imprimis, ut in rei damnum non theoria solum de aegritudinibus adeo adhuc esset a praxi earundem aliena, ut tiro, ad praxin accedens, multa deberet magno labore tam dediscere, quam addiscere, nec facile posset aegritudinum naturam perspicere. Pro! dolor enim non iniuste medicina accusatur, aliam esse theoriam, aliam praxin, quum, certe easdem esse debere, quisque intelligat. Sed obiiciet forte quis: curationem variis variam esse, licet aegritudo eadem sit, et leuamen, augmentum aegritudinis ab admissis variis varie explicari: at non difficulter respondetur. Primo enim non semper eadem omnino est aegritudo, cui vna tamen medendi methodo mederi student. Multi enim apoplexiam plethoricam, biliosam, habent pro vna aegritudine, apoplexia nimirum. Hos errare, atque ubi delinquant, facile perspicies, et mittes, nisi tum methodo medendi carere etiam possis. Deinde videas, quae medendi methodus potissimum iuuerit, et quamnam naturam et reliqua

e) Cf. introd. p. 46. 60, 61.

liqua adiuncta, et ipsa, suadeant, rationes autem auctorum, cur credant hoc illudue vel iuuare, vel nocere, nisi aliunde certa sint, tuto mittas.

- g. Chirurgia etiam in his negligi nequit. Licet enim haec seorsim ob praestantiam merito tradatur, tamen a medicina interna separari fere nequit, quod vel idem obiectum tum cognitionem, tum medelam, et medici et chirurgi requirat, vel aegritudines chirurgicae in reliquis definiendis saepe iuuent, medicus etiam chirurgicas noscere et discernere debeat, ut chirurgum, si est, bene dirigat.
- h. Negligi vero debet in adumbrando aegritudinum systemate adeo vaga, quam plerique stabiliunt, aetiologia, quum adeo felices raro simus, ut veras causas agnoscamus: quare via potius incedendum est, qua utilitas, quam causarum scrutinium spondet, obtineri potest f).
- i. Scriptores potissimum consulendi sunt, qui naturam aegritudinum in epidemiis, in nosocomiis rite constitutis, bene perscrutati sunt. Noli enim facile putare, scriptores, qui endemicas, epidemicas aegritudines descripserunt, a praeiudicata opinione saepe non fuisse liberos, maleque obseruauisse, non quae essent, sed quae obser-

f) Cf. introd. p. 38.

seruare vellent, vt describerent aegritudines, quas dari huc vsque ignorabas. Quare vides, HALLERVM §) male castigasse EVGALENVM, „qui in eo nimius esset, quod omnes pene morbos ad scorbutum referret. „ Error in HALLERO est, quod passiones scorbuticas haberet pro morbis, morbum ipsum, et certe, quod inde arguas, aegritudinum naturam, ignoraret. Nimium enim EVGALENVM non fuisse in tradendis passionibus scorbuticis, aliorum fide dignorum comprobant obseruationes, et res facile ipsa loquitur. Male certe multi in similem inciderunt errorem, credentes, hunc omnes fere morbos deducere e scorbuto, illum e plethora, istum e vermibus. Quod etsi aliquando verum, ac scriptores, quid proprie vereque obseruarent, nescirent saepe: multi tamen male eiusmodi scriptores diiudicant, naturam aegritudinum ipsi ignorantes. Certe multi ex opposito in eo nimii fuerunt, quod omnes fere passiones plethoricas, seu simili natura, esse crederent, alias, v. c. saburrales, biliosas, putridas, negligerent: cuius opprobrii si magni olim viri, FR. HOFFMANNVS et BOERHAAVIUS accusandi iure sunt, quidni et tantam famam non consecuti. Atque in his etiam, quod aegritudinum doctrina huc vsque non satis culta sit, ratio continetur.

k. Sic

g) Bibl. med. pr. T. II. p. 275.

k. Sic ortam aegritudinum doctrinam ita in systema redigendam esse, certe adnues, vt tiro facile possit naturam omnium aegritudinum perspicere, ad praxin accedens obuiam agnoscere, GALENI ^{b)} et CELSI ⁱ⁾ vestigia premens, medendi quoque methodum facile inuenire, et prognosin etiam certam dare, dum morbum magis spectat, quam passiones et symptomata, et periculum non a functionibus solum laesis, sed per energiae naturae ad morbum relationem aestimat, ipse etiam possit aegritudinum systema certius reddere, dum quae obserua-uit, memoriae mandat, et publici iuris facit, ea vel comprobent characterem, vel hunc meliorem, certio-rem, reddant.

Sed quid demum vtilitatis praestare poterit aegritudinum systema?

a. *In physiologia*, ad quam stabiliendam statum praeternaturalem corporis bene adhiberi, HALLERVS suo exemplo, ne dicam, comprobauit, at, posse tamen, ostendit, plus lucis exspectandum erit, quum aegritudinibus sic poteris vti, vt facilius ex stabilita naturali affinitate, earumque natura ad statum etiam naturalem certius concludas: modo caute semper statum praeternaturalem adhibeas.

b. Ae-

b) De loc. aff. l. I. c. 2.

i) De med. praef. p. 9.

- b. Aegritudines consideranti ipsi systema proficuum est, vt naturam aegritudinum facile perspiciat, affinitatem et discrepantiam earum facile vltcrius euoluat, et vbique cum paruo labore, quae desiderat, inueniat.
- c. *Semiotice prognostica* meliorem etiam conditionem nanciscitur. Per communia dogmata, huc vsque stabilita, solis fere passionibus, neglecto morbo, nitentia, laepe periculum metuendum videtur, aut spes adfulget, licet euentus ea non confirmet. Neque enim, quae de crisibus auctores stabilauerunt, ad omnes morbos duci posse videntur, nec, quae de periculo aegritudinum praecipiunt, in vniuersum vera sunt. Egregie Cel. STOLL^{k)}: „Non omnis omnino, inquit, aliena materies, intra humorum circulum recepta, vtut et subigi, attenuari, expellique, id est et coqui et critice euacuari debeat, modum diesque, ab HIPPOCRATE descriptos, seruare videtur. Verior et obseruationibus recentiorum stabilita dierum criticorum doctrina erit, si ea *unicae materiae phlogisticae*, in ipso circulante sanguine natae, nec aliunde receptae adaptetur, vt ideo *soli morbi inflammatorii* certo dierum numero, certoue modo iudicentur. — Qui morbi reliqui criticarum perturbationum exempla sistunt, id ha-

k) R. M. T. I. p. 66 sq.

habent a diathesi phlogistica concurrente.,,
Quare si fuere, qui omnes omnino crises
proscriberent, de aliis morbis loqui vi-
dentur. — Passiones vero, quibus pericu-
lum plurimum adiunctum esse statuunt mul-
ti, si faburrae biliosae, verminosae, pu-
tridae, progenies sunt, hisque occurritur
rite, facilius tolluntur. Exemplo sint
phrenitis, paraphrenitis, carphologia, con-
uulsiones. Videbis etiam, Cl. RIGLERVM
prognosés quasdam HIPPOCRATIS et BOER-
HAAVII in morbo putrido non confirmatas
vidisse ¹⁾).

- d. *Materia medica* ad maiorem certitudinem
perduci poterit. Quod enim hoc medica-
mentum ad oppugnandam aegritudinem
commendaretur, quod ei tollendae non
sufficere, clamaret alter, vterque ad ex-
perientiam prouocaret, alii, quid crede-
rent, agerentue, nescirent, id certe ma-
ximam partem ex eo deriués, quod mor-
bos negligentes, et solas passiones atten-
dentes, iudicium ferrent cl. viri, et hic me-
dicamentum contra huius, alter contra al-
terius morbi passionem eandem adhiberet.
— Quare noua omnino censura indiget ma-
teria medica: plerique enim huius scripto-
res, ne dicam omnes, multo labore sta-
bilire studuerunt, medicamentum quoddam
esse anodynum, antispasmodicum, anti-
phlo-

1) Cf. l. c. p. 29 sq. n. 19. 26. 27.

phlogisticum, rel., sed ad quemnam morbum eius vires proprie restringendae essent, neglexerunt, dum ad solas passiones respiciebant. At omnes remediorum virtutes sunt tantum relatiuae ad aegritudines, maxime ad morbos, vt, quod antiphlogisticum est in plethora vel anodynum, in alio morbo phlegmasiam, doloremue augeat. Quae si vera sunt, nonne luges medicinae statum, qua de certitudine eius male conuicti, tuti et tranquilli, nihil agimus, quo possit ad certitudinem perducī? Methodicos se esse, medici cum superbia clamant, magna etiam sermocinatione empiricos reprehendentes, quales se ipsos esse, fatebuntur viri ingenui, qui praxin doctissimi et expertissimi etiam medici eruditam et dogmaticam empiriam esse, diffiteri nolunt. Quam pauca enim remedia (sed laetus scribo, morbis tamen profligandis plurimis sufficientia) scimus ad morbos, impetum, sympathiam, seu passiones, et aegrotationes referre! — Erit etiam, quod aegritudinum systema augeat certitudinem materiae medicae, et doctrinam in vniuersum. Quae enim plerisque morbi certi passionibus profligandis inseruiunt, in affinibus etiam iure experiri, et procul dubio congrua, confirmantia, deprehendes: quae si sub omni passione morbo eidem profligando inseruiunt, morbi specifica erunt, veluti mercurius in

b

mor-

morbo venereo, cortex Peruvianus contra neurosin, praecipue periodicam.

e. *Therapia* etiam tali systemate adiuuatur. Quae enim iam ad numerum praecedentem adnotaui, ea potissimum huc spectant. Neque enim solum egregie constat, qui morbis occurrendum sit, dum huc usque de methodo medendi certe nota ad eruendos characteres aegritudinum adhibita sunt, sed in posterum etiam, praeunte CELSO, facilius patebit, quo modo passionibus in specie prospici debeat. Dum enim de curatione passionis instituenda dubitas, eam certe suscipere recte poteris, si analogam instituis passioni, ad morbum eundem relatae, illique proximae. — Profecto autem therapia censura omnino indiget. Quemadmodum enim dubitari nequit, quin generalis iam sufficiat medico, qui aegritudinum systema et materiam medicam et chirurgicam probe callet, ita etiam nemo negabit, therapiam generalem esse a speciali abstractam, ut, nisi haec nitatur felici empiria, et dogmatica fiat per aegritudinum systema, nihil frugi a therapia generali expectes. Errores in hac eadem sollemnes sunt, atque in materia medica. Ad doctrinam de morbis ubique respiciendum est ei, qui enunciationes therapeuticas caute abstracturus est. — Exemplo

plo sint aegritudines stationariae, intercurrentes, epidemicae. Etenim enunciatio, morbos intercurrentes sanandos esse, ut morbum stationarium, vel eodem tempore grassantem, vel qui paullo ante grassatus est, egregie confirmat methodum nostram. Etenim haec sic interpretor, quod passiones sic sanandae sint, ut morbus (stationarius). (Raro enim fiet, ut morbi alii intercurrentes cum stationario coëxistant, et peculiarem, morbo etiam stationario congruam, curationem desiderent.) Quare quum SYDENHAMVS a. 1668. observauit dysenteriam, excipientem febrim variolosam, curandam per antiphlogistica, ut variola, ego statuo, et variolam et dysenteriam pertinuisse ad plethoram seu phlegmasias genuinas, atque per variam sympathiam et impetum, tum variola, tum dysenteria, stipatam esse plethoram: et methodum, qua dysenteriam primo sanandam suscepit per cathartica et adstringentia, ideo noxiam fuisse, quod non medebatur sic morbo, sed contra passionem, (substituendo alium morbum) remedia adhiberet. Simili ratione in morbo epidemico omnes fere passiones similem curationem admittunt, ut tamen adeo tutus ne sis, et ex epidemia sola ad morbum eundem in aegro citra examen concludas, et similem, ut in reliquis, curationem instituas. Fit enim, ut occurrat

b 2

pecu-

peculiaris morbus. Vbique potius epidemici et stationarii morbi rationem habeas, quare eos vbique et omni tempore cognitos habeas.

f. Ex quibus modo dictis non difficulter etiam intelliges, in specie practicorum neminem adeo facile et feliciter aegritudines ad lectulos aegrotorum rimare posse, nisi systema tale cognouerit. Facile enim ad finem perducet examen ad lectulum aegroti, inquirens primum, quid morbum expediat, huius signa coniungendo, modo liceat per varia aegrotorum obstacula; inquiret deinde, quid passionem expediat, vnde quae aegrotatio sit exspectanda, quae prognosis et medela sit instituenda, facilius constabit. Simili ratione bonas facili breuique negotio componere obseruationes poterit, quibus ipse, et si edit, alii possint cum fructu tuto vti, atque a loco remotum medicum de aegroti statu ita instruet, vt hic de medela congrua commendanda facile possit statuere.

g. Similia his *de chirurgia* valere, si, quae ad hanc spectant, aegritudines suo congruo loco propositae sunt, nemo, spero, negabit. Sic, vulnera saepe tamquam passiones morbi biliosi, putridi, considerata et curanda esse, clari viri adnotarunt.

h. Me-

h. *Medicinam* etiam *publicam*, quam dico, recte inde definiri, quis neget? Certe nec de morbis, atque inde motis quaestionibus, nec de vulnerum vel sanabilitate vel letalitate, rite statuere quis poterit, nisi aegritudinum naturam per congruum systema probe perspectam habuerit. Neque, hac cognitione destitutus, de conseruanda ciuium salute per varia prophylactica praecepta, per medicinam facientium subiectorum definitionem rite statuere quis poterit. Quare dubites, num, quae, nuper in duabus terris institutae sunt leges ad conseruandam ciuium salutem, per subiectorum definitionem commendatam, licet a Cel. Viro promulgatae, rei ipsi satis respondeant: comparaturus enim leges cum aegritudinum systemate facile in contrariam sententiam abiturus erit.

i. Efficiet etiam congruum aegritudinum systema, vt de vero pretio librorum, ad aegritudinum doctrinam, semioticen, materiam medicam, therapiam, chirurgiam, medicinam publicam, spectantium, rite statui possit, quod quantum huc vsque a vero saepe distet, facile perspiciet, qui denuo systematis aegritudinum ideam concipien, libros hos, illos ad examen reuocaturus est. Eheu quantum merito pretium librorum laudatorum celebrium auctorum alienabitur!

tur! In aegritudinum naturam inquire et lege BOERHAAVIVM, quem credidisti naturam esse secutum, naturam descripsisse! Quid iudicabis? si, praeceunte LINDIO, de scorbuto doctrinam, me suadente, v. c., doctrinam de febribus, rel. ad examen reuocare placeat.

k. Fiet demum, spes est, vt medicina ad eum certitudinis gradum sensim euehatur, ad quem vtinam iam dudum euecta esset! et quem, quod videtur, iam obtinuisset, si olim GALENVUM non tam sequi, quam intelligere, — et legere certe, studuissent. Fiet, vt non adeo contempta medicina sit ob opinionum magis, quam veritatis, cumulum, ob discrepantiam theoriae et praxeos. Fiet, vt clima, temperamentum, vitae genus, sua ratione iam vsurpata, vltius citra damnum negligi possint, licet clinicum iuuent. Fiet, vt quum systēma aegritudinum quis struxerit, quem sequi placet, aegritudines, missis sermocinatione et verisimilitudine mera, vt plantae secundum LINNEVM verbo, citra confusionem delignentur.

Nonne autem, tot et tantas vtilitates a systēmate aegritudinum redundaturas aestimans, miraberis omnino, qui factum sit, vt nemo huc vsque de condendo systēmate cogitauerit?

uerit? De necessitate, vtilitate huc vsque non videntur fuisse persuasi. Quodsi admodum vtilem et necessarium putes, quomodo defectum supplebis? Vide, quem eligas in aegritudinum doctrina praeceptorem, quem sequaris? Pathologiae doctores visne? Num aegritudinum naturam perspexerunt, loco dignitatis, affinitatis, characterum congruorum, vagam de causis fermocinationem instituentes, methodum medendi omnino negligentes: male definientes morbum et symptomata, adeoque morbum cum passione, passionem cum symptomate toties confundentes, certe non absque damno? — Visne sequi nosologiae conditores? Solent, pathologorum penuriam, errores, perspicientes, in praxeos initio eo confugere; sed et hic rem non esse acu tactam, quis neget? Multa habes, quae credas in praxi nullius esse vtilitatis, quum affinitas, dignitas aegritudinum naturalis omnino neglecta sit, et aegritudines omnes, morbi, passiones, symptomata, mixta tradantur: omnes enim fere affinitatem artificialem male naturali praetulerunt. — Aegritudinum naturam certe ii magis perspexisse videntur, qui symptomatum nomine, non adprobantibus vero plurimis, omnes eas aegritudines insigniuerunt, quae in pathologia considerabuntur: neque hos tamen satis tuto sequi poteris.

Igitur

Igitur solum tibi supererit desiderium, ut quis aegritudinum systema componat. Nonne autem vides, non ita facile posse componi? Vnus, sagax, optimus, perspicax, senex medicus, non sufficit conscribendo, si desideras, ut e propria penu desumat omnia. Libros caute consulens, etiam iunior sufficiet: qui tamen, licet leges laudabiles in conferendis libris sequatur, euitare non poterit, quo minus ipsum fallat consuetudo et familiaritas opinionum, theoriae stabilitae, huius illius rei in observationibus hiatus, sui ipsius, id est, hominis, ingenium. Igitur, quae minus recte edixit, ut corrigant, suppleant alii, in votis erit.

Quae haecenus proposui, fateor, deterere me potius, quam excitare ad eiusmodi laborem subeundum debuissent: at vicit demum utilitas et necessitas laboris. Postquam enim causas, cur huc usque aegritudinum affinitatem naturalem inquirendam neglexissent, quaesiueram, leges, quae seruandae essent ab eo, qui aegritudines in systema redigere studeret, erueram, atque utilitatem in me redundaturam, in praxi potissimum insignem, aestimaueram, euolueram etiam, quae de variis, ad aegritudinum naturam facientibus, in aduersaria retuleram, ante aliquot annos consilium cepi, in propriam utilitatem conscribendi aegritudinum systema, quod,
nisi

nisi alius antea melius ederet, aut spem melioris faceret, editurus etiam essem. Atque in proposito meo me confirmauerunt etiam clarorum virorum de tali omnino labore iudicia, quorum referas HEBENSTREITH, ab aliis etiam laudatum, *ordinem morborum causalem*, qui paullo post, quam labori infitebam, ex parte in manus incidit, absoluto iam labore, integer ex GRVNERI editione mihi constitit.

Quoniam autem in magnis voluisse sat est, spero te, L. B., consilium, quod cepi, edendi aegritudinum systematis ita esse suscepturum, ut, suscipias, rogo. Absolutum me habere opus, ne credas, qui ipse, errores et hiatus dari, lubenter agnoscam: sufficiet tamen mihi, si aliquantum melioris defectum supplet, quousque tam diu mecum uti placeat, cum aliqua utilitate, donec vir grauis, ad hunc laborem subeundum et perfectius absoluendum incitatus, ediderit tale, quale omnes, quibus vita hominum cara est, merito desiderant.

Quomodo laborem peregerim, id quidem ex iam propositis legibus, quas secutus sum, ceterum vero e rei ipsius lectione (quam ordini respondentem, neutiquam leuiter et vage institutam desidero) cognoscere poteris, nisi librum abiicere placeat. Videbis,
me

me in veteres et recentiores aequum, vestigia illorum, a multis male neglectorum, et horum pressisse, nihil facile putans, quod bonum et vtile esset, a me posse proficisci, (nisi hiatus aliquando suppleat, aut diuersas opiniones componat, ad rem denuo perquirendam alios incitet) verumque dixisse *Baconem de VERVLAMIO*, esse, quo quis ad doctrinam colendam necessitate quasi, per labores et praecedentium et aequalium aetate per statum scientiae, quam colit, sponte quasi abripiatur, vt parum omnino gloriae tribuere sibi possit, vel noua inueniat, vel et olim et nuper dicta ita componat, vt noua oriatur doctrina. Nihil etiam, licet in eiusmodi obseruationem aut animaduersionem sponte inciderem, quae scirem aut cognoscerem ab aliis iam esse vel obseruata vel animaduersa, mihi studio arripui, suum cuique tribuens, vt tamen non vltra darem, quam res et aequitas vellet.

Quare, e quibus hausi, fontes, tum veteres, tum recentiores lubenter indicaui, vt morborum, passionum, symptomatum, testimonia colligerem, et illorum existentiam, alia forte ratione quibusdam interdum suspectam, sufficienter vindicarem, tamen simul euitarem, ne facile quis auctores excitandi pruritu me laborasse, iure videretur acculare. Atque ob dictam rationem admisi etiam, quam
ipse

ipse lectione libri non comparaueram, sed a nonnullis fide dignis excitata deprehenderam rarorum librorum copiam, ne testimoniorum maneret hiatus. Quare condones, si aliquando *vere* allegata scriptorum loca testimonium denegatura sint.

In vniuersum studui seruare dogmata atque aegritudinum recepta nomina, et nisi ab omnibus, a multis saltem vsitata; ambigua tamen, erronea proscribere, noua componere, quae aut breuiora, aut magis congrua videbantur, vt confusio euitaretur, non dubitauit.

In *introductione* exposui, quae credebam ad rem nostram facere, dubitans adhuc, num, qui lecturi sint, a consueta sua theoria qualicumque non penitus alieni, hic illic inueniant, quae ad argumentum minus spectare arbitrentur: at, licet directe non spectent dicta, auctorum etiam loca, indirecte saltem ex illis enunciationem necessariam arguere poteris: quodsi in his arguendis te ipsum fallas, nolis me erroris accusare, quo, non negabo, me non numquam vere et iure accusare poteris: quidni enim fatebor, hominem me esse?

Idem de pathologia et nosologia statuito. Et *pathologiam* quidem *generalem*, videbis,

debis, me voluisse saltem ita proponere, vt sit abstracta passionum theoria, quae ad passionem in specie, morbis quasi per passionem diuisis, ea quidem ratione adplicari possit, vt in pathologia speciali tuto omitterem, quae in generali iam, ad characterem passionis constituendum, proposita sunt. Quoniam vero plurimi auctores, ne dicam omnes, symptomata morbi et passionum ita miscent, vt haec illa saepe cum difficultate separare possis, passionem saepe verbo tantum indicant, et dubitari saepe debet, num vere subintelligenda sit, quam indicant, passio, nomina enim passionum saepe minus recte vsurpant, nescio sane, an, omnem errorem cauere, in me fuerit. Interdum autem consulto passionem illuc duxi, quo pertinere videbatur potius, quam denominatio iubebat.

In *nosologia*, quam primus iterum a pathologia discernere studui, pari fere ratione characteres dedi, vt scilicet in pathologia speciali repetitio recensuum symptomatum morbi, seu epigenematum, euitaretur.

Quare *pathologia specialis* breuior longe est, ac futura esset, si quis, vt solent, ubique aut omnia, aut multa commemorat et repetit, quae vel ad morbum, vel ad passionem, spectant. Atque in hac etiam admisi methodum medendi commendatam ab auctoribus,

ribus, vt vel methodus, in nosologia stabilita, et vbi dubitare facile potuisses, comprobaretur, vel initium prioris cognitionis naturae passionum fiat. Placuit autem in hac passiones coniungere, quae ad vnum morbum pertinent, non, quod aliis forte magis arrisisset, passiones varii morbi easdem coniungere. Methodo enim nostra fieri poterit, vt tum videas, quae affinitas et discrepantia forte in quoquo morbo sit, tum cui medendi methodo destituta passio sit proxima. Vbi per observationes constabat de symptomatibus, ad passiones enarrata sunt, vt tamen vel historia passionis vere daretur, vel character per singula symptomata stabiliretur, vel nihil omnino, praeter auctorum testimonia, in medium proferretur, prout optimum videbatur. Sed in his certe plura emendanda supererunt ^m).

Quaerisne autem, qua ratione morborum et passionum characterem eruerim? Hanc secutus sum legem.

Quae characterem *morbi* prae se ferebat, aegritudinem, tamquam morbum posui, atque

m) Inter causas, quod affinitas aegritudinum naturalis huc usque fere neglecta omnino sit; ea sunt, quae medicinae incrementum in vniuersum retardant, quorum iusto maior veterum aut recentiorum reuerentia et cul-

atque epigenemata erui, dum ex iis, quae ad morbum spectabant, passiones, decursum, aegrotationes, methodum medendi attendebam et secernebam. Quae deinde *passiones* esse cognoui, earum characteres erui inquirendo, quae restarent obuia, postquam morbi character, idemque differentiae passionis (patho-

cultus, chemiae, aut anatomiae, aut matheos, iusto maior aut minor aestimatio, partis medicinae peculiare studium, ut omnium nexus negligatur, nec theoreticae ita colantur, ut in praxi facile adhiberi possint. Ea, qua incedo, via, nisi me fallunt omnia, et ultra in praxi progredi poteris. Si tunc ponis, ad quos omnia reducenda erunt, coctionum modos, atque harum natura in genere stabilita, in specie omnes tum morbos, tum passiones contemplaris, materiam medicam, semioticen prognosticam, therapiam et chirurgiam eadem ratione tractare poteris.

Pone enim haemorrhagiam tamquam coctionis modum: et videbis num salutis, an exitii spem excitet in morbis, v. c. plethora, scorbuto, passionibus v. c. apoplexia, pleuritide: videbis, num adiuuanda, an supprimenda, moderandaue, tum in morbis, v. c. plethora, scorbuto, tum passionibus v. c. apoplexia, pleuritide: videbis et quomodo, num adstrictione, an relaxatione, et num stimulantibus, an sopientibus, porro cuius indolis haec esse debeant, an roborantia, amara, martialia, actu frigida, an calida, emollientia, an salina, acidaue, an alcalina, an neutra? rel.

Poteris certe in his omnibus seruare eundem ordinem, et vere debebis, quem secutus es in aegritudinum systemate, cui, si utilitatem ut praestent, volueris, oportet, respondeant.

thognomonica diagnostica) separatus erat: vt illa ad pathologiam generalem, haec ad specialem, morbo respondentem, referrem. Sic nati sunt morborum, passionum, characteres, vt tamen, quod iam in medicorum scholis sollemne est, expectare nequeas, fore, vt omne symptoma vel morbi, vel passionis, aliudque designans, sub omni vel morbi vel passionis conditione, *cum reliquis coniunctum* semper occurrat. Sufficit ita descriptus character, vt ex datis, his illis interdum neglectis, vel morbus, vel passio, vere erui et agnosci possit.

Sed in his, praecipue passionibus, alia occurrit, quae ad sedem, seu locum adfectum, spectat, difficultas. Ad eum per sensum aegroti concludi non posse cum GALENO V. C. HEBENSTREITIVS agnouit. Sic, vt exemplo utar, intestinorum dolor saepe ad cutim, quae ani marginem constituit, dolor vesicae colli ad extremum balanum refertur. Comparatio etiam viuorum sensationum, aliorumque symptomatum cum iis, quae anatome talibus aegritudinibus demortuorum ostendit, licet utilis omnino sit, omne dubium tollit, siquidem metuendum est, ne effectus pro causa habeatur, vtque pars credatur adfecta fuisse, aut certa ratione constituta, qua caruit in viuus. Phrenitis, pleuritis, haec sufficienter
vin-

vindicant. Nihilo tamen minus his omnibus coniunctis et caute adhibitis, neque iis neglectis, quae ab auctoribus multo saepe, nec infelici labore et frequenti obseruatione stabilita sunt, licebit omnino passionibus locum attribuere, quamuis non sit omni exceptione maior.

Ceterum in adumbrando charactere, quod supra requiri ostendi, cl. virorum obseruationibus vsus sum, vt tamen, quae videram ipse, (vidi autem, quod cum admiratione recorder, non adeo paucos tum morbos, tum passionibus) aliorumque animaduersiones, si quid lucis sponderent, non negligerem, et quod viderim, si pauca huc vsque testimonia exstarent, tum meum etiam profiteri nomen, non dubitarem.

Ab hypothesebus (quas tamen inuiti non numquam sequimur) abstinere studui, admisi autem interdum, ne manerent hiatus: vt tamen haec, si placeret, aut confirmares, aut per veri cognitionem fugares, a reliquis vt discernere posses, studui.

Quodsi demum, inito consilio et peracto labore conditum a me systema aegritudinum et simul totius medicinae statum, et multorum cl. virorum opiniones, contemplor,
du-

dubius haereo, num bene agam, quod edam. Tantus enim omnino labor fuit peragendus, cui exsequendo imparem me esse, forte diu sentire debuisssem; forte enim sola laudanda voluntas est. Imo si approbent non pauci, quid a plurimis expectem? Sunt, qui opera pathologica, nosologica, quae dicunt, materiae medicae, therapiae, semiotices, conscripserunt cl. viri, quos, si approbarent systema aegritudinum, oporteret fateri, plus minus se a vero aberrasse, et docuisse, quae vere admitti non possunt, aut longe aliter dici debuissent. Sunt, qui in longa amplae praxi sua sexcentos aegrotos, aut sanitati restituerunt, aut morti tradiderunt, aliam longe de aegritudinibus doctrinam sequentes. Qui homines nescit, num ignorat, quantum plerosque erroris agnitio angat, quam facile eum convincere aut arguere errorum soleant, qui, vel vera sint, vel falsa, noua tamen protulit, quae, a communi opinione vt recederetur, iuberent: quid igitur praemii laboris expectem? Vt compilatorem, reformatorem, clament, vt bona forte cum minus recte dictis abiiciant, vt eadem maneant omnia, ac fuerunt, licet agnoscant, quae mutanda sint? Rem au-

tem meam non agi, iam dixi: agitur res medicorum clarorum omnis aetatis, me tantum interprete. Quidquid igitur iudicetis, Lectores aequi, id aequo feram animo. Id volo, qui iudicium ferre dubitatis, qui aliorum iudicia colligere soletis, qui publicis censoribus, saepe vos fallentibus, fidem tribuere recusatis, ut censores agnoscatis, quos ut constituam, res iubet, viros, omni in veteres et recentiores aequi animi, eruditionis, famae, fidei, experientiae laude spectatissimos, laude mea maiores, perillustres et experientissimos viros: L. B. de ASCH, O. ACREL, G. E. BALDINGER, G. C. BEIREIS, H. CALLISEN, C. A. COTHENIVS, G. V. DOEVERN, I. F. G. GOLDHAGEN, W. GRANT, C. G. GRVNER, I. C. KEMME, C. LORRY, F. H. L. MVZELL, E. A. NICOLAI, E. PLATNER, I. PRINGLE, A. G. RICHTER, M. SARCONI, A. DE STOERCK, M. STOLL, C. STRACK, I. S. D. TISSOT, B. L. TRALLES, D. G. TRILLER: quorum de labore iudicia et monita, ut inagno desiderio expecto atque efflagito, ita vos omni fide accipiatis. —

Si qui fuerint, qui, arrepta omnino occasione, censura iniqua, laborem perstringant, his certe numquam respondebo, si
alii

alii aequae, commissos errores vere ostendenti, et bono in rem publicam animo nitenti, censurae librum subiiciant, id lubenter feram et grate accipiam, sed, nisi grauiora argumenta suadeant, dubiis, reprehensionibus, non respondebo, ratus, superflua me acturum, nisi dubiis ipse liber et aequus censoris animus soluendis sufficiat.

Si adprobaturi sunt aequi censores, celebres viri, laborem, quem iam coram habeo elaboratum, tomum alterum systematis, qui comprehendit pathologiae specialis reliquam partem, nimirum praeter passiones morborum, qui supersunt, aegritudines aetatis et sexus, traumaticas et symptomatologiam, mox editurus sum. Si secus, sufficiat hic tomus, qui, quantum licebat, etiam absque altero ea, quam consequi a me poterat, utilitate ne careret, studui. Quare et indicem adiiungere non dubitavi, ut facilius nomina; interdum TIBI forte minus nota, eorumque locum inuenias. Indicaui etiam *corrigenda*, ne errores typographici, quos cauere omnino non potui, sensum turbarent forte: quae ne adeo adaugerentur (quod metuedum erat) propositum facile sustuli, ut patho-

thologiam etiam saburrae, plethorae, pyogeniae, catarrheumatis, iam ederem. Quare sub felicioribus typorum auspiciis expectes in tomo posteriori, cuius si prioris editio excitatura sit desiderium. Ita vale et conaminibus nostris faue ! Scribeb. Hall. Magd. a. d. III. m. Maii clclocclxxxI.





I.

SYSTEMA AEGRITVDINVM exponit earumdem *affinitatem*, seu sub certa determinatione spectatarum convenientiam. Comprhendo autem sub *aegritudinum* voce id omne, quod GALENVS olim, sub *symptomatis* voce, in sensu latiori vsurpata, colligi posse, rarus est: „*symptoma*, inquit, est, quidquid praeter naturam animali accidit;„ ita, vt praeter *morbos*, horum etiam *caussas*, *epigenemata*, *passiones*, *adfectus*, et *symptomata*, strictius dicta, colligeret, quibus ego *periodum*, *typum*, *crises*, *solutiones*, et *aegrotationes*, quantum e re esse visum est, addere non dubitavi ^{a)}.

2.

Vt vero constet, de quo sermo sit habendus, satis erit, aegritudinum constituere essentiam, et, quam late pateant, definire.

A

Omnes

^{a)} Cf. GALENV'S de' differ. 'sympt. 'c. I. 2. de loc. aff. l. I. c. 3. meth. med. l. I. c. 6 - 9. l. 2. c. 1. sq.

Omnes autem medici, tum veteres, tum recentiores, praeter solum forte *Olympicum*, cuius GALENVS meminit, aegritudinem sanitati contrariam statuerunt, aliam illius definitionem daturi, prout huius aliam posuerant essentiam. Igitur aegritudinum naturam scrutaturi, sanitatis prius ideam eruamus, atque ob huius cum vita nexum, vitae etiam essentiae meminisse, iuuabit, oportebit.

Itaque *vita*, seu natura, essentia hominis, consistit in *virium*, ipsi propriarum, commercii perduratione; quemadmodum *mors* est sublatum virium, homini propriarum, commercium. Sunt autem *vires hominis*, *animus*, vis videlicet sui conscia, vnica, simplex; *anima*, vis repraesentans, sentiens, appetens, non ea quidem omnino simplex, nec spontanea, nec sui conscia, attamen vnica homogenea materia, cerebrum, neruosque implens; denique *vis*, *vitalis* dicta, non sponte quidem, sed excitata, per se agens, multiplex, et tum solidis, tum fluidis, corporis, eorundemque tum mixtioni, tum structurae, tribuenda.

Igitur *sanitas* est aequilibrium virium, seu potentia, proportionatas viribus suscipiendi actiones, id est, tales, vt agente vna vi, reliquae potentiam ad agendum sufficientem seruent. Hinc *aegritudo*, sanitati opposita, est sublatum virium aequilibrium, vt actionis, vel potentiae ad agendum, vis vnus aut excessu, aut defectu, reliquarum ad agendum potentia, aut actio, delinquat ^{b)}.

b) Cf., qui altis superciliis haec legit, scripta V. Cel. PLATNERI, MEDICVS.

3.

Vt iam in specie aegritudinum essentiam definiamus, GALENVN iterum audiamus, qui recte tum in sanitate, tum in aegritudine, quatuor distinguenda esse docuit: nimirum actiones, constitutiones, quae eas praecedunt, et sequuntur: seu mutationes status, eius potentias, seu facultates, causas, et phaenomena, seu symptomata in aegritudine. „Igitur status praeternaturalis quatuor dantur differentiae, inquit. Vna ipsius functionis vitatae; altera eius, qui hanc peperit, adfectus; tertia causarum, quae ipsae praecesserunt adfectum; quarta symptomatum, quae necessario sequuntur. „ Quid igitur morbus sit, inquirens GALENVS pergit: „Vel haec omnia coniuncta morbum esse, vel horum quaedam, aut vnum modo. Omnia coniuncta morbum esse, neminem voluisse, sed separasse quemvis causas morbi et symptomata, quae morbum sequuntur, homini tamen non officiunt. Ergo his ablatis, inquit, in alterutro morbus ponendus erit, vel in functionibus (actionibus) adfectis, vel in adfectibus, quae has edunt. Fuitque et antiqua sane de hoc controuersia, et hodie dissident inter se omnes, non modo medici, sed etiam philosophi, alii ipsius actionis vitia, alii adfectus, vnde actio prouenit, morbos nominantes. Sed de nominibus litigant. Conueniunt in eo omnes, ad adfectum, qui functioni obest, curationis consilia esse dirigenda. Nemo enim v. c. sanat claudicationem, sed adfectum, qui hanc efficit, veluti phlegmonem, si eius vitio claudicatur. „ Atque alibi, morbum opponens sanitati, quam non operatione, sed potentia, definiendam esse statuit, *idem*, morbum

bum statuit esse : „laesam potentiam operationis ; laesae operationis causam ; praeternaturalem corporis constitutionem, et causam, qua actio laeditur ; dispositionem praeter naturam, actionem impediens *primum*, id est, *per se* (vt *secundum*, *per accidens* statuit) : magis consentaneum esse rationi, morbum appellari adfectum praeter naturam, qui functioni officiat ^c). „

4.

Itaque I. *Morbi natura* consistit in oeconomiae corporis humani a statu naturali alienatione, tollente virium aequilibrium, seu inducente impotentiam, suscipiendi actiones, quibus homo sanus par est. — „Quare hoc plane puerile est, inquit GALENVS ^d), eo, quod numquam morbum ipsum solum per se videris, idcirco putare, morbum non esse. „

II. *Symptomata* sunt sensibiles qualitates corporis alienatae, seu recessus a sanitate, qui homini non, plus, minus, officiant ^e).

III. *Epigenema* est solius morbi symptoma ^f).

IV. *Insignia morbi symptomata*, *synedreuonta* symptomata, GALENI ^g); morbi deuteropathici, symptomatistici, sympathici recentiorum, empiricorum veterum
syn-

c) Cf. GALENVS *meth. med.* l. I. c. 8. 9. l. 2. c. I. 3. 6. *de loc. adf.* l. I. c. 3. *de differ. morb.* c. 2. 7. *de sympt. differ.* c. I. et VALLESIVS *Controv.* l. 4. c. I. consentiens in morbi definitione.

d) *meth. med.* L. II. vlt.

e) GALEN. *de differ. sympt.* c. I. *meth. med.* l. 2. c. I.

f) GALEN. *de diff. sympt.* l. c.

g) *de sympt. differ.* c. I. aphor. C. I. 12.

Syndrome ^{h)}, sunt laesae functiones seu operationes, seu complexus symptomatum, cui attribuitur certa conditio, et solet ad partem quamdam corporis, aut praecipuum quoddam symptoma reduci, ad quae reliqua referantur. — Et pars quidem, ad quam ea referuntur, quamvis vere non sit praeter naturam constituta, dicitur *adfecta*, monente GALENO ⁱ⁾. Quare et nominare licet *adfectus*. Quoniam vero etiam morbi effectus sunt, ut constabit, igitur rationem status sui non continent, poterunt ea quoque *passiones* dici, *pathos*, *pathema*, Graec. VI HIPPOCRATIS, ^{k)} GALENI, (etiam CAELII AVRELIANI acutae et chronicae) germ. *Sucht*.

Neque vero repugnat GALENVS, haec symptomatica insignia, vocare *passiones*, dum functio partis mutata, vel *syndrome*, nulli peculiari parti adscribenda, eadem manet, *adfectus* autem, si vicissitudines subit. ^{l)}

V. *Causa* denique est id, quod rationem aegritudinis in se continet. — De reliquis suo loco.

N. GALENVS *corpora* habet oculum, linguam, aurem, crus, rel.; visum, auditum, sermonem, incessum, *actiones* ^{m)}. Oculus itaque continet potentiam viden-

h) „Empirici *syndromen* appellandam censent congeriem symptomatum, quae in *adfecto* sunt loco., GALEN. meth. med. II. 4.

i) De loc. adf. l. I. c. 2.

k) Habet νόσημα, νόσος et πάθος, de qua voce cf. GALENVS. Comm. 3. in aphor. 28.

l) Cf. *idem* de loc. adf. l. I. c. 3. et meth. med. l. 2. c. 3. de sympt. diff. c. 1. a. f.

m) Meth. med. l. I. c. 7.

videndi, visus ipse actio est: si illa laesa est, laeditur actio per illam conditionem praeternaturalem, hinc laesa videndi potentia potest morbus dici; actio vero laesa, visus abolitio, est passio. Itaque tum constat, qui factum sit, ut morbi notio magis extensa sit, quam par esse videretur merito, tum quod distingui et possint, et debeant, morbus et passio, tum quod, si morbos ita definis, dentur morbi *uniuersales*, et *particulares* aliquando, seu *topici*, parti adscribendi.

5.

Aegritudinum, modo dictarum, *affinitas* altera *essentialis*, *primaria* est; altera *accidentalis*, *secundaria*. Et haec quidem est aegritudinum conuenientia secundum attributa externa, illa secundum naturam seu essentiam, id est, *caussalis*. *Accidentalis* cuique aegritudini conuenit, *essentialis* e contrario vni tantum respondet aegritudini.

Igitur aegritudines primum, quo idea earum sufficiens habeatur, secundum essentiam suam enarrare placeat, ut, quum hae modo causas, modo morbum, modo adfectus, modo passiones, et symptomata, constituent, loculenter deinde constet, quo sermo tendat.

Quarum aegritudinum omnia subiecta en! haec sunt.

I. CONTINENTIVM PARTIVM.

A. COHAESIONIS:

a. *Debilitas* est fibrarum nisus cohaerendi tam paruus, ut non sufficiat functioni suae rite peragenda.

a. *citra metum dissolutionis*:

1. La-

1. *Laxitas* est debilitas partium mollium, qua fit, vt facile vltra modum extendantur et dilatentur.
 2. *Inertia* est debilitas partium elasticarum, qua fit, vt post motus susceptos in pristinum se non restituant.
 3. *Flexilitas* est debilitas ossium, qua formam suam non satis tuentur, potentiisque admisis nimis facile cedunt.
- b. *cum metu dissolutionis*:
1. *Teneritudo, gracilitas*, est debilitas partium mollium, ea, vt facile rumpantur distractione.
 2. *Tabitudo* est teneritudo delicata, a mixtione vitata, vt mole decrescant, friabiles fiant partes molles.
 3. *Fragilitas spongiosa* est debilitas ossium ea, vt per leues motus rumpantur.
 4. *Fissilitas* est debilitas partium tenaciorum, vt a leui motu rumpantur.
- b. *Rigiditas* est fibrarum in cohaesionem nifus tantus, vt distractioni iusto magis resistent n).
- a. *Firmitas insuperabilis*:
1. *Tenacitas* est rigiditas partis mollioris, distractionem magnam absque ruptura ferentis.
 2. *Durities* est rigiditas partis mollioris, fuetis viribus non cedentis.
- b. *Fragilitas vitrea* GAVBII est rigiditas ossium, aut partis mollioris, a leuiori potentia dissolientium.

B. *Vis*

n) Comm. Lips. IX. 441.

B. VIS CONTRACTILIS:

- a. *Mortuae* (cellulosae telae, reticularis et stipatae, tum adiposae).
- α. contractilitas aucta, seu *spasmus* o).
- β. contractilitas imminuta, seu *atonia*.
- b. *Vis insitae*:
 - a. *Irritabilitas*, p) naturalis irritabilitas aucta, *spasmus*, *erethismus*.
 - α. *Tremor*, *Tromos*, Graec. palpitation in motu constitutis aucta.
 - β. *Palmus*, *Subsultus*, palpitation in quiescentibus aucta.
 - 1. *Tetanus*, distentio q), palmus cum rigida immobilitate r).
 - 2. *Convulsio*, est palmus antagonistarum alternans.
 - γ. *Irritabilitas*, produciens motus inscios.
 - δ. *Ectasis*, irritabilitas, stimulo interno tantum obediens.
 - ε. *Catalepsis*, irritabilitas, stimulo tantum externo obediens s). Hinc *irritabilitas* est vis insitae adeo facilis mutabilitas, ut a leuiori stimulo motus, nec huic, nec functionibus corporis respondentes, sequantur.

b. *Tor-*

o) CAEL. AVR. ac. III. 7. Exemplum sistit hydrophobia. Cf. James. Comm. Lips. XI. 483.

p) *Saltus* CAEL. AVR. ac. III. 7.

q) CAEL. AVR. ac. III. 6.

r) Topicus. Comm. Lips. X. 148. XI. 529.

s) Topica vagra. Med. obs. and Inq. vol. I. p. 230. Comm. Lips. VIII. 311.

b. *Torpor* est vis insitae adeo imminuta perceptio stimuli, vt contractiones musculorum paruae non sufficient peragendis functionibus.

N. In speciebus irritabilitatis fere omnibus praesto simul est torpor, dum irritabilitas et torpor alias partes tenet, vt viriusque potius effectus sint.

c. *Paresis*, facultas, stimulum percipiendi, aut motum producendi, deleta.

C. VIS SENTIENDI:

a. *Sensibilitas*, vis sentiendi excedens.

b. *Insensibilitas*, sentiendi vis nimium imminuta.

c. *Anaesthesia*, paralytis imperfecta auctorum: sensus omnis priuatio.

d. *Sensibilitas alienata* est sentiendi vis ita mutata, vt stimuli perceptio a sanis aliena sequatur.

D. VIS VITALIS.

a. *Excedens*, *Erethismus*.

b. *Deficiens*, *Eclipsis*.

a. *Syncope*.

b. *Lipothymia*.

c. *Asphyxia*.

} definitiones vide in pathologia generali.

E. VIS CONTRACTILIS ET SENTIENDI CONIUNCTIM.

a. *Paralytis*.

b. *Hemiplegia*.

c. *Paraplegia*.

} definitiones vide in pathologia generali.

F. VIS SENTIENDI ET VITALIS CONIUNCTIM.

G. *DIDVCTIO* est laxior iusto solidorum nexus, aut modum excedens, aut ordinis, tempore, materie, loco, peccans.

- a. *Dilatatio, euryisma* est iusto capacius spatium caui, vel canalis, vel sinus, vel receptaculi cuiuscumque.
- b. *Anastomosis* est laxatio immodica ostii cavitatis.
- c. *Diapedesis* est distractio caui membranarum fibrarum, ut citra continui solutionem interstitia hiantia oriantur, per quae humores continendi transfudare possint.
- d. *Diaeresis* est cauorum parietum ostiorum ampliatio, aut integrae partis perforatio.
 - a. *Rhegma, rhexis, ruptio*, est diaeresis a contentis distendentibus.
 - b. *Diabrosis* est diaeresis ab erosione.

H. ANGVSTIA.

- a. *Emphraxis, obstructio*, est caui sublatio a materiae transmittendae mora.
- b. *Constipatio, stenochoria*, est viae angustatio a parietum caui approximatione per tubera, prominentiam, aut crassitiem auctam, aut tumores contentorum.
- c. *Thlipsis, compressio*, est viae angustatio a caussa, extra caui parietes contenta.
- d. *Synicesis, collapsus*, est viae angustatio ob defectum materiae expandentis.
- e. *Contractio* est viae angustatio ob vim contractilem auctam.
- f. *Symphisis, coalitus*, est viae angustatio, in parietum concretionem, seu caui abolitionem, transgressa.

I. CONTINVI SOLVTIO.

a. Vul-

- a. *Vulnus* est continui solutio partis solidæ, non duræ, recens, a causâ mechanica.
- b. *Fractura* est continui solutio in parte dura, ossæ, cartilaginea, a causâ mechanica.
 - 1. *Fissura, hedres*, est fractura, ut partes solutæ, rimæ inter, dehiscant. *Contrafissura* est fissura, facta in parte alia, potissimum opposita ei, cui potentia applicabatur.
 - 2. *Attritio, contritio, alphetidon, catagma*, est fractura multiplex, ut ossa in minima fragmenta comminuta sint.

K. CONTIGUITAS LAESA.

- a. *Coalitus* est iusto strictior cohaesio partium, quæ disiunctæ esse debebant.
- b. *Disiunctio* est iusto laxior nexus partium, quæ contiguæ esse debebant.

L. ECTOPIA est partium solidarum a consueto situ recessus, vel partium solidarum e sua sede, continentibus vel relaxatis, vel ruptis, dimotio.

M. PROCIDENTIA, PROPTOSIS, est egressus partis mollis e sua sede, per hiatus vel naturalem, vel vitio naturæ, ut nuda tangi possit.

N. CONFORMATIO VITIATA.

- 1. *Enormitas* est, substantiâ illibata, simplex quantitatis auctæ vitium.
- 2. *Tumor* est enormitas cum substantiæ vitio.
- 3. *Mutilatio* est absentia partis, in aliis hominibus conspicuæ.

6.

II. CONTENTARVM PARTIVM.

A. COHAERENTIAE, DYSCRASIA, INTEMPERIES.

a. *Excedentis, spissitudo, lentor, est cohaerentia fluidorum nimis aucta.*

α. *Visciditas, tenacitas, glutinositas, mucositas, pituitositas, pituita, phlegma frigidum, est spissitudo serosa, gradu varia.*

α. *Scirrhusa, serophulosa, eadem, dum acido, acerbo, vel abundanti debetur, vel partes liquidiores, inflammabiles, absorptae sunt, relicta ea fixa in parte.*

β *Calculosa, eadem intercedente, per inflammabile, æris copia.*

b. *Atrabilaria spissitudo, atra bilis, succus ater, sanguis melancholicus, est cruoris abundantis et bilis nimia cohaerentia.*

b. *Deficientis, fluiditas, tenuitas, est cohaerentia fluidorum sana minor.*

a. *Rarefactio est fluxilitas ex aucto volumine.*

b. *Aquositas, serositas, cacochymia serosa, plethora serosa, est fluxilitas ex abundantia feri.*

c. *Attenuatio, resolutio, colliquatio, est tenuitas serosa ab acri.*

c. *Alienatae.*

a. *Secessio particularum nimis facilis est humorum inter se inuicem attractio imminuta.*

b. *Inflammatoria constitutio, phlegma calidum, phlegmonodes, pituita usta et supra modum cocta, crusta phlogistica, inflammatoria, sanguis phlogisticus, corium*

corium pleuriticum, est lymphæ spissitudo, combinata cum lymphæ, sero, aut cruori, potissimum adiunctæ, eamque efficientis, resolutione t).

c. *Purulenta*, pus, *materia purulenta*, *cacochymia purulenta* est resoluta lymphæ inflammatoria, seorsim spectata.

d. *Concrementum* est corpus solidum, fibræ, membranae, ossis, calculi, pilorum, u) rel., nomine veniens, ex inspissatis humoribus ortum.

e. *Coagulum*, *grumus*, *grumositas*, *thrombos*, *thrombositas* est corpus, mediæ inter solidum et fluidum naturæ, ex humoribus ortum.

B. *CACOCHYMIA* est mixtio liquidorum peruersa, vel per abundantiam partis constitutivæ, vel potissimum materiae alienæ, humoribus admixtæ.

a. *Oleosa*:

a. *Biliofa*, ex abundantia bilis x).

b. *Rancida*, *nidorosa*, *biliofa*, *acris* y).

c. *Putrida*, *putredo*, *sepsis*, *biliofa corrupta*, *alkali volatile euoluens* z).

d. *Ichorosa*, lymphæ cum bile putrescente.

b. *Acida*, abundantia falis acidi, vel fixi vel volatilis: *acerbum*, abundantia acidi, solida stringentis, liquida coagulantis. a)

c. *Am-*

t) Cf. MEDICVS obs. T. 2. p. 583 sq. HEWSON. alii.

u) Comm. Lips. XVII. 57. C. L. N. 1731. p. 236.

x) v. infra *Polycholiam*.

y) ill. GRVNER. sem. §. 778.

z) BOERH. §. 76 sq. GRVNER Semiot. §. 777.

a) GRVNERI Semiot. §. 776. BOERH. aph. 60 sq. v. SWIETEN. Comm., T. I.

- c. *Ammoniacalis, urinosa*, est abundantia salis natiui urinae, vel salis ammoniaci.
- d. *Muriatica* est abundantia salis communis b).
- e. *Cancrofa*, multiplex.
- f. *Syphilitica, venerea*, ignota.
- g. *Cacochylia, saburra, cruditas primarum viarum*, est cacochymia succorum primarum viarum, atque adsumptorum aut solutio nulla, aut mixtio nocens.
- C. *INERTIA* est indoles humorum nimis blanda.
- D. *MIXTIO INAEQUALIS* est mixtio humorum non satis homogenea.
- E. *QUANTITAS HUMORVM VITIATA*.
 - a. *Copia nimis aucta*:
 - a. *Polychymia* est abundantia humorum omnium, sanitatem excedens.
 - b. *Plethora* est abundantia sanguinis nimis.
 - c. *Obesitas, plethora obesa, polysarcia adiposa, corpulentia saginosa* est olei, seu pinguedinis, abundantia iusto maior.
 - d. *Polycholia* est abundantia bilis nimia c).
 - e. *Polychylia* est abundantia chyli.
 - b. *Copia nimis imminuta*:
 - a. *Oligochymia* est defectus omnium humorum.
 - b. *Anaimia*

b) GRVNER. l. c. §. 777.

c) Nonne bilis etiam secundum naturam in totum corpus diffunditur, vt per arteriam etiam hepaticam secernatur? Ita videtur. Cf. GVENZ. in Comm. Lips. III. 534. HOME med. factis cet. p. 27 sq. BRUENING, MARCARD de ictero, BEHM d. de ictero Hal. 1780. Cl. STOELLER obs. 7. Quae si non sufficienter in hepate secernitur atque excernitur, oritur polycholia, vnde tum morbi, tum passionēs, oriuntur.

- b. *Anaimia, keneangia, inanitas, exinanitio, inopia sanguinis, collapsus vasorum sanguiferorum* est defectus sanguinis.
- c. *Macies* est defectus adipis.
- d. *Oligocholia* est defectus bilis.
- e. *Oligochylia* est defectus chyli.

F. MOTVS HUMORVM VITIA.

- a. *intestinus* :
 - a. *imminutus*.
 - b. *adauctus* :
 - 1. in toto corpore, *orgasmus*.
 - 2. in parte, *congestio*.
- b. *progressiuus* :
 - a. *adauctus*.
 - b. *imminutus*.
 - c. *directione abnormis, fluida loco aberrantia, error fluentium, impactorum, nutrimenti, excretorum. Humor in aliena loco motus. rel.*

7.

Quibus constitutis, aegritudinum differentias accidentales generales exponere, confert. Definimus igitur aegritudines:

I. *Ab origine.*

- 1. *Haereditariae* vocantur, dum parentes eadem aegritudine laborauerunt, ac subiectum, et praesens, vel a natiuitate iam conspicua, vel tardius comparens, causis, a subiecto admissis, vix tribui posse videtur,

2. *Con-*

2. *Congenitae* vocantur, si vel ipsa aegritudo, tempore vitae uterinae infanti adnascitur, vel idem saltem adipiscitur ad aegritudinem procliuitatem, ut herniam v. c. congenitam vocant.
3. *Aduentitiae*, *adquisitae*, dicuntur, quae ex causis, a homine nato admissis, accidunt. Sunt vero diuersae, tum ratione aetatis, scilicet *recenter natorum*, *infantum*, *iuuenum*, *virorum*, *senum*, tum *sexus*, *virilis* nimirum et *feminini*, indeque *virginum*, *gravidarum*, *parturientium*, *puerperarum*, *lactantium* et *vetularum*, tum et vitae generis, et anni temporis, unde *vernales* et *aestivae*, *autumnales* et *hiemales*:
4. *Primariae*, *primogeniae*, *protopathicae*, a peculiari sua causa enatae, et *secundariae*, *deuteropathicae* (*symptomaticae*), ab alia aegritudine enatae.
5. *Contagiosae*, quae gaudent facultate, se propagandi in sanos, dum *contagium*, *miasma*, seu materia, cui inest vis, se propagandi in sanos, eisdemque eadem aegritudine affligendi, vel per aërem, quo tenetur, nocet, unde dicuntur *contagiosae in distans*, vel *contactu aegroti* immediato transit, quae *contagiosae per contactum* vocantur. Sunt vero aliae *contagii expertes*.
6. *Sporadicae*, *sparsae* sunt, quae paucis accidunt subiectis, *pandemicae*, *pandemiae*, *grassantes*, dicuntur, quae multos e populo affligunt, unde *grassatio* dicitur conditio, qua idem contingit.

git. Sunt autem *hae iterum vel endemicae*, *endemicae* (*vernaculus*), si regioni singulari addicti sunt, *vel epidemicae, epichoriae*, quae ad tempus populum adfligunt, nec regioni adscribendae sunt. *Constitutio epidemica, catastasis*, indicat conditiones vel epidemicae, vel eius caussarum, vel vtriusque rei.

7. *Stationariae* SYDENHAMI sunt, quae sub certa annorum constitutione comparent, *intercurrentes* autem, quae omnibus annis citra differentiam eueniunt.

8.

II. A sede:

8. *Vniuersales* sunt, quae vniuersum corpus tenent, *particulares, topicae*, quae partem tantum corripunt.
9. *Idiopathicae* sunt, quae communem cum sua causa sedem habent, *sympathicae* vero, quae differentem.
10. *Fixae* dicuntur, quae in vna parte corporis morantur, *vagae* vero, quae in aliam migrant; *retrogradae*, quae, extremis relictis, interiora petunt.
11. *Externas, internas* nominasse, sat est.

N. Sunt, qui protopathicas et idiopathicas, citra veterum auctoritatem, ac notionem, et vtilem, et naturae conuenientem, easdem esse putent. GALENVS d)

„At nemo, inquit, protopathicos dixerit huiusmodi

B

mor-

d) GALENVS de loc. aff. l. I. c. 3.

morbos, qui ob alium praecedentem euenerunt, quippe sympathici ad huiusmodi permutantur idiopathiam, perinde ac si ab initio protopathia ipsis accidisset., Et recte quidem: fieri enim potest, ut aegritudo protopathica sit topica, quemadmodum non repugnat, quin enascatur causa aegritudinis, et si in eadem parte aegritudo comparet producta, haec idiopathica dicitur, si in alia, sympathica. Constat autem ex sequentibus, morbos tum esse primarios, tum secundarios.

9.

III. *Ab indole.*

12. *Leues, mites*, vocantur, quae aegrotum leuiter adfligunt, et paucis stipantur phaenomenis; *graues* autem, quae vehementer tenent, et abundant phaenomenis.

13. *Magnae* sunt, quae vires aegroti fere superant, *paruae*, quae parum vires exercent. GALENVS ^{e)} enim magnas vocat, quae supra vires sint.

14. *Regulares, exquisitae*, sunt, quarum phaenomena respondent characteri aegritudinis, quam sistunt, *irregulares* vero, quae contra. *Genuinae* sunt, quoad decursum regulares.

15. *Benignae* sunt, quae, leues aut paruae, regulares aemulantur, *malignae*, quae, graues aut magnae, suetam naturam non seruant, et vel sunt *anomaliae*, seu a sueta natura recedentes,

tum-

e) De tot. morb. temp. c. 5.

tumque vel *refractariae*, *pertinaces*, quae conuenientium remediorum vim aut eludunt, aut aegrius illi cedunt, vel *corruptae*, quae aut ob neglectum, aut ob medelam erroneam, alienam naturam contraxerunt.

16. *Activae* sunt, ubi vires vitales agunt ad superandam aegritudinem, seu, quae functiones excitando phaenomena cient; *passivae* iisdem opponuntur f).

IO.

III. Ab euentu.

17. *Periculosae* sunt, quae vitae periculum adferunt; *securae*, *tutae*, carent periculo.

18. *Insidiosae* sunt periculosae, securas simulantes; *fidae* sunt, quae tutae patent.

19. *Indifferentes* sunt, quae periculum non minantur, nec nocentes, nec iuuantes: *ancipites* sunt, de quarum euentu non constat.

20. *Prauae*, *detrimentosae*, sunt, quae nec salutem spondent, nec facile nocent: *salutares* vero, quae plus utilitatis, quam noxae, promittunt.

21. *Sanabiles* sunt, quibus medendis medicina sufficit; *insanabiles*, *incurabiles*, quae sanari nequeunt. *Letales* vero, quae mortem inferunt.

22. *Perseuerantes* sunt, quae, non admodum nocentes, per vitam persistunt.

II.

V. A forma et constitutione (τροποι καὶ κατασκευαες Graec.)

B 2

23.

- f) *Habituales* sunt, quae homines constanter tenent.

23. *Simplices*, quae phaenomena sistunt, vna relatione conspicua; *compositae* vero, quae phaenomena exhibent, multiplici relatione conspicua, quae iterum dicuntur:

- a. *Comitatae*, dum nullus caussarum nexus est coëxistentium aegritudinum vel protopathicarum, vel deuteropathicarum, vel idiopathicarum, vel sympathicarum. (Male quibusdam dicuntur complicatae.)
- b. *Complicatae*, dum adest nexus caussarum coëxistentium aegritudinum.
- c. *Consecutiuae*, dum succedunt aegritudines deuteropathicae protopathicis, sympathicae idiopathicis, et contra.
- d. *Complexae* GALENI^{ff}), dum vel comitatae, vel complicatae, diuerso tempore mutationes suscipiunt.
- e. *Confusae* GALENI^{ff}), dum eadem eodem tempore mutationes proferunt.

24. *Celeres* sunt, quae celeriter mouentur, seu mutationes suscipiunt; *tardae*, *lentae*, quae lente mouentur g).

25. *Acutae*, *breues*, quae cito finiuntur, *longae* autem, seu *chronicae*, quae ultra dies 40 et ultra protrahuntur. (Sunt, qui acutis et chronicis periculum adiunctum esse debere, doceant.) Illae iterum sunt

- a. *Acutissimae*, *exacte peracutae*, quae soluuntur intra dies 4.
- b. *Per-*

f) De diff. febr. l. 2. c. 7.

g) Cf. GALEN. de dieb. decretor. l. 2. c. 12. et l. 3. c. 13. P. SALIUS DIVERSVS in C. in HIPPOCR. de m. p. 5.

b. *Peracutae*, non exacte *peracutae*, quae solvuntur intra dies 7.

c. *Exacte acutae*, quae solvuntur intra dies 14.

d. *Non exacte acutae*, quae solvuntur intra dies 21.

e. *Subacutae*, *acutae deciduae*, ex *decidentia*, *delapsu*, *acutae*, quae solvuntur intra dies 40.

α. *Altera* GALENI, vbi *acuta*, imperfecte iudicata, intra dies 20. *vehementia contracta*, intra dies 40 solvitur.

β. *Altera* GALENI, vbi, ab initio tarde mota, neque ullam subitam mutationem molita, ad diem 40 producitur.

f. *Acuta recidiva*, quae solvitur intra dies 60, aut ferius, imperfecto iudicio citius praegresso.

25. *Homotoniae* sunt, quae temporibus carent; *anabaticae*, quae tempora servant. Sunt autem tempora (*occasiones* GALENI defino.) *stadia aegritudinum*, vicissitudine phaenomenon insignita. Et quidem h):

a. *Initium*, *principium*, *irruptio*, *nascentis aegritudinis tempus*, est, quod a prima *invasione* usque ad aegritudinis augmentum, seu ad coctionis signa, praeterit. *Prima autem invasio*, (*terrentia morbi CELSI*,) est, dum medius inter sanitatem et aegritudinem status adest, et phaenomena comparent, sequenti aegritudini non omnino essentialia, sed pluribus communia.

b. *Augmentum*, *incrementum*, *auctio*, *adscensus aegritudinis*, est tempus, phaenomena, notabiliter aucta, sistens, seu coctionis initium.

c. *Sta-*

h) Cf. v. SWIETEN C. T. II. p. 68 sq.

- c. *Status, vigor, acme*, est tempus, quo omnia vehementissima, vbi coëctio absoluta.
- d. *Decrementum, declinatio*, tempus, quo vehementia phaenomenon imminuitur.
- e. *Finis*, tempus, quo aegritudo euauit. Inde emergunt :

27. *Epacmaſticae*, a principio ad ſtatum aequabiliter auctae, et *paracmaſticae*, a principio aequabiliter decreſcentes. Quoniam vero tempora ipſa iterum mutationes, ſeu tempora, ſubeunt, inde oriuntur:

28. *Continentes, continuae* etiam, *ſynochae veterum*, vbi tempora nullas mutationes ſubire videntur (quas proprie non dari, non recentiores ſolum docuerunt, ſed iam GALENVS i) ſtatuit); et *continuae, ſynochi veterum*, HIPPOCRATIS, quae mutationes ſubeunt:

- a. *Remittentes*, proprie et *ſynochus, intermittentes* etiam HIPPOCRATIS, quorum tempora augmentum et decrementum inferunt, non raro pluries.
- b. *Intermittentes*, quarum tempora initio, imo augmento et ſtatu, ſed et fine, ſtipantur, non raro pluries.

Ad remittentes ſpectant *exacerbatio* ſeu augmentum, *remiſſio* ſeu decrementum; ad intermittentes autem attingunt *circuitus, inuaſio, acceſſio, inſultus, paroxyſmus*, ſeu initium et augmentum, tum *intermiſſio*, tempus interme-

i) De criſib. l. 2. c. 6.

termedium, intercalare, seu finem insequens, intermedium ad sequentis initium.

29. *Suppressae* dicuntur, quae supersunt, earum plerisque phaenomenis vi ablati: *reuocatae*, si apta medela phaenomena priora redeunt. *Recidivae* vocantur, quae tempore redeuntis sanitatis iterum comparent, vti *recurrentes* eae nominantur, quae post sui abitum, seu cessationem, redeunt.

30. *Periodicae* dicuntur, quae periodis stipantur. „Est autem *periodus* tempus intentionum et remissionum in morbis factum:„ GALENO indicante, Hinc proprie remittentes et intermittentes respicit, et designat tum durationem exacerbationis et paroxysmi, tum eam remissionis et intermissionis. Est autem proprie una, non repugnante GALENO^k): „quum in pluribus sane morbis accessio futura, dicente, tertio quoquo die fit, vel singulis diebus, in paucissimis per quartam; „nec ultra tres ad maximum periodos admitti posse, docente, veterum etiam, et recentiorum, tum observationibus, tum animadversionibus, consentientibus. Igitur est

TRITAEA, horar. 48.

a. *Regularis*, dicta

a. *Simplex*, paroxysmus hor. 12., intermissio horar. 36.

b. *Duplicata*, intra horas 48. paroxysmi duo et intermissiones duae.

α. Cas

k) Ad eos, qui de typis scrips. c. 2.

α. Cathamerina, seu quotidiana, omni die paroxysmus et intermissio.

β. Duplex, vno die paroxysmi duo, altero intermissio sola.

γ. Triplicata, vno die paroxysmi duo, altero vnus, nisi fiat, vt vno tres, altero nullus sit.

a. Irregularis:

α. Anomala, extensa, intermissio brevis, aut nulla.

α. Remittens, exacerbatio aliquot horis ante novam finita.

1. *Simplex*, tritaea notha, paroxysmus ad horas 18. extensus, sequenti die intermissio sola.

2. *Duplicata*

aa. *Ephamera.* bb. *Amphimerina.* v. Febres.

β. Subintrās, exacerbatio durans, donec altera superaccedat.

1. *Simplex*, tritaephyā.

2. *Duplicata.*

aa. *Synocha.*

bb. *Synochus.*

cc. *Typhus.*

dd. *Hectica.*

ee. *Hemitritaeus.*

3. *Triplicata.*

b. Tardans:

α Tetartaea, quartana, horar. 72.

a. Regularis, paroxysmus hor. 12. 18. intermissio ad nouum paroxysmum.

b. Irregularis, anomala, extensa, Tetartophya, exacerbatio durans, donec altera subintret.

β. Erratica:

1. *Quintana.* 2. *Sextana.* 3. *Septana.* 3. *Nonana.* 5. *Decimana.* 6. *Quatuordecimana,* rel. cf. febres.

c. *Va-*

c. *Vaga.*

1. Principio intermittens, sequentibus temporibus remittens.
2. Principio remittens, postea intermittens.
3. Initio et sub finem intermittens, in medio remittens.
4. Initio et sub finem remittens, in medio intermittens.

N. Cf. febres, ad quas fere solas non definitae periodi spectant, omnes autem male a plerisque referuntur, ut vel sola aegritudinis vera periodo de febris praesentia statuant, quae tamen et aliis aegritudinibus, citra febrim, competit. Inde vero difficultas in rite diiudicanda aegritudinum natura.

N. 2. Sunt, qui *periodicas aegritudines* dicant, quae statuto tempore recurrant, vulgarem, ut videtur, *Graecorum* de periodo notionem sequentes, qui *periodum* omne tempus dixerunt, quum aequali tempore aliquid simile fit, ut GALENVS ad eos, qui de typis scripserunt, meminit: nec tamen haec notio admitti potest. Inde iterum in diiudicanda aegritudine quadam, ab auctoribus periodica dicta, difficultas.

N. 3. *Diem*, ut medici omni tempore statuerunt, vocamus tempus horarum 24., et sic quoque hic intelligendus.

31. *Typicae* seu typis stipatae: quibus opponuntur *atypicae*, quae typis carent. „*Typus* autem est ordo periodorum.„ GALENVS ¹).

a. *Re-*

1) De typis c. 2.

a. *Regularis*, vbi simplex paroxysmorum similitudo obtinet:

α. *Simplex*, „vbi vna intensio et remissione constant. „

αα. *Constans*, *consistens*, *immobilis*, *immutatus*, *perseuerans*, paroxysmi omnino similes.

β. *Inconstans*, *mobilis*, *kinumenos*.

1. *Anticipans*, *anteponens*, paroxysmi iustocius ingruentes, vt non respondeant praegressis.

2. *Postponens*, *tardans*, paroxysmi iustotardius venientes.

b. *Compositus*, „ex pluribus accessionibus et remissionibus constans. „

α. „*Ex simili genere*. „ v. g. tertianus et tertianus, quotidianus et quotidianus.

1. *Duplicatus*.

αα. *Genuinus*.

bb. *Duplex*.

2. *Triplicatus*, compositio et similitudo triplex.

β. „*Ex diuerso genere*, veluti tertianus et quartanus. „

b. *Irregularis*.

1. Initio et decursu simplex, postea duplicatus et triplicatus.

2. Initio decursus duplicatus, deinde simplex.

3. Initio constans, postea inconstans.

4. Initio inconstans, postea constans. rel.

N. Haec ad GALENI et naturae mentem, frequentiori observationum indole stabilitam, et vtilitatem spondentem, an admittent, quam nouam putabunt, theoriam?

VI. *A solutione.*

32. *Solutae* dicuntur, quae finem suum adeptae sunt. Vt vero *epigenesis* dicitur, dum ad permanentem aegritudinem noua superaccedit^m); ita *solutio*, *metabola*, *iudicium*, dicitur modus, quo aegritudo finitur: estque

a. *Imperfecta*, *Metaschematismus*, dicta, dum aegritudo transit in aliam:

a. *Metastasis*, dum forma et constitutio simul cum aegritudine mutantur.

b. *Palindrome*, *recursus*, quum post metaptosin [metastasin] redit ad priorem formam et constitutionem.

c. *Diadoche*, *diadexia*, *successio*, dum, manente forma et constitutione, aegritudo mutatur.

α. *Reuolutio* H. F. DELII, vbi aegritudo denuo vehementius insurgit, quam erat prior, forma et constitutione iisdem.

β. *Abscessus veter. materiales*, vbi humores ad aliam partem deponuntur, et aegritudinem et mutant et leuant.

γ. *Aposcemmata*, *aposcepses*, dum aegritudo protopathica, manente symptomatica, aut idiopathica, manente sympathica, mutantur.

δ. *Metaptosis*, dum, manente aegritudine, forma et constitutio mutantur.ⁿ).

a. *Per-*

m) BALLON. op. T. I. p. 211 sq.

n) Fateor quidem, haec verba nouo fere significato me adhibuisse: sed placuit magis rei nomina adaptare, quam verba

b. *Perfecta*, dum aut mors infertur, aut sanitas redit. Vbi occurrunt:

a. *Apocope*, *abscissio*, vbi citra declinationem terminatur.

b. *Convalescentiae tempus*, dum cedit cum superfluitate imbecillitate.

c. *Crisis*, quae est solutio morbi, quae cum magno et cito se declinante certamine fit °).

33. *Crudae* hinc dicuntur, quamdiu nulla phaenomena euincunt, vires corporis causae aegritudinis tollendae cum successu operam dare, ex parte superare, et crisin moliri: *coctae* autem, dum phaenomena docent, vires causam aegritudinis maximam partem superasse, et crisin expectandam esse, et iam perfici. Qua data opportuna occasione liceat de coctione verba facere, et simul omnia coniungere, quae oportet in consideratione aegritudinum nosse, attendere, aestimare. *Aegritudines salutes*, *naturae energia*, *motus critici*, *anima STAHLII*, *vis vitae in morbis superstes*, *reactio CVLLENI*, *aegrotationes*, mihi dictae, sunt mutationes praeternaturales quidem, at salutes plerumque, quibus natura, vires vitales, vtuntur ad superandam aegritudinem. Has medicum probe attendere debere, quum in earum congrua administratione tota quanta medici solertia

verba definire, eo magis, quum sic res potuissent facile omitti, et significatus verborum aliis aliis sit apud auctores.

o) GALEN. de cris. l. 2. c. II.

tia ponenda sit, eumque, naturae ministrum, non tantum iis vti debere ad conseruandam et restaurandam sanitatem, sed etiam, naturam imitaturum, aegrotationes excitare debere, certissimum est. Egregie certe Cel. GRANT ^{p)} monuit: „Wenn es wahr ist, daß man nie eine Krankheit heilen kann, wofern man nicht die Art und Weise kennt, auf welche die Natur bey der Heilung dieser Krankheit verfährt, so folgt hieraus, daß es höchstwichtig sey, dem Verfahren, welches die Natur beobachtet, nachzuspühren.“ Neque vero haec solum therapeutam scire oportet, sed eum etiam, qui agnoscendis morbis et aegritudinibus reliquis operam dat, quoniam coctio, et regimen et curatio, ei superstructa, aegritudinum characterem ex parte definiunt, dum, causas obscuras similes esse aut dissimiles natura, euincunt, vt mireris, haec a plerisque esse neglecta.

- A. Aegrotationes praesentes aegritudines tollunt, quod in sequentibus constabit, quemadmodum humano corpori non denegatae sunt vires, quae de periculo moneant, atque erupturas caueant, quod viribus potissimum vitalibus ascribendum est. Atque id quidem egregie ac luculenter docent conspiratio excretionum corporis, qua fit, vt altera alteram suppleat, vt largior transpiratio vrinae excretionem imminutam aut suppressam supplet; recessus etiam a sanitate, medii quasi inter sanitatem

tem et aegritudinem; quorsum catamenia, ex parte haemorrhoides, dentitio, callus ossium, grauiditas; quae quidem bene attendantur, oportet, vti egregie CELSVS voluit: „caueretur, ne in secunda valitudine aduersae praesidia consumerentur. „

B. Quando, vt repetam fere, aut ob labefactata aduersae valitudinis praesidia, aut ob graues causas, surrepsit aegritudo, status ille, seu et tempus, vbi aegrotatio vel omnino deficit, vel adhuc sopita latet, dicitur *cruditas aegritudinis, initium, principium morbi*, aegritudo ipsa *cruda*; quodsi aegritudo sic mutata est, vt minus noceat, dicitur *coctio*, aegritudo ipsa *cocta*. Hoc si obtinet, vires reagentes *vel* sunt tantae atque eae, vt aegritudo fugetur, sanitasque reducatur, citra sensibiles humoris euacuationes; *vel* est aliquantum minor, tanta tamen atque ea aegrotatio, vt alienum euietum superatumque, licet corpori non omnino assimilatum, per varias vias, simul redeunte sanitate, eliminentur. Si illud, *coctio, pepsis*, dicitur, si hoc *pepasmus, maturatio, mitificatio*.

C. Aegrotatio autem et nititur solidis et fluidis corporis humani, vt ipsae aegritudines his nituntur: quare et SWIETENIVS ^{q)}: „Poterit haec cruditas in partibus fluidis et solidis locum habere, adeoque et mutatio, seu coctio. „ Ex solidis autem huc maxime faciunt sensibilitas et irritabilitas, et solidorum continentium adfectiones. Quod fluida attinet,

q) Comm. T. I. p. 693. §. 402.

attinet, eadem vis obtinet, dum *vel*, quae superest, humorum copia aegritudinem, in primis quatenus ad fluida redit, sic mutat, vt ad statum sanum redeat, atque, stimulo simul solidis adiecto, ad varia corporis emissaria, non subigendum defert, vt euacuetur, *vel* perfecte humores aegrum humorem vinciunt, atque in naturam humanam conuertunt.

D. Quum vero et aegritudo et aegrotatio statu solidorum et fluidorum nitatur, qui tum subiecti indole, ratione aetatis, sexus, temperamenti, vitae generis, rel., tum praegressis et iam admissis, climate, adsumtis, rel., nitatur, palam est, coctionem aliam esse debere, vt aegritudo et aegrotatio, et horum relatio, variant. Quare dubitari debebit, num, quae scriptores, potissimum veteres, de coctione memoriae prodiderunt, *in vniuersum* possint admitti.

E. Operae pretium erit, iam in specie disquirere, quotuplici modo et pepsis, et pepasmos, perficiatur.

2. PEPSIS, coctio, assimilatio, fit

a. *Excitatione*, seu virium vitalium, nervorum, actione adaucta:

α. Vi nervosa, sensibilitate.

β. Irritabilitate.

γ. Palpitatione.

δ. Vi mortua.

b. *Remissione*, seu virium, modo definitarum, actione imminuta.

c. *Re-*

- c. *Relaxatione*, seu solidorum cohaesionis remissione.
- d. *Adstrictione*, seu solidorum cohaesionis nisu adaucto.
- e. *Metathesi, transpositione*, seu solidorum, et naturae congruorum, et praeter naturam praesentium, in alium locum, vt minus, aut omnino non noceant, delatione, veluti herniae repositione spontanea, calculo, cataracta, testibus.
- f. *Alteratione*, seu cacochymiae emendatione.
- g. *Attenuatione*, seu humorum spissitudinis emendatione.
- h. *Resolutione*, seu humorum varii generis cohaerentiae imminutione.
- i. *Incrassatione*, seu humorum tenuitatis emendatione.
- k. *Correctione*, seu humorum inaequalis mixtionis emendatione.
- l. *Impetu alienato, abscessu ad nervos veter.* Febris salutaris.
- m. *Euacuatione simplici*, seu naturali adaucta.
- n. *Repletione congrua*, a veteribus non praetermissa.
 - α. *Restauracione deperditi, simplici.*
 - β. *Restaurata carne*, in vulnere, cicatrice.
 - γ. *Callo.*

Β. PEPASMOS, maturatio, mitificatio, fit:

- a. *Emesi*, seu per vomitum.
- b. *Catharsi*, seu per alium.
- c. *Enuresi*, seu per vrinam.
- d. *Diapnoë, diaphoresi*, seu per madorem et sudorem.

e. *Haë.*

- e. *Haemorrhagia*, seu sanguinis profluuium.
- f. *Saluatione*, *ptyalismo*, per saliuam, sputa.
- β. *Anacatharsi*, seu per sputa ex faucibus, aut pulmonibus.
- g. *Sternutatione*, seu per excretionem narium.
- h. *Gonorrhoea*, seu per geniturae effluxum, cet.
- i. *Galactorrhoea*, seu per lactis excretionem.
- k. *Partu*, seu per excretionem concepti fetus, cet.
- l. *Pyorrhoea*, seu per puris excretionem.
- m. *Abscessu ad materiam veterem*, praeter iam dicta, *necrosi*, *gangraena*, *carie* seu *exfoliatione*.

Estque vel *designata*, ubi humoris cocti euacuatio contingit per vias, quas humores crudi potissimum quaesierunt, et aegritudinum adfectiones aequae, ac aegrotatio, indicauerunt: vel *dissimulata*, quando idem non obtinet.

F. Obseruarunt autem scriptores, potissimum veteres, et memoriae prodiderunt, subitaneas aegritudinum per aegrotationes fieri mutationes, certis diebus adstrictas, quae tum praesentem, tum futuram coctionem designent, *crisin* volo, iam supra expositam, eam vel solutionem aegritudinis dicas, cum magno et cito se declinante certamine euenientem, vel hoc certamen potissimum eam intelligas. Hoc enim GALENVS ^{r)} etiam dixit; „Si qua confertim fiat permutatio, et multo magis eam perturbationem, quae illam praecedat, *crisin* appello.„ Inde sic dicti *critici dies*, qui tam *indices* sunt futurae sequentibus diebus criticis aegritudinis solutionis, quam vere *decretorii*, quibus aegritudines decernunt seu iudicantur.

r) De cris. cap. vlt.

G. En dierum criticorum schema!

SEPTENARIVM I.			SEPTENARIVM III.		
DIES			DIES		
I.	<i>Criticus</i>	} ephemeræ GALENI.	○ XXI.	—	
II.	<i>Criticus</i>		XXII.	—	
○ III.	<i>Criticus.</i>	Index V.	XXIII.	—	
* IV.	—	Index VII.	XXIV.	—	
○ V.	<i>Criticus.</i>	Index VII.	XXV.	—	
* VI.	Pseudocriticus.	Tyrannus.	XXVI.	—	
VII.	<i>Criticus.</i>	Index IX.	○ XXVII.	—	
SEPTENARIVM II.			SEPTENARIVM V.		
* VIII.	—	Index XI.	* XXVIII.	—	
○ IX.	<i>Criticus.</i>	Index XI.	XXIX.	—	
* X.	—		* XXX.	—	
○ XI.	<i>Criticus.</i>	Index XIV.	○ XXXI.	—	
XII.	—		XXXII.	—	
XIII.	—		XXXIII.	—	
* XIV.	<i>Criticus.</i>		XXXIV.	<i>Crit.</i>	
SEPTENARIVM III.			SEPTENARIVM VI.		
XIV.	—	Index XVII.	XXXIV.	—	
XV.	—		XXXV.	—	
XVI.	—		XXXVI.	—	
XVII.	<i>Criticus.</i>	Index XX.	XXXVII.	—	
XVIII.	—		XXXVIII.	—	
XIX.	—		XXXIX.	—	
XX.	<i>Criticus.</i>		XL.	<i>Crit.</i>	

H. Praecipit autem HIPPOCRATES: „Quæ diebus paribus inuasiones habent, eae diebus paribus decernunt, quorum vero accessiones imparibus diebus fiunt, imparibus iudicantur. „ Sunt autem impares dies 1. 3. 5. 7. 9. 11. rel., pares autem 2. 4. 6. 8. 10. cet. „In acutis quidem, inquit GALENVS, critici hi sunt: 3. 5. 7. 9. 11. 14. 17. in

in longis 60 et 80. Medii horum sunt 20. 34. 46. Impares autem et hi, qui multum in acutis pollent virtute, quod insignes, tum in salutem, tum in mortem, mutationes efficiant ^s). „ „ *Quartus* septenariorum index est, *octauus* alterius septimanae principium. *Vndecimus* etiam spectandus dies est, siquidem alterius septimanae quartus est. Rursus quoque spectandus *decimus septimus*, is enim a decimo quarto quartus est, et ab vndecimo septimus ^t). „ Sunt autem HIPPOCRATI, praeter designatos [*] diebus *paribus* decernentes, adhuc XLVIII. LX. C.: diebus autem *imparibus* decernentium, praeter indicatos (O), nullus ^u).

- I. Schema dierum criticorum docet, crises initio contingere ad typum tritaeum regularem, postea vero ad tetartaeum, et deinde ad septenarium: nonne autem id inde repetendum, quod crises sunt pugnae virium naturae et aegritudinum effectus, ut aut vires naturae per aegritudinem frangantur, aut aegritudo per vires naturae superetur, ut successu temporis serius contingant?

34. *Indicantes* aegritudines (indicantia, omisso sensu GALENII, id est latiori, nomine symptomatum,) dicuntur, quae agenda circa aegritudinem definiunt. *Coindicantes* sunt, quae consentiunt circa agenda. *Correpugnantes* sunt, quae conspirant in dissensu circa agenda. Notanda hinc

C 2

a. In-

s) Comm. IV. in HIPP. de vict. acut. p. 288.

t) HIPPOCR. S. II. aph. 24.

u) Cf. etiam V. SWIETEN II. 475. de HAEN. R. M. T. I. c. 4. p. 44 sq. ill. STOLL. R. M. T. I. p. 66 sq.

- a. *Indicatio*, quae est enunciatio, exponens modum, quo agenda circa praesentem aegritudinem perficienda sint.
- b. *Indicata*, quae sunt remedia, quibus agenda perficiuntur.
- c. *Curatio*, quae est ratio, qua quis agenda perficit, eaque est :
 - α. *Empirica*, vbi agenda ex analogia sola desumuntur.
 - β. *Rationalis*, vbi, praeter analogiam, agenda ratione et methodo definiuntur.

Animaduerfiones.

- 1. „Imitatore[m] esse oportet medicum non naturae tantum, sed et eorum, quae sponte euenientia profunt *).„
- 2. Natura ipsa perficit aegritudinum sanationem ope coctionis, vnde in congruo naturae regimine totum nititur medicantis officium; sed natura cuius propria est, ergo cuius sua competit medela. Idem minuit aegritudinum classificatio.
- 3. Indicatorum qualitates sunt tantum relatiuae ad aegritudines, non essentielles.
- 4. Aegritudo iubet ablationem sui, per cruditatis tale moderamen, vt fiat coctio, nisi iam ipsa sit critica.
- 5. Coctio praestatur pepasum.
- 6. Instante coctione omnia sic dirigenda, vt adiuuetur.

7. In-

k) GALEN. med. meth. IV.

7. Instante pepasmo, videndum, quae instet species designata, si plures expectandae, maxime leuatura aegritudinem promouenda, et pars ab iniuriis transeuntis, incumbentis, materiae defendenda: reliquae supprimantur, moderentur.
8. Crudum etiam mouendum, si fomes materialis inde tollitur y).
9. „Indicationes non desumuntur a syndrome, sed ab *adfectu* partis laborantis z).
10. „Necesse est, vt curationem suscipientes distinguant morbum et pathos a).
11. „Ceterum non functionis vitio, sed morbo ipsi, id est, *adfectui* praeter naturam, qui actioni incommodat, applicamus remedia b).
12. Indicant tamen circa morbum, causae, passiones, symptomata, epigenemata, et horum relatio ad morbum. Nam: „Therapia est ablatio facientium morbos causarum c).
- Szu: „Curatio est ablatio morbosarum dispositionum; sequitur autem eam et symptomatum ablatio d). Et: „Primario et maxime hoc sedulo agendum est medicis, ex-

scin-

y) GALEN. comm. in HIPPOCR. aph. L. 2. §. 29. et med. meth. XI. 15.

z) GALEN. med. meth. II. 4. p. 21.

a) GALEN. l. c. II. 3. et 7.

b) GALEN. l. c. II. 3.

c) GALEN. C. II in HIPPOCR. aphor.

d) *Idem* med. meth. XI. 3.

scindere morbos, cum quibus etiam reliqua symptomata auferuntur ^e). „

INTRODVCTIO IN AETIOLOGIAM.

Rerum euenta magis arbitror, quam causas, quaeri oportere, et hoc sum contentus, quod, etiamsi, quomodo quidque fiat, ignorem, quod fiat, intelligo.

CICERO.

Quamuis omnes medici, qui ratione et methodo quadam aegritudinibus tum cognoscendis, tum curandis, operam dant, facile in eo consentiant, earum causas praecipue esse rimandas atque aestimandas; fatendum tamen est, nos saepe non esse tam felices, ut aegritudinum causas vere agnoscamus, quin potius in iis eruendis saepe fallimur, non causas pro causis arripientes. Neque tamen, de medicinae certitudine ideo actum esse, credendum est, licet causarum definitio maximi omnino momenti sit; alia enim via datur, qua licet idem persequi, quod causarum aestimatio spondet. Recte enim Cl. THIERY ^f): „Wenn man zu der Untersuchung der allgemeinen Ursachen schreitet, vnd sie ordnet, wünscht ich, dass es mit vieler Vorsicht, vnd mit sichern Schritten geschähe. — Wie kann man sich in den Fällen, wo uns die Einsichten mangeln, die Wirkungen zu bestimmen, bis zu den Ursachen erheben? Ich sehe dabey nur eine Quelle. Man beobachte nur dasienige oft, was wir unveränderlich

^e) *Idem* med. meth. II. 7.

^f) *Erfahr.* in der Arzn. p. 49.

lich mit den einfachen vnd zusammengesetzten Krankheiten verbunden finden. Man schreibe die beständigen vnd unveränderlichen Wirkungen nieder, vielleicht werden wir einst bis zu den Ursachen zurückkommen. Die unveränderlichen Wirkungen sind das Ebenbild der Ursachen 8).

Quibus *similia* meditaturus eorum labores magni feci, qui ordinandis aegritudinibus, earum characteres constituendo, operam dederunt: simul vero eorum, qui affinitati aegritudinum artificiali systema superstruxerunt, non tanti habendos esse labores, facile perspexi, quanti omnino sunt aestimandi eorum, licet paucorum, et imperfecti huc usque labores, qui affinitatem aegritudinum naturalem praetulerunt, quorsum refero MORTONI, SYDENHAMI, BAGLIVI, HEBENSTREITII, MANGOLDI, DRUMMONDI, SCHROEDERI, Cl. SELLE, tum iudicia, tum labores. Nam, quoniam similitudo characterum constantium, essentialium, nos de similitudine causarum conuincit, non dubitavi, quin posset tum medendi methodus certa, tuta et prospera, aegritudinum affinitati superstrui, neglectis adparenter earum causis, aut dubie adpositis, tum aegritudinum causas posse in posterum egregie et inueniri et confirmari, postquam nimirum non paucis solum, sed plerisque medicis placuerit, et aegritudines ad lectulos aegrotorum secundum affinitatem naturalem scrutari, et de comparandis simul ac confirmandis earum characteribus essentialibus magis esse sollicitos, ut causas aegritudinum certe atque euidenter perspiciamus.

Suffi-

Sufficiat itaque in genere, tum causas definire, tum earum naturam exponere, deinde in specie quasdam ita venditas nosologiae et pathologiae reseruando. Igitur

AETIOLOGIA hic est doctrina de causis aegritudinum. CAUSSA vero tum est id, quod rationem aegritudinis in se continet, tum principium philosophorum, a medicis causae etiam nomine insignitum, seu id, ex quo intelligitur, cur quid esse possit. Causa igitur est:

A. *Proxima, continens; prima, per se agens* GALENI, causa, quae aegritudinis rationem sufficientem continet, qua posita aegritudo ponitur, sublata abest. Constat:

B. *Remotis, secunda* GALENI, „causa, quae, (sub conditione) per accidens, efficit, ut morbus existat. „GALEN. Neglectae, deinde definiendae, naturae aegritudinum perquam consentaneae, causarum distinctioni utrique subiungendas substituerunt distinctiones sequentes, quibus species et differentias necessarias addam.

a. *Praedisponens, proëgumena, antecedens, diathesis, seminium, aptitudo ad aegrotandum*, quae procliuatatem ad hanc vel illam aegritudinem concipiendam infert. Quorsum

a. *Naturalia seminia*, quae consentiunt cum sanitate:

α. *Communia*, quae unicuique homini insunt;

1. *Commercium animi, animae, viriumque corporis.*

2. *Aequilibrium virium facile mutabile.*

3. *Im-*

3. Impetus virium facile mutabilis et fugax.
 4. Nexus hominis cum vniuerso.
 5. Functionum omnium ac singularum conspiratio.
 6. Solidorum mutabilitas, affectiones, cohaesio et nexus.
 7. In specie, sensibilitatis vis in reliqua, et
 8. Irritabilitatis, et
 9. Cellulosae et vis mortuae ^h).
 10. Humorum copia et crasis mutabilis.
 11. Oeconomia, structura corporis, vt canalium conditio, numerus, implicatio, subtilitas, mollities, superficies, meatibus vndique patens.
 12. Ratio solidorum ad fluida mutabilis.
- β. *Propria*, quae subiecto tantum inhaerent :
1. *Temperamenta*, sanguineum, biliosum, melancholicum, phlegmaticum, *temperies*, calida, frigidaue; quae licet communibus maxime nitantur, alia tamen admittunt, vt propria sint,
 2. *Aetas*.
 3. *Sexus*.
 4. *Idiosyncrasia*, seu singularis hominis conditio, qua ipsi nocent, quae sexcenti ferunt impune et facile.
 5. *Consuetudo* actiua et passiva ⁱ).
6. *Praeternaturalia*, quae dissentiant cum sanitate :
1. *Haere*.

h) *Comm. Lips.* VIII. 123. XI. 483. XVII. 629.

i) *Comm. Lips.* VII. 510.

1. *Haereditaria diathesis.*

2. *Aegritudo simplex, spiritus morborum Cl. ISENFLAMM^k).*

b. *Prophasis, occasio, caussa occasionalis, procatartica, potentia nocens, quae ad illam accedens, proximam producit :*

a. *Gesta.*

1. *Animi pathemata, moeror, metus, terror ; ira, gaudium, amor, rel.*

2. *Quies, somnus, vigiliae, motus, status, sessio, decubitus ; indole, aut diuturnitate vel breuitate, nocentia.*

b. *Ingesta ; admissio :*

1. *Cibi, pescantis, copia maiori, minori, qualitate, aut propria, aut relatiua.*

2. *Potus, peccantis ratione, simili cibis.*

3. *Aëris, nimirum frigidi, calidi, sicci, humidi, densi, rari, electrici, inertis, diu reclusi, miasmatici, mephitici, subito alienati.*

4. *Toxicorum, tam venenorum, quam medicamentorum, et sub vario titulo 1 — 3. rel. venientium, interne adhibitorum.*

c. *Excreta, nimia quantitate aut qualitate tam naturalia et alias salubria, quam praeternaturalia.*

d. *Retenta, qualitate aut quantitate simili.*

e. *Externe adplicata, sub aëris, lucis, toxicorum, rel. forma, vestimentorum immundities, violentiae externae, rel.*

Omnis

k) *Comm. Lips. X. 696.*

Omnis aegritudo supponit *caussum proximam*, quae si constat diathesi et prophasi, ambarum *concursum*, quem si spectas, patebit, aegritudines per diuersam causarum rationem posse distingui in symptomata, passionem, morbos. Scilicet

1. Dantur aegritudines, quae sunt qualitates sensibiles alienatae, tum corpori adhaerentium, tum excretorum, et *symptomata* vocantur: quorum *caussum* si spectas, eadem est:

α. Vel *morbis*, vnde *epigenemata* dicuntur.

β. Vel *passio*, vnde *symptomata* (*symptomatum*) dicuntur.

2. Dantur aegritudines, quae sunt actionum et functionum hominis accidentia praeternaturalia, quarum, *passionum* voce insignitarum, *caussa* est:

α. *Morbis*.

β. *Causa peculiaris*.

3. Dantur aegritudines, quae sunt virium aequilibrum hominis accidentia praeternaturalia, peculiaris, et supponunt suas causas peculiares. Hae *morbis* vocantur.

Hae aegritudines essentialiter differunt. *Morbis* enim existit, licet saepe aegre agnoscat, quamvis nec passionem, neque *epigenemata* inferat. *Passio* autem existit tantum sub conditione praesentiae morbi. *Symptomata* tantum existunt sub conditione praesentiae morbi et passionum. *Morbis* omnis et aptus est producendis tot passionibus, quot dantur, et vere has illas producit, non eadem ratione *passio* vel *symptoma*. Quoniam

nam vero ratio esse debet, cur morbus hanc potius, quam aliam, passionem excitet, passio, praeter morbum, aliam etiam supponit causam, quae, cum morbo coniuncta, passionem producit.

Intelligitur itaque affinitas et dignitas causarum. Scil.

I. *Morbi causa*

A. *Proxima, continens*, est, quae morbi rationem sufficientem continet. Constat:

1. *Materiali causa, prima*, quae est causa, quae efficit, ut morbus existat.

2. *Formali causa, secunda*, quae efficit, ut morbus qua talis existat, et continet rationem differentiae morbi ab alio, per epigenemata, quae producit.

II. *Passionum causa proxima*, quae passionum rationem sufficientem continet.

1. *Materialis causa*, quae est causa efficiens, ut passio existat.

2. *Formalis causa*, quae efficit, ut passio qua talis existat, et continet rationem differentiae passionum, per symptomata, quae producit.

III. *Symptomatum causa proxima*:

1. *Materialis*, quae est causa efficiens, ut symptoma existat.

2. *Formalis*, quae efficit, ut symptoma qua tale existat, et continet rationem differentiae qualitatis sensibilis alienatae ab alia.

Hinc symptomatum causa formalis est aegritudo simplex, et redit ad causam remotam, tum praedisponentem, tum occasionem. Eorundem causa materialis est morbus.

Pas.

Passionum causa formalis est quoque aegritudo simplex, et nititur duplici causa remota. Causa autem materialis morbus est.

Morbi causae, tum materialis, tum formalis, admittunt ambae tum dispositionem, tum occasionem. *Passiones et symptomata* praeterea non raro admittunt *causam intermediam, intercedentem*, inter materialem et formalem.

Atque notandum est, in his causis saepe nec esse principium, nec finem. „Fit enim, ut idem interdum sit causa et symptoma, causa et adfectus ¹⁾„ v. c. Suppressa transspiratio. Imo passio excitata fit una causa morbi, v. c. pestis, variolae, rel.

Indicationes causarum verarum sunt prophylacticae, dum impeditur, ne aegritudo fiat, (et pertinent tum ad receptiuitatem corporis, tum ad prophases:) et aegrotationes prophylacticae tolerantur et probe diriguntur.

N. Aegre ne feras, L. B., quod causarum materialis et formalis aliam definitionem hic inuenias, ac dederunt alii. Quum enim non omnibus adhuc usitatae sint, voces facile sic definire potui, ut nomen rei adaptaretur, non contra.

1) GALEN. med. meth. XI. 13.

INTRODVCTIO IN NOSOLOGIAM.

Dabitari nequit, quin medicus aegritudines scrutetur, ut eas tollere, aut mitigare saltem possit. Itaque doctrina de aegritudinibus ita comparata esse debet, ut medicum bene et facile instruat, quo curationis consilia dirigenda sint. Conuenientia etiam atque dissidentia curationis, et conspirantem et repugnantem aegritudinum caussarum rationem supponens, naturam quoque aegritudinum reuelat. Nam quemadmodum bene GALENVS ^{m)} edixit: „Constat, tot esse medendi rationes, quot morborum ideae existunt:„ ita e contrario tot sunt morborum ideae, quot medendi rationes. Igitur oportet, ut aegritudines scrutaturus sciat, quo dirigendus sit methodus medendi. Audias igitur GALENVM, qui: „Vt enim in summa dicam, nullum symptoma, qua symptoma est, nec curationis rationem indicat, nec primum immutat. Monstratum enim est, ex morbis ipsis curationis indicationem praestari, veluti ex caussis ipsis prouidentiae ⁿ⁾„ Atque alibi. „Conueniunt in eo omnes, ad adfectum, qui functioni obest, curationis consilia esse dirigenda. Nemo enim v. c. sanat claudicationem, sed adfectum, qui hanc efficit, veluti phlegmonem, si eius vitio claudicatur ^{o)}„ Igitur non ad passiones, sed ad morbos respiciendum est in curatione, iudice GALENO; quare et *Idem*, „necesse erit,

m) Meth. med. II.

n) Meth. med. XII. I.

o) Meth. med. II. I.

erit , inquit , vt curationem suscipientes distinguant morbum et pathos p).,,

NOSOLOGIA est doctrina de morbis.

MORBVM autem definiunt syndrome symptomatum constans , passionum genesis, medendi methodus ei appropriata, supponens concursum caussarum peculiarium: vnde definiunt subiectum, praegressa, comitantia, iuuantia, laedentia, epigenemata, crises et solutiones, et horum omnium definita ratio.

Morbi causa proxima consistit in alienato aequilibrio virium hominis.

Morbi causa materialis est commercium, consensus, conspiratio, virium hominis.

Morbi causa formalis est alienatio vnius, alteriusue vis, estque:

Dispositio, quae redit ad receptiuitatem animae et vis vitalis, et seminia propria, et praeternaturalia, ac

Prophasis, quae redit ad conditiones, quo varii stimuli receptiuitati adplicantur.

Vnde patet, nec causam proximam, nec materialem vmquam esse obiectum curationis, sed causam proximam, atque materialem vbique esse eandem, hinc in speciebus morborum definiendis attendendum modo esse ad causam formalem, eiusque causas constituentes. Patet etiam, omnium morborum sedem vere esse in solidis, quod voluit BAGLIVVS.

Differentiae morborum sunt pariter, ac aegritudinum, *essentiales* atque *accidentales*. Quod *accidentales differentias* attinet:

I. *Ab*

p) Ibid. II. 3. et 7. ad fin.

1. *Ab origine* : quidam sunt haereditarii et congeniti, illorum exemplum sistit calculus, horum hernia, plethora infantis. Dantur aduentitii, ubi notandum est, dari simpliciores, non satis ab auctoribus definitos, sed passionum differentiis tantum insignitos, quos, quoad aetatem et sexum, ad quae referuntur, sub morbo anonymo commemorare placet. Dantur morbi protopathici, qui ex alio morbo non nascuntur, sed peculiarem csuffarum concursum sibi vindicant, et peculiarem poscunt medelam, dantur deuteropathici, qui ex morbo potius oriuntur, et hunc tamquam causam primariam agnoscunt, medelam etiam poscunt, quae potissimum congruit morbo primario, e quo nati sunt. Huius potissimum exemplum sistit neurosis, maligna dicta, scirrhus. Contagiosi dantur in distans et per contactum, veluti sepsis et scabies, syphilis. Dantur epidemici, ut saburra biliosa, verminosa, sepsis, et endemici, veluti trichoma.
2. *A sede*. Dantur vniuersales, veluti plethora, sepsis, scorbutus, et particulares seu topici. Hos, si syndrome est peculiaris, tamquam morbi differentias, enarrare placuit in nosologia, v. g. calculum renum et vesicae: quodsi solent ab auctoribus ad passiones referri, v. g. cataracta calculosa, in pathologia, ad morbum attinente, speciali, commemorantur. Vnde, hi passiones dicantur protopathicae, reliquis passionibus

bus deuteropathicis dictis. Dantur idiopathici, veluti trichoma et sympathici, vti, scrophulis abdominalibus praesentibus, oriundae glandulas colli cet. obsidentes. Morbi protopathici transeunt in idiopathicos, hi in illos, veluti pyogenia, arthritis, ostendunt.

3. *Ab indole*: sunt leues, graues; magni, parui; regulares, irregulares, benigni, maligni, anormali, corrupti, actiui, vt sepsis, passiuui, vt scorbutus, scirrhus, vt tamen transeat vnus in alterum.
4. *Ab euentu*: sunt periculosi, securi; insidiosi, fidi, indifferentes, ancipites; prauui, detrimentosi, salutare, sanabiles, insanabiles, letales; perseverantes; recurrentes.
5. *A forma et constitutione*: sunt simplices et compositi, hique comitati, complicati, consecutiui, complexi et confusi, celeres et tardi, acuti et chronici, anabatici et homotoni, epacmaistici et paracmaistici, continentes, remittentes, intermittentes, suppressi, et reuocati, recurrentes, periodici, typici; atypici; crudi et cocti; et crises et solutiones subeuntes, atque indicantes.

Atque hae accidentales differentiae nituntur tum essentialibus, tum modificatione earum, qua passiones et symptomata producuntur.

Differentiae morborum essentialis redeunt ad causam formalem et enarrantur in nosologia.

Causae itaque formalis consideratio summi omnino momenti est, atque attendenda ex utraque eam componente, potissimum dispositio, atque iterum in hac maxime semina naturalia, eademque in primis communia, quae non sunt ab auctoribus pro dignitate sua considerata. Itaque pauca liceat brevibus attingere, quum arduum sit, in re graui viam primum pandere. commercium virium hominis vnam perspicere liceret, at licet tantum ex effectu ad eius modificationes concludere. Virium aequilibrium ideo facile mutari posse videtur, quod *impetus virium* facile mutari potest. Hic vero, HIPPOCRATI iam cognitus, τὸ ἐννεμῶν, a paucis aestimatus, agnoscitur tantummodo per effectus q). Sed haec eius videtur esse lex: ut impetus vis vnius augeatur sub imminuto impetu vis reliquae vtriusque, et imminuatur sub incremento impetus vis vtriusque reliquae. Atque idem continere potissimum videtur rationem sufficientem passionum, maxime deuteropathicarum, dum idem adficitur et mutatur ratione mox dicenda. Nexus hominis cum vniuerso per se patet, et maxime medium est, quo occasio agat coniuncta cum dispositione. Maximi certe momenti est sympathia corporis humani, quae cur adeo et in physiologia et in pathologia, quam dicunt, neglecta sit, non capio. Itaque confert, eius leges generales saltem eruere, quantum licebit. *Sympathia*

I. Nititur affinitate virium:

A. Per-

- q) Impetus differt per aetates, epidemicam constitutionem, vitae genus, (solidorum dispositionem, familiis etiam communem. Comm. Lips. XVIII. 204.)

A. *Perfecte similia*, v. c. sensibilitas, sensatio variarum partium, irritabilitas, rei., agnoscit legem: maior vincit minorem, atque cum maiori impetu virium aequilibrium affligit.

B. *Proxime similia*, v. c. vis nervosae atque irritabilitatis, irritabilitatis et vis mortuae.

II. *Similitudine structurae*.

III. *Nexu partium* ^r).

Sed quando *tum* vim meditor et potestatem, quas habent ventriculus et intestina in totam corporis humani oeconomiam, *tum* aestimo, eadem plerumque esse obiectum curationis, dum pleraque certe remedia ad ventriculum et intestina deferuntur, et horum actio maxime in mutatione eorum consistit, ut aegre plerumque credas, medicamenta ad alias partes deferri, denique medela etiam externa potest in ventriculum et intestina agere per sympathiam; existimem, omnino inducor, cum utilitate medicinae posse sympathiam in *internam* et *externam* distingui: ut illa denotet sympathiam ^s), per ventriculi et intestinorum modificationes explicandam, haec quae alii rationi debetur. *Eius* legibus inveniendis iam aliquamdiu operam dedi, nec tamen adhuc adeo certas erui, ut proponere placeat, id tamen in uniuersum dicam, intercedere has *leges*:

a. Sensilitate gastrica (ventriculi et intestinorum) aucta, imminuitur eius irritabilitas, hac imminuta augetur palpitatio, etiam cellulosae ^t) competitens, seu vis etiam mortua.

D 2

b. Irri-

r) Cf. REGA, aliique de sympathia C. H.

s) Comm. Lips. XIII. 208.

t) Cellulosae competit tum secundum naturam, quod docent ira,

- b. Irritabilitate gastrica aucta, imminuitur irritabilitas cordis, augetur irritabilitas vasorum: et contra, imminuta alienatio similis.

Quod *externam* attinet, notandum potissimum est sympathiam esse aliam, cum tono, secundum latera hominis v). Sed omnia docent veritatem dicti HIPPOCRATIS: „Confluxio vna, conspiratio vna, consentientia omnia. „

Inde igitur oriuntur aegritudines simplices: laxitas, teneritudo, rigiditas, spasmus, atonia, tremor, palmus, irritabilitas produciens motus inscios, ecstasis, catalepsis, torpor, paresis, sensibilitas, insensibilitas, anæsthesia, sensibilitas alienata, et erehismus, eclipsis, paralyxis, asthenia, dolor, stupor, anodynia, diductio, angustia, coalitus, disiunctio, vulnus ex parte, ectopia, procidentia; ex harum cum varia prophasi conjunctione, dyscrasia, cacochymia, inertia, mixtio inæqualis, vitiosa quantitas, motus humorum vitia.

Atque his demum omnibus, horum scilicet vario concursu, et varia modificatione per sympathiam et impetum, nituntur differentiae morborum essentielles, et excitatio passionum et symptomatum.

Maximæ

ira, metus, fletus, catamenia, coitus: tum præter naturam, quod comprobant spasmi, febres, phlegmasiæ, exanthemata, in specie hydrophobia, hæctica, hemitritæus, variola.

Cf. Comm. Lips. VIII. 123. XI 483. XIII. 208.

u) Cf. Comm. Lips. I. 572. II. 222. VIII 461. suppl. dec. I. 428. XI. 529. 645. XV. 650. XVII. 425 sq. SAUVAG. tetanus sp. 9. et ephidrosis sp. 8. et atrophia sp. 15. Cf. et pneumophthoën, hydrothor. cet.

Maximae itaque utilitatis esset omnino, has aegritudines seorsim cum industria scrutari, quum inde non morborum solum ratio intelligi posset, sed passionum etiam, quae simili omnino ratione nituntur. Dolendum itaque, tot obici huic persequendo labori difficultates, ut de congrua earum tractatione huc usque desperes.

Indicationes morborum sunt:

- I. *Prophylacticae*, quae desumuntur a causa, ad praecauendum morbum, euitando prophases, et mutando, quantum licet, receptiuitatem.
- II. *Curatoriae*, quae ad praesentem morbum spectant, et desumuntur a causa, ad tollendum aut mitigandum morbum.
 - a. Euitando prophases.
 - b. Rescindendo mutationes praeternaturales, inde inductas, excitando et promouendo coctionem, et adiuuando, excitando passiones salutes, ut vel pepsis vel pepasmos producat.
 - c. Mutando, quantum licet, receptiuitatem:
 - α . Ad tollendum morbum praesentem.
 - β . Ad praecauenda, recidiuam, aut morbum nouum.

Hae differentiae, quibus fit, ut varia ratione id perfici medicus debeat, lumen dant ad agnoscendas morborum differentias.

INTRODVCTIO IN PATHOLOGIAM.

PATHOLOGIA est doctrina de passionibus. PASSIONVM naturam tum in introductione, tum in ætiologia dixi: scilicet PASSIO dicitur syndrome symptomatum, quae partim morbo, partim ægritudini simplici, seu causssae peculiari, debetur, et quae referri solet ad quamdam corporis humani partem, quaeque symptomatum quoque auctor existit.

Earum causas supra diximus in ætiologia, et quidquid definiendum superest, post commemorationem differentiarum essentialium ponendum erit.

Earum *differentiae accidentales* eadem sunt, atque ægritudinum in vniuersum et morborum, adeo, vt multae ad has potius referendae sint, quam ad morbos. Aliquando autem dubium nascitur, num quaedam ad passiones potius, an ad morbum spectet, v. c. contagium, quod fere potius morbo conuenit, quam passioni. Quare eas si bene rimaris, multa poteris, eaque difficiliora, facile explicare.

1. *Ab origine*: quaedam sunt *haereditariae*, vt haemoptysis, et *congenitae*. vt icterus, *aduentitiae*, plurimae, *protopathicae* proprie nullae, sed morbi topici ita salutantur, vt diximus in introductione ad nosologiam, *deuteropathicae* proprie omnes, *contagiosae*, vti dixi, forte non dantur, sed simulantur, dum morbi sunt. *Sporadicae* plurimae, dantur tamen et *pandemicae*, dum morbi per vnā potissimum passionem modificantur. Dantur et
ende-

endemicæ, v. g. febris intermittens, bronchocele, quamuis morbo proprie debeantur. *Stationariæ* et *intercurrentes* omnino deprehenduntur.

2. *A sede.* *Vniuersales* omnino sunt, v. g. febris, et plurimæ *topicæ*, quæ et in morbum idiopathicum interdum transeunt, quod bene notandum, *habituales* dicendæ, dum sunt, *idiopathicae* occurrunt, dum morbus topicus est, plurimæ sunt *sympathicae*. Sunt et *fixæ* et *retrogradæ*, *externæ* et *internæ*.

3. *Ab indole.* *Frequentes* sunt *leues* et *graues*, *magnæ* et *paruæ*, *regulares* et *irregulares*, *benignæ* et *malignæ*, *anomalæ* et *corruptæ*. *Actiuæ* autem et *passiuæ* maximam attentionem sibi vindicant, de quibus deinde.

4. *Ab euentu, a forma et constitutione, et solutione* differentia omnes frequentissime occurrunt. *Ce-leres*, *tardæ*, *acutæ*, *chronicæ*, *continentes*, *re-mittentes*, *intermittentes*, *periodicæ*, omnes sunt adeo, vt in pathologia idem merito omit-tatur. Atque omnino, eos naturam ægritudi-num non sufficienter perscrutatos esse, putes, qui vbique passionem ad vnâ modo eiusmodi diffe-rentiam euenientem descripserunt. *Differentiæ* *passionum essentialis* poni possunt sequentes.

I. Quæ citra vicissitudines perseverant, *simplices*, seu vna relatione conspicuæ, *passiones* proprie di-cendæ, aut quæ vicissitudines, tempora subeunt, imo in his ad varium morbum pertinent, adfectus
dicen-

dicendae. *Illorum* exemplum sistit ischūria, *horum* variolae. *Illae* passivae, *hae* activae.

- II. Sunt, vbi in partibus, ad quas referuntur, vera alienatio constitutionis obtinere, suadent argumenta: sunt, vbi non est.
- III. Sunt, quae actiones, functiones partium depravatas sistunt, veluti dyspnoea, aut quae statum praeternaturalem perfecte redolent, veluti febris.
- III. Sunt, quae tamquam aegritudines simplices, verae tamen passionēs, quum morbo debeantur, *primariae* vocari possunt, dum ex harum cognita natura, nonnullis compositis, non neglecta simul sympathia, natura omnium passionum intelligitur; sunt, ex quibus non potest, *secundariae*.
- V. *Illae*, *primariae*, vel aegritudines potius simplices sunt, quorsum debilitas, laxitas, inertia, flexilitas, teneritudo, tabitudo, fragilitas spongiosa, fissilitas, rigiditas, tenacitas, durities, fragilitas vitrea, spasmus, atonia, tremor, palmus, tetanus, convulsio, eclampsia, epilepsia, ecstasis, catalepsis, dicta ratione, torpor, paresis, sensibilitas, insensibilitas, anaesthesia, sensibilitas alienata, erethismus, paralyxis, eclipsis, asthenia (debilitas), dolor, stupor, anodynia, diductio, dilatatio, anastomosis, diapedesis, diacresis, ruptio, diabrosis, emphrexis, constipatio, compressio, collapsus, contractio, symphisis, vulnera, fractura, fissura, autritio, coalitus, disiunctio, ectopia, procidentia, conformatio vitiata, enormitas, tumor, mutilatio, dyscrasia, spissitudo, fluxilitas, secessio
- par-

particularum nimis facilis, cacochymia, inertia, mixtio, inaequalis, quantitas aucta, imminuta nimium, motus intestini, progressiui, humorum vitia: atque ex harum concursu, tamquam caussis, aliae componuntur. *Vel* ipsae iam sunt magis compositae passionēs, quas pathemata vocare poteris, quorsum referenda febris, phlegmasia, rel.

VI. *Hae*, (n. IV.) secundariae, *vel* aegritudinis etiam simplicis aut symptomatum nomen sibi vindicant, v. c. fudor, *vel* passionēs sunt verae.

VII. Sunt, quae ipsas vires vitales adfligunt, indeque coctiones, crises morbi aut tollunt, aut impediunt vel remorantur: sunt, quae eas non tenent, sed earumdem ex parte effectus sunt, et criticae fiunt in morbis.

VIII. Sunt, quae cum morbo comparent, et cum eo recedunt, sunt et, quae *vel* ante morbum praesentes sunt, *vel* post eum solutum permanent.

VIII. *Illae vel* debentur aegritudini simplici, et modificantur a morbo, *vel* morbi ipsius causa remota sunt, et dein modificantur a morbo, v. c. variolae interdum.

X. *Hae*, si ultra morbum persistunt, *vel* aegritudinem simplicem constituunt, *vel* morbum topicum, passionem protopathicam, quam dixi.

Ex propositis hactenus differentiis liquet, causas passionum non posse plenius exhiberi, quam supra propositae sunt, nisi maiorem catalogum conscribere quis velit, quam licet per deficientes causarum in pathologia speciali definitiones. Dies igitur diem docebit.

In.

Indicationes passionum.

1. Passio, adfectus, exposita varia ratione praesentes, iubent ablationem sui, nisi coctionem, vel solutionem morbi, adiuuant, aut criticae sunt, aut futurae sunt.
 2. Passiones coctionem potissimum, vel solutionem, aut impediennes aut retardantes, si licet, rescindantur ante coctionem vel solutionem.
 3. Eadem, designans crisin, per eandem partem futuram, eidemque viam pandens, toleretur, adiunetur.
 4. Eadem, si occasionem morbo suscipiundo praebet, vel simplici, vel composito, rescindatur, si licet et expedit.
 5. Nisi sponte cum morbo, aut hoc superato, cedit, rescindenda, maxime si occupat partem nobiliorem.
 6. Mutatio passionum suscipiunda definitur per suas causas tum materiales, tum formales, quibus responderi debent agenda.
-

INTRODVCTIO IN SYMPTOMATOLOGIAM.

SYMPATOMATOLOGIA est doctrina de symptomatibus.

SYMPTOMA *in sensu latiori* GALENI est, quidquid animali praeter naturam accidit: *in sensu strictiori*, separatis, morbo, passionibus, causis, rel., est sensibilis a sanitate recessus, aegritudinis sequela.

Quod

Quod *differentias* symptomatum attinet, sunt

- I. *Excretorum*, quae ad excreta pertinent.
- II. *Qualitates corporis alienatae* seu *mutatae*.
- III. *Functiones* seu *actiones*, *laesae*, iam *eximendae*, quae *passiones* sunt.
- IIII. *Sunt effectus*:
 - A. *Causarum morbificarum*, *aegritudinum simplicium*.
 - B. *Morborum*, *epigenemata dicta*.
 - C. *Passionum*, *pathognomonica*.
 - D. *Symptomatum*.
 - E. *Aegrotationum*, *symptomata actiua*.
- V. *Necessaria*, *essentialia*, *inseparabilia*, *propria*, *primaria*, quae sub omni aegritudinis conditione adfunt: *vel non necessaria*, *accidentalia*, *assidentia*, illis *opposita*. *Illorum*
 - A. *Ea perpetua*, *indiuia*, *simultanea*, vocantur, quae per totum aegritudinis decursum adfunt.
 - B. *Ea temporaria*, *successiua*, dicuntur, si non adfunt. *Horum*
 - A. *Ea epiphaenomena*, *superuenientia*, post *accidentia*, nominantur, quae post exortum aegritudinis comparent.
 - B. *Ea Synedreuonta*, *assidentia*, *mox adparentia*, quae statim sub aegritudinis ingressum spectantur x).

PIE-

x) Cf. GALENVS de symptom. causis. III. 5. meth. med. I. 8. II. 1. In aph. Comm. I. 12. m. vulg. Comm. III. 3. t. 34. Comm. in progn. HIP. I. t. 27. de Art. cons. c. 15. p. 79.

EPIGENEMATA sunt, quae essentialia morbi symptomata sunt, et comparent, aut nullam, aut quamcumque passionem excitet morbus.

PATHOGNOMONICA sunt, quae passiones quasdam comitantur, sub omni morbo passioni essentialia, et passionem ab alia discernunt.

ANONYMA, *pathognomonica diagnostica*, sunt, quae ex concursu morbi et passionis oriuntur, et diagnosin praebent, et passionem vnius morbi a simili passione alterius morbi discernunt. Confert omnino, de *affinitate et discrepantia aegritudinum* tum omnium, tum cuiusque quaedam adhuc differere.

Egrege CELSVS y): „Sic medicinam ortam, inquit, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciofa discernentem a salutaribus. Repertis deinde iam medicinae remediis, homines de rationibus eorum differere coepisse; nec post rationem, medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quaesitam. — Primo autem remedia exploranda summa cura fuisse, nunc vero iam explorata esse: neque vlla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quod si iam incidat malignus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris; sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia illis, quae vicino malo saepe succurrerint, et per eius similitudinem opem reperturum., Ex qua enunciatione facile colligere poteris, CELSO iudice, summae vtilitatis esse systema aegritudinum, affinitati earum-

y) De med. praef. p. 9.

earumdem naturali, seu caussali superstructum, vt ignota hactenus aegritudo, aut minus saltem cognita, facile possit curari, dum medela eadem fertur, quam illi similis aegritudo suader. Quoniam vero caussarum ratio difficilis saepe est agnitu, et omnis medicina orta est per medendi rationem, dum ad conuenientiam aut repugnantiam caussarum concludebant, et hodie etiam medela aut similis, aut dissimilis, de affinitate et discrepantia aegritudinum nos conuincit, similes aut dissimiles causas esse, docens, systema aegritudinum merito superstruitur affinitati et discrepantiae medelae. Itaque non est, quod dubitemus, inquisitionem in affinitatem et discrepantiam aegritudinum summae utilitatis esse, eam nimirum, quae caussis debetur, aut medendi methodo, caussis certe respondentem, quod iam HIPPOCRATES dixit: „ostendit sanatio.“

Diximus, tot esse morbos, quot medendi rationes, seu peculiaris et primaria caussarum syndrome. Igitur affines sunt *causae eae primariae et morbi*, dum eandem fere aegritudinem constituunt, vt tamen morbus eae causae dicantur, quando epigenemata et passionibus inde excitantur, seu quum causae concurrentes maxime in se agunt.

Morbi et passionibus in eo sunt affines, quod ambo excitent symptomata, quod similes causas supponant, quod morbus idiopathicus et passio protopathica eandem aegritudinem constituent, mediam quasi inter morbum et passionem (cf. introd. et pathol.). Imo, quod passionibus, nonnullae saltem, tot etiam passionibus excitare saltem videantur, quod morbus producit, vt
variolae

variolae docent. Sed *discrepant* in eo morbus a passionibus, quod hae morbum tamquam causam ex magna parte agnoscant, quodque passiones passionibus aliis producendis re vera aptae non sint, sed idem dum videtur, epigenesis est passionum. Id enim comprobatur medela.*) Scilicet ponamus adesse variolas, easque verminosas, atque simul comparere aut superuenire anginam, pyralismum, phrenitidem, pleuritidem, rel., tum hae quidem dicuntur variolosae, at minus recte. Debentur enim vermibus, et poscunt medelam anthelminticam. Quodsi variolis deberent, peculiarem, variolis in specie aptam, medelam poscerent, quod non est. Haec tamen a plerisque male neglecta esse videntur. Deinde morbus etiam hoc sibi peculiariter vindicat, quod metaprosin inferat, seu quod passiones variae, permanente eodem morbo sibi succedentes producantur.*) Sic „vir corripiebatur febris, ardenti simili, quae aliquot post diebus in simplicem et legitimam tertianam mutabatur. Haec vitio sex rerum non naturalium, duplicabatur primo, deinde vero in quotidianam degenerabat; ex ista rursus tertiana simplex fiebat, sed eius in locum, horis paroxysmi, inuincibilis sopor succedebat, quo depulso tertiana simplex denuo aderat ^z). „Vir etiam, 40 annos natus, aestatis tempore incidit in febrem acutam, continuam, cum delirio, quae septem dies duravit, absque perfecta crisi soluta. Sed lapsis duodecim horis, successit quotidiana intermittens, quae post

*) Haec comprobantia forte demum post succedentia intelligi poterunt. Expedit tamen, haec coniunxisse.

^z) Ephem. Vratisl. T. XIV. p. 607.

post duas horas, in tertianam exquisitam, per tres hebdomades durantem, mutabatur, quam deinde quartana, hanc vero octana excepit. Secuta ultimo est purpura vrricata, per binas hebdomades, quae denique in trium septimanarum febriculam lentam desierat. Quibus omnibus finitis, superfuit oedema pedum cum vibiciis liuidis latis; his quoque defunctus aeger tandem perfecte conualuit ^a).,, [Alia exempla taceam.]

Num vterque aeger tot morbos sustinuit, quoties vnus morbus differentes excitauit passionēs? Nonne eadem fere in vtroque morbo medela, sub varia etiam passione? Ita videtur: quamuis fiat, vt et morbus interdum mutetur, et varias excitet passionēs, veluti plethora transiens in pyogeniam.

Affines etiam in eo sunt passionēs et morbi, quod dictis nititur, quod differentias accidentales propositas habeant communes, vt tamen in quibusdam *differant*, quod dixi in pathologia. Aliam affinitatem nosologiae subiiciam.

Passiones et symptomata affines in eo sunt, quod ambo sint effectus causarum et morbi quidem, eorumque praesentia vere vix ultra morbum duret, nisi noua causa successerit, differunt autem in eo, quod passionēs aliis etiam excitandis symptomatibus pares sint, quod earum causae formali debetur, nec de symptomatibus statui potest.

His in genere expositis affinitas, et discrepantia aegritudinum inter se, nimirum morbi et morbi, passionum et passionum, rel. proponendae essent, quoniam vero haec supponunt cognitionem specialem naturae harum

a) A. N. C. vol. I. obs. 215. p. 476.

harum aegritudinum omnium, oportet, vt hae demum nosologiae, pathologiae, et symptomatologiae subiiciantur.

Sequi iam deberet nosologia. At vero quoniam euitari vix potest, quin symptomata et passioness indicentur, quae tamquam epigenemata commemorari debent, mutare ordinem, et praemittere pathologiam, combinata ex parte symptomatologia, proficuum videtur.

Atque in enarranda pathologia generales passiones primarias praemittere placet, vt ex his facilius secundariorum natura intelligatur, non studiose in his seiunctis adfectibus et passionibus, tum adiunctis symptomatibus, quarum indoles ex iam dictis facile diiudicatur.

At quis in proponendis passionibus ordo seruandus? Responderi vix potest, nisi de passionum notione, affinitate et discrepantia dictum, imo nosologia adumbrata fuerit, igitur haec alibi proponere placet, ordinem sequamur, cuius rationem alibi daturi sumus, anatomicum, tum passionum denominationi, tum plerorumque consuetudini, tum quodammodo affinitati, respondentem.

P A T H O L O G I A

G E N E R A L I S.

Tentabimus, sermonem transigere, neque prolixius scribentes, neque aliorum errata corrigentes, sed solam veritatem amplectentes, ex qua quispiam instructus etiam aliorum delicta comprehendat.

GALEN. *de differ. febr.* L. 2. C. 11.

Satius est, rerum differentias intelligere, quam contendere de nominibus.

GALEN. *de loc. aff.* L. 1. C. 6.

PARALYSIS. Partis, sensui et motui, aut alterutri, destinatae, priuatio sensus et motus, aut alterutrius, cum laxitate, pulsu inaequali, molli, tardo, aut omnino nullo, in parte adfecta, aliquando et febris, dolore, conuulsione particulari.

a) perfecta. PARALYSIS. Perfecta priuatio sensus et motus in parte, sentiente et motum exercente.

b) imperfecta. PARESIS. Vbi vel sensus vel motus plus minus superest, aut paralytis adhuc fit.

N. Vtraque referri solet ad nervos et fibras musculares, musculos, hinc frequenter dicitur obuenire in lingua, labio oris, oculo, palpebris, vesica urinaria, oesophago, ventriculo, intestinis, cole, extremitatibus: pulmonibus, corde (mors est); sed, quum vim irritabilem et sentientem, ultra neruorum et musculorum imperium, ut debes, extendis, in alias etiam partes cadit, et fere omnium passionum videtur esse essentia, licet in alia saepius parte existat, ac passio. Distinguenda, per PAVLUM et AVRIVILLIVM, secundum causam.

α. *apoplectica*. apoplexiae comes et pedisequa, ex vitio capitis.

β. *Spinalis*. ex vitio medullae spinalis.

γ. *Singularis* ^a).

PARAPLEGIA. Paralytis, relata ad dimidium transversum corpus, plerumque inferius: enuresis, anaphrodisia, alius inscie reddita, anaesthesia, marasmus.

HEMIPLEGIA. Paralytis alterutrius lateris corporis, cum mente integra.

VESANIA. Imaginatio, adpeditus, iudicium, memoria, abnormes. (Nonne paralytis partis cerebri?)

^a) Vid. PAVL, AEGINETA L. III, c. 18. AVRIV. in BALD. coll. diss. I. p. 192 sq.

SYNCOPE. Subitanea virium omnium animalium et vitalium, sensuumue tanta imminutio, ut aeger sui conscius non sit, sub lenta leniue respiratione, pulsu obscuro, sudore frigido, et aliquali calore interiorum, pallore.

LIPOTHYMIA. Subitanea et brevis syncope minor, cum pulsu et respiratione minus oppressis, et adstantes cognoscendi facultate, aurium tinnitu, vertigine.

ASPHYXIA. Subitanea omnium actionum, naturalium, animalium, vitalium, eclipsis seu prostratio, vera mortis imago, mors adparens.

ASTHENIA. Debilitas artuum, maior debilitate actionum vitalium, quae cum sensibus citra dolorem persistunt: augmentum a situ supino.

ANAESTHESIA. Tactus in toto corpore, citra stuporem, soporem, debilitas, imminutio.

ATONIA. Toni corpori, aut parti, competentis priuatio: laxitas, pulsus rari, tardi, molles, debiliores, sub arteria lata; vrina cruda, lateritia, limpida. Faciei, genarum saepe phlogoses.

SPASMVS. Partis, irritabili natura conspicuae, ea constitutio, ut maior, aut alia contractio, aut diutius persistens, sequatur, quam stimuli admissi alias producant. In specie: contractio maior, diuturna, permanens b).

Pulsus duri, stricti, depressi, vrina pallida, nausea, cardialgia, pedum refrigeratio, extremorum rigor, tremor, borborygmi, obstipatio.

CONVULSIO. 1. Spasmus antagonistarum alternans.

2. Agitatio inuita artus, vel musculi, brevis, cum superstita exercitio animae.

3. Spasmus cum atonia in parte alternans. Varie sumitur c).

ECLAMP.

b) Contractio permanens, cum partis adfectae immobilitate *spasmus tonicus* dicitur. Spasmus habitualis quibusdam *S. Viti* nomine insignitur.

c) *Prima*, proprie est convulsio. *Tertia spasmus clonicus* seu convulsivus dicitur, ubi spasmus mox cessat iterumque recurrit, partem alterno motu succutiens.

ECLAMPSIA. Conuulsio acuta cum sensuum obscuratione.

EPILEPSIA. Conuulsio chronica, intermittens, cum sensuum obscuratione:

a. vniuersalis, quae ad totum corpus spectat.

b. particularis, quae a membro oritur, vt in hoc detineri possit d).

TETANVS. Exercitium irritabilitatis subito ortum, persistens cum dyspnoea, sensu constrictionis sub processu ensiformi: corpus totum inflexile, partis, musculorum rigiditas. Signa spasmi.

Habet stadia tria e).

EMPROSTHOTONVS. Tetanus corporis anticus.

OPISTHOTONVS. Tetanus corporis posticus.

CATOCHVS. Exercitium irritabilitatis pertinax, sensum ortum, citra dyspnoeam.

HYSTERIA. Exercitium irritabilitatis varium, constans, cum impetu, fugaci, et subito mutabili. Globus abdominalis (sensus ponderis in abdomine se voluentis, ad ventriculum ac fauces adscendentis et strangulantis) ee), dyspnoea, carus, dysphagia, frigus occipitis, lumborum, extremorum, clauus, vmbilici retractio, vrinae copiosae, limpidae, pulsus stricti, depressi.

HYPOCHONDRIASIS. Exercitium irritabilitatis varium, potissimum ad viscera hypochondriaca, diuturnum: dyspepsia, languor, torpor, metus, moeror, vertigo, palpitatio, dyspnoea, adiapneustia: saepe ingenii et appetitus ciborum vigor.

DOLOR. Exercitium tactus, animum ingrate adficiens.

ANODYNIA. Absentia doloris, licet status corporis cognitus suadeat, animum ingrate adfici debere.

RHEV-

d) PAVLL. AEGIN. L. III. c. 13.
BOERHAAVE. conf. 2. SAUV. sp.
2. 8.

e) Comm. Lips. VIII. 304.

ee) Irritabilitas, palpitatio varia peritonaei, cum pleura, mediastino, communicata.

RHEVMATISMVS. (Frigidus Auct.). Subito oritur dolor carnis, grauius, pressorius, tensius, citra tumorem et ruborem, mobilitatem partis non omnem suspendens, a stragulorum et fotuum colore auctus, febrem praecedens, si adest, late diffusus, a parte in aliam migrans, sed recurrens facile.

MYOSITIS. (Rheumatismus calidus, acutus Auct.). Dolor topicus musculorum, noctu diuque discrucians, motum fere omnem vetans, noctu exacerbans, sanguis missus, corium pleuriticum exhibens, pyrexia. (Inflammatio musculorum).

PYREXIA. Perinanens velocitatis sanguinis abnormitas, per alienatum potissimum, subiecto proprium, calorem, conspicua. Siccitas faucium, (fitis).

a. actiua.

b. passiuā.

Vtraque exacerbationes subit:

1. *matutinas*, rariores.

2. *vespertinas*, frequentiores.

3. *nocturnas*, non raras.

N. Apyrexia vocatur absentiae pyrexiae, febris, tempus.

PHLEGMASIA. (inflammatio Auct. phlegmone, in corporis peripheria) ^f). Pyrexia, dolor topicus, laedens functionem partis, quam occupat: sanguis missus, corium inflammatorium exhibens.

a. *acuta*:

a. *designata*, dicta.

b. *occulta*. Pyrexia, laesa partis functio, indeque oriunda symptomata, cum dolore aut nullo, aut leuiori ex actu. Vtraque:

α. *ficca*, nulla humoris excretionē stipata.

β. *humida*.

^f) *Plegmone*, in specie dicitur dolore pulsatili insignis, in pyogeniam transiens.

β. *humida*: exsudatione inflammatoria, *HVNTERO* dicta, stipata, vbi circa peripheriam partis inflammatae humor (lymphā, mucus) exsudat.

b. *chronica*. (*Infarctus auct.*). Signa phlegmasiae occultae, latentis, tardantis; sanguis missus, atrum cruorem, rubicundiori maiori copia admixtum, aut corium pleuriticum, exhibens.

HAEMORRHAGIA. Profusio sanguinis cum pyrexia actiua.

PROFLUVIUM. Profusio sanguinis cum pyrexia passiva, aut nulla; laxitas vasorum, indicata v. g. genarum colore roseo.

APOCENOSIS. Profusio humorum reliquorum, cum pyrexia passiva.

FEBRIS. Permanens velocitatis sanguinis abnormitas, per vicissitudines caloris, subiecto proprii, potissimum conspicua, siccitas faucium, sitis.

a. *actiua*. Sub viribus artuum imminutis, pulsus frequentes, celeres, fortes, respiratio celeritate, magnitudine, frequentia, aucta.

b. *passiva*. Sub viribus vitalibus integris, auctisue, virium artuum notabilis imminutio, pulsus frequentes, celeres, debiles, parui, respiratio celerior.

In vtraque horror, frigus, rigor, calor, se excipiunt, sensus caloris in subiecto augetur, imminuitur.

Est vniuersalis, et partialis g), ad variam partem h).

Febris passio est *GALENO* i).

N. Nonne pyrexia omnis, febris, phlegmasia, haemorrhagia. testis est sympathiae vtriusque, externae, internae? Nonne inde differentia pyrexiae activae et passivae? Nonne haec maioris ponderis, quam, confusiones facile pariens, nullius etiam utilitatis, distinctio pyrexiae, et febris potissimum, in inflammatoriam

et

g) Comm. Lips. VI. 221. XVI. 71, v. *SWIETEN* II. 534.

h) Comm. Lips. V. 408.

i) De cris. L. 2. C. 13.

et putridam? Num veterum de febribus doctrina, potissimum GALENI, quem omnino sequuntur Arabes, adeo vituperanda? Non videtur. Dicunt, febres oriri potissimum (scil. exceptis ephemera et hectica) a putredine, quae sit a calido praeternaturali (nequaquam innato) sed externo, mutatio substantiae corporis ad corruptelam, ea, vt, quae iam compa- truerunt, separentur et euacuentur e corpore, reliquæ corporis humoribus assimilentur^k); sitque vel intra vasa, vel extra vasa, (vel in humoribus, vel in cellulosa). In humoribus (intra vasa) erit putredo, si humores velocius agitantur per cordis motum (febris actiua). Extra vasa erit putredo (in cellulosa erit putredo), dum palpitatio cellulosa et fibrarum irritabili- um, vaforum, adaucta est (febris passiuæ).

2. Febris vtraque vel est vniuersalis, vel parti- cularis. *Illæ* ad totum corpus spectat, et *vel* est cum impetu ad varias partes, et crises simplices init, *vel* est cum impetu ad certam corporis partem, pas- sionem potissimum excitans, v. g. pleuritidem^l). *Haec vel* est partialis ex impetu primum in parte nato, et cum corpore communicato^m), v. g. pleuritis, quam febris sequi dicitur: *vel* mere topica, dum ad solam partem pertinet. *Illius partialis* exemplum ex mente veterum etiam hecti- caⁿ) sistit. Atque hæc quidem magnam in me- dicina attentionem merito sibi vindicant: nec tamen sunt a multis rite tradita, vt exempla in pathologia speciali potuissent distingui.

3. Fe-

^k) GALEN. de differ. febr. L. II. c. 9.

^l) Cf. v. g. v. SWIETEN II. §. 593. p. 86. III. p. 169. CLEGHORN Kr. in Min. c. 6. p. 240. 250.

KESSLER v. d. Faulf. p. 69.

^m) Nec a GALENO (de cris. II. 12.) praetermissæ.

ⁿ) GALEN. de inaeq. temper. C. 5.

3. Febris vtraque vel est intermittens, vel remittens, vel subintrans. ita, vt omnis proprie sit tritaea, quod in sequentibus patebit. Tritaea autem est proprie actiua, per motum cordis, quem modificat ventriculus, (effectus sympathiae internae). Ventriculus autem modificatur per irritabilitatem variam, haec partim per humores, eorumque copiam et indolem, partim per sympathiam externam, quorsum cellulosa palpitatio. Hinc patet, quo modo morbi producant febrim, scilicet modificando ventriculi irritabilitatem, ratione dicta: idemque valet de omni pyrexia. Quum vero gradu tantum differant febres intermittentes, remittentes, subintrantes, palam est, idem gradui irritabilitatis gastricae deberi: vt recte neges, vere continentes dari, cum GALENO, BRENDelio, CVLLENO, eo scil. sensu, quo dari multi crediderunt.
4. Febres actiuas multi dixerunt inflammatorias, passiuas putridas, vt febrim actiuam, quae ad morbum putridum spectat, haberent pro complicata febre inflammatoria et putrida, febrim passiuam, quae ad morbum inflammatorium, iterum pro complicata febre putrida et inflammatoria. Neque tamen complicatio adest, et quanta hic facile confusio, tum in medendo, tum in ordinando vix euitabilis?
5. Phlegmasiae essentia videtur omnino ponenda esse in imminuta vi, humores rite propellendi per quamdam corporis partem, et consistit in relatione copiae humorum ad vires, vt sit *absoluta*, *passiua*, *putrida*, *maligna*, auctoribus dicta, si vires vere imminutae sunt, sub copia humorum, sanitati etiam congrua, ad partem irruente (impetus passiuus): *relatiua*, *actiua*, *inflammatoria*, *benigna*, *genuina*, si, viribus ceterum integris, iusto maior humorum

morum copia ad partem deferatur (impetus actiuus). Lentor circuitus humorum in parte inflammata, stases, obstructio, calor, rubor, tumor, sanguinis error in cellulosa, lymphae transsudatio, sunt effectus, symptomata, phlegmasiae communia, nec constituunt essentiam adeo, vt, quoniam impetus solus sufficit producendae inflammationi, mirari non possis, cur, omnibus licet signis phlegmasiae in viuis praesentibus, nulla tamen effectuum signa in cadaueribus obueniant, sicuti e contrario effectus dicti, ab aliis causis producti, possunt in cadaueribus obuenire, vbi in viuis nulla aderant phlegmasiae signa. (Et sic forte explicatu perquam difficiles observationes explicari possunt, dum etiam dicta comprobantur per ea in viuis obseruata, quod saepius in febribus impetus mutatur, et videntur inflammationes productae euanescere, et subinde aliae in aliis partibus oboriri, quod aegre credas.) Febris tum causa est phlegmasiae (actiuae), tum effectus (passivae), et vt facit, ita soluit phlegmasiam, dum irritabilitate ventriculi, quam supponit, efficitur, vt minor euadat febris impetus ad phlegmasiam, quam irritabilitas aucta efficit. Quae omnia maximam omnino attentionem desiderant.

6. Nonne rheumatismus est phlegmasia vasorum lymphaticorum? Et erysipelacea phlegmasia, veteribus etiam dicta maxime, phlegmasia sanguinea cum lymphatica composita? Nonne febris rheumatica, medicis hodie frequenter dicta, est febris ea, quae lymphae etiam velocitatem praecipue simul adfligit, vt pateat, qui possit ad plerosque morbos pertinere? Nonne ea potissimum erit rheumatica, quae sympathiae potissimum externae debetur, seu cellulosae palpitationi, id est passiva?

7. Nonne

7. Nonne in omni febris, sub cordis contractione frequentiori, celerior in venis humorum circuitus, inde celerior lymphae e venis lymphaticis ad venas transitus, inde celerior lymphae in venis suis motus, celerior resorptio, indeque adipis ex febre, scrophularum colliquatio, detumescentia?
8. Recte monet Cel. GRANT, dari febres non formatas, quae scilicet symptomata exhibent, atque ita decurrunt, ut non possint facile ad definitam febris speciem reduci. Non adeo raro occurrunt, maxime, dum neglecta diaeta et incongrua medela in erupturis febribus locum habent, quod quidem eo facilius contingit, quo magis multi diaetam ad solam febris speciem ducunt, neglecto morbo, qui subest. Idem vero egregie comprobatur morborum naturam, a nobis definitam. Has enim febres curare et rescindere poteris, cognito et curato morbo, licet febrim ad speciem tantum aliquam proximam reduxeris.
9. Vtrum febris intermittat, an remittat, neutiquam ex pulsu, sed ex syndrome, in intermittentibus evanescente, statui debet.
10. Ex paroxyfmi tempore, secundum horas diei, aut ex eius indole sola, non potest febris species semper tuto definiri, quod GALENVS fere voluit: sed omnia coniuncta consideranda sunt.
11. Celeritatem pulsum et frequentiam non pauci, iidemque celebres medici pro pathognomonico febris signo habent. Pulsus vero tardiores, raros, paruos, intermittentes, tum in febrium continuarum decursu, tum in apyrexia, esse, testantur illustres in arte viri^o). Pulsus etiam interdum naturalibus proximi

o) GALEN. de puls. ad tiron. STRACK petech. p. 14. 15 PRIN-
 l. 2. c. 4. de praef. ex puls. l. 3. GLE p. 343. 368. 378. SARCONE II.
 c. 3. p. 243. WERLHOFF de var. 94. §. 357. III. 100. 107. LOBB.
 p. 37. n. 42. HYXHAM var. loc. §. 2286. MACBRIDE l. p. 231. SELLE
 d. p.

proximi sunt, licet febrim adesse statuunt summi viri P). Igitur sola celeritas et frequentia pulsuum febrim non definit, alia conditio febrim non excludit. Ad distinctionem et febris et pyrexiae in actiuas et passiuas, itaque magis respiciendum erit, quod neglectum esse hactenus videtur.

TRITAEA. Febris intermittens: paroxysmus, horrore, rigore, calore, ephidrosi, se excipientibus, conspicuus: tritaica periodus.

SIMPLEX: Regularis: Anticipans: Postponens. Typus simplex, regularis: aut inconstans, anticipans, postponens, tritaicus: paroxysmus ad horas xii durans; secundum HIPPOCRATEM, FORESTVM, alios, septem circuitibus iudicata. (Insultus horis antemeridianis.)

I. FRIGORIS, seu exhorrescentiae. Incipit a lassitudine, oscitatione, pandiculatione crebra, grauitate, debilitate totius corporis, vt aegrotus se sustinere vix possit; pallor subit vngues, apicem nasi, labia, canthos digitorum, quin liuor pallori se immisceat, simul mox facies et extremitates frigent, ad sensum aegroti potissimum, imo non raro adstantium, licet saepius thermometri ope nullam caloris imminutionem sentiamus. Incipit autem frigus ex dorso, vnde ad corpus propagatur ad tremorem vsque (horror), et partium imminutam mobilitatem (rigor), donec his post tempus se immisceat calor. Respiratio est laboriosa, cum anxietate, et pulsibus celeribus, paruis, debilibus, interdum tardioribus q). Adest simul nausea, vomitus, sitis: vrina mingitur pallida, aquosa, aut viridis. Durat per I. 2. ad 6 horas.

II. CA-

d. p. 13. HALLER el. ph. T. VI. S 2. §. XV. p. LOMM. p. 2. 7 b. b. 8.

p) P. ALPIN. de pr. V. et M. aegr. L. 4 c. 5. RIVER. op. p. 449. SARCONI l. c. III. 40. SENAC de

cord. l. 3. c. 8 §. 7. HORST. obs. I. 1. BREND. op. I. d. 2. §. 1. p. 16. de HAEN R. M. var. loc. SAUV. I. 362.

q) Pulsus tardiores esse, cuiusmodi testimonia BREND. op. I. 162. GALE-

II. CALORIS. Jam oritur calor, qui sensim abolendo symptomata stadii praecedentis magis increfcit, vt naturalem plerumque excedat, ratione, stadio praegreffio non omnino respondente. Respiratio sensim euadit libera magis, expers anxietatis, in progressu fit magna et fortis; pulsus fiunt magni, fortes, celeriores, cum persistente siti ingruunt cephalalgia artuumque dolores, vrina iam missa colore est profundiori, vt in phlegmasiis.

III. SVDORIS. Quum calor et rubor aliquamdiu increuerunt, mador primum in facie erumpit, mox e toto corpore prodit calidus et largus, ingruunt vomitus et aluus, vrina emittitur rubicunda et spumescens, deinde post, quam aliquamdiu quieuit, in summitate apparet pellicula, vasis etiam lateribus accreta, atque in fundo vasis magna sedimenti copia haeret, quod colore suo laterum coctorum, seu boli Armenae pollicem imitatur, vt vrina inde *lateritia* vocetur. Pulsus molliores, tardiores, respiratio libera.

Posthaec et calor et sudor imminuuntur, non raro somnus accedit, nec, praeter lassitudinem et debilitatem, alieni quidquam a febris superest.

N. I. Raro vnus paroxysmus solus obseruatur, vt plurimum plures se excipiunt.

2. Stadiorum ordo interdum est mutatus, vt calorem sequatur frigus, aut sudorem excipit calor, calorem frigus r).

3. Singulus paroxysmus habet suum initium, incrementum, statum et declinationem, vt in continuis distingui solent. Quare poteris statuere, quemlibet intermittens paroxysmum esse febrim, eamque tot facere recidivas, quos credunt facere paroxysmos.

4. Ex

GALENI de praef. puls. l. 3. c. 5. r) Cf. CL. TRNKA de febr. I. LOMM. p. 2. 7. WERLHOFF de var. 71. p. 37. cet.

4. Ex eo, quod paroxyfmi tritaeae duplicatae, iam dicendae, quotidianae, sibi omnino respondeant, non sequitur, vt febris sit diuerſae naturae a tritaea duplici. Sunt enim, qui doceant, quos inter HAENIVS, de febribus ſcribens, tritaeam duplicem eſſe, quum paroxyfmi quotidiani ſibi non omnino respondent, vt altera tardius, altera citius paroxyſmum faciat, ſibiſque respondeant alterni paroxyfmi. At quum tota differentia inter tritaeam duplicatam et quotidianam in eo ponitur, vt in hac paroxyfmi quoquo die ſibi respondeant, certo fieri poterit, vt tritaea duplicata quoque perfecte fiat quotidiana, quod non raro eſt. Id ratio iubet: ſed iubet quoque experientia. Etenim ante aliquot annos vidi intermittentem, hora XI. antemer. accedentem, omni die, et typo, et gradu, ſibi congruam, vt perfectam dicere debuiffes quotidianam: offero emeticum, en! ceſſat altera tritaea, et ſit tritaea ſimplex. Qua quaefo ratione credideris, quotidianam hic mutatam eſſe in tritaeam? Mutata quidem eſt, ſed paſſiue, omittendo, nequaquam actiue.
5. Si igitur cum BARBETTE ſtatuis, omnem quotidianam eſſe tritaeam duplicatam, atque omnis tritaea aliquando eſt extenſa, notha dicta, intelligitur, cur omnis febris ſit proprie tritaea, et tranſeant intermittentes in remittentem et ſubintrantem, continuas, et hae in illas. Statuimus autem, ex obſervationibus quoque, tetartaeam eſſe tardantem tritaeam. GALENVS certe ^{s)} et PAVLLVS AEGINETA ^{t)} ſtatuant, tritaeophyam reſpondere tritaeae, tetartophyam tetartaeae. Reliquae febres continuae ſunt tritaeophyae duplicatae. Quae in praxi multum vtilitatis praefitura eſſe videntur. Quod enim SYDENHAMVS de febribus intermittentibus auctummalibus edixit, ſaepe videri con-

[s) De criſ. l. 2. c. 6.

t) L. 2. c. 6.

continuas, id forte de omnibus continuis valet, vt apta methodo, morbo potius, quam febris congrua, omnem forte febrem liceret ad intermissiones reducere, quod semper conducit. Hecticam etiam in intermittentem mutari posse, CELSVS ^{u)} docuit.

6. Maximam attentionem sibi vindicat tempus anni, quo febris intermittens comparet, vnde SYDENHAMI distinctio in vernales et auctumnales. Illae inde a februario ad aestatem comparent, et sponte aut facile tolluntur, haec, ab augusto ad hiemem oriundae, aegrius tolluntur.
7. Vrina lateritia interdum non adest, post vernas enim, inprimis exquisitas tertianas, vrina *subrufa* aut *flavescentes* saepe mingitur, cum nubecula vel enaeoremate, interdum et cum sedimento laevi, aequali, albo, imo, in primis et mitioribus auctumnalium paroxysmis deficit.
8. Exquisita tritaea GALENO ^{x)} dicitur, quum tempus horarum XII. non excedit, licet XII. horas consumat accessio: alia simpliciter tritaea dicitur.
9. Tritaea quoque, vt febris omnis est actiua, passiuua, vniuersalis, particularis. Actiua est, quae sympathiae internae debetur, et tum est vniuersalis, atque ad totum corpus spectat, aut passionem potissimum excitat, v.g. pleuritidem, dysenteriam: tum est particularis, partialis, vel mere topica. Passiuua, sympathiae externae debetur, ei tamen, vt sympathia interna antea excitetur: ante enim, quam tritaea compareat, irritabilitas ventriculi excitanda est: quod etiam in oriundis remittentibus locum habet. In pathologia speciali tritaeae particulares debent ad passiones referri, ad quas pertinere putantur. Omnis enim

^{u)} L. 3. c. 9.

^{x)} De febr. diff. II, 3. rel.

enim morbus febrim si excitat, potest intermittentem, remittentem, subintrantem, excitare.

TRITAEA. Duplicata: Regularis. Tritaici paroxysmi duo intra horas XXXXVIII.

CATHAMERINA seu Quotidiana. Tritaea duplicata regularis: omni die paroxysmus, ad horas XVIII. extensus, inde apyrexia brevis: (inuasio vespertina) y).

TRITAEA DVPLEX. Tritaea, duplicata, paroxysmi alternis diebus duo, alternis nullus: paroxysmi protracti, proni in continuitatem.

TRITAEA TRIPLICATA. Tritaea paroxysmos tres intra horas XLVIII. exhibens, die impari paroxysmi duo, die pari vnus. **TRIPLEX** erit, vbi die pari paroxysmi duo, die impari vnus.

HEMITRITAEA NOTHA. Intra horas XLVIII. paroxysmi tres ita protracti, vt intra eisdem nulla detur apyrexia.

TRITAEA. Anomala. Extensa. Remittens. Simplex. s. **TRITAEA NOTHA.** Tritaeae simplicis paroxysmi adeo protracti, vt brevis, vel vix conspicua, detur apyrexia.

TRITAEA notha duplicata. EPHEMERA. Iudicatoria SAGAR. Tritaea notha duplicata, vt quotidie adsit paroxysmus. Proprie vno tantum constare paroxysmo deberet, sed dicitur, vbi intra dimidiam septimanam absoluitur. Ingruit cum aliquali frigore, siue rigore, exiguo decremento virium artuum, magno e contrario accremento virium vitalium stipatur, sudor, vrina, critica. Febris actiua, sed et passiuia interdum z).

TRI-

y) **GALENVS** quidem (de febr. diff. l. 2. c. 7.) negat, cathamerinon apud Graecos occurrere, sed amphimerinam vocat. Liceat tamen cum **SAUVAGESIO** hanc ita denominare, vt continua amphimerinae nomen sola sibi vindicet,

atque aut confusio, aut diffusus sermo euitetur.

z) **GALENVS** (de cris. II. 13.) „Ephemeræ, inquit, sunt tantum spiritus passionēs, absque humorum putredine, aut membri inflammatione, nisi inflammatione inguinum accidant.,,

TRITAEA. *Ephmera.* **AMPHIMERINA.** *Ephmera diutius protracta* ^{a)}).

TRITAEA. *Anomala.* *Extensa.* *Subintrans.* *Simplex.* seu **TRITAEOPHYA.** *Tritaeae nothae paroxysmi adeo protracti, vt prioribus adhuc durantibus accedat nouus. Intra horas XLVIII. accessio vna, diebus paribus oriunda, monente GALENO* ^{b)}).

TRITAEOPHYA. *Duplicata.* *Tritaeophya, quotidie repetens.*

SYNOCHA. *Humoraria* **SAGAR.** *Tritaeophya duplicata, intra dies XIV. iudicata. Incipit cum pulsibus irritationis, frigore, subsequente calore: crescit ad dies IV-XI. absoluitur VII-XIV. die. Maior artuum debilitas, in statu omnia vehementiora, puta cephalalgia, calor, pulsuum celeritas, et frequentia, rel.* ^{c)}).

SYNOCHVS. *Frigeraria* **SAGAR.** *Tritaeophya duplicata, intra dies XXX. iudicata. Ingruit cum pulsibus irritationis, iisdem et respiratione auctis, viribus artuum multum miqutis, notabili frigore, saepe rigore* ^{d)}).

TYPHVS. ^{e)} *Tritaeophya duplicata, intra dies XXXI. iudicata. Virium, vitalium augmentum exiguum vel nullum, artuum summa prostratio: facies decolorata, passiones neruosae, vt sopor, carphologia, pulsus, vrinae, plerumque sanis similes.*

HECTICA. *Febris exigua, minor artuum debilitas, pulsus subduri, minores tamen, quam in sanis, frequentiores post cibum suntum, vnde et augetur calor, ad tactum mordax, potissimum in manuum volis, ficcus, ad thermometron non notabilis, cutis sicca, lingua sordida, vrinae turbidae, crassae; decursus vltra mensem* ^{f)}).

HEMI-

^{a)} In his remittentibus remissio contingit intra horam VIII. matutinam et III. pomeridianam: in anomalis, in intermittentes transeuntibus, remissio omni tempore contingit, obseruante Cel. GRANT de febr. p. 21.

^{b)} Subintrantes PAVLLO AEGINETAE II. 27. *ardentes* dicuntur, quum ne declinationem quidem

sensibilem faciant, et acumine a remittentibus differant.

^{c)} Synocha, vt tritaeophya simplex, est febris actiua; inflammatoria biliosa, ardens, auctorum.

^{d)} Synochus et sequens typhus, febres passivae, putridae auctoribus non raro dicuntur.

^{e)} Secundum SAUVAGES.

^{f)} „Quum omnes corporis partes foli-

HEMITRITAEA VERA. Die *impari* triatea, die *pari* tritaeophya, vnde die pari frigus, die impari horror, quo imprimis est insignis, vt horrida etiam dicta sit: Signa irritationis et phlegmasiae, plerumque latentis, abdominalis potissimum, symptomatibus non raro nervosis stipata. Febris passiva, species hecticae, hinc phthiæ comes g).

TRITAEA. Tardans. **TETARTAEA.** Simplex. Febris intermittens: paroxysmus horar. xii, plus, minus, apyrexia horar. LX. invasio a meridie hora 3. 4. 5.; seu periodus horar. LXXII., paroxysmus horar. XII., apyrexia bidua.

TETARTAEA. Duplicata. Omni die paroxysmus tetartaeus, excepto die aut secundo aut tertio, intra quamcumque periodum tetartaeam; similitudo dierum quatri-dua; v. g. diei primi et quarti, secundi et quinti, paroxysmis stipatorum, et tertii et sexti apyretorum.

TETARTAEA Duplex. Paroxysmi tetartaei omni die quarto duo, nycthemeris duobus apyretis.

TETARTAEA. Triplicata. Aut omni die paroxysmus vnus, similitudo tetartaeae: aut simplex tetartaea cum duplici, v. g. die I. et IV. paroxysmus vnus, II. et V. duo, III et VI. apyrexia.

TETARTAEA. Anomala. Extensa. Remittens. Subintrans. **TETARTOPHYA.** Tetartaea simplex adeo extensa, vt aut brevis, aut nulla sit apyrexia.

TRITAEA. Hemitritaeus maior Barbarorum h).

TRITAEA. Erratica:

a. QVIN-

solidae, excalescentes ad absolutionem sunt, eiusmodi febrem Graeci hecticam vocant, ceu non amplius in humoribus et spiritu, sed in corporibus iis, quae habitus rationem habent, comprehensam. „GALEN. de inaeq. temp. c. 5. Est tritaea omnino passiva, quae sympathiae potissimum externae debeat, quare tritaei a natura vix adparet, nisi ea quodammodo

activa reddatur, quod refrigerio fieri interdum, CELSVS l. 3. c. 9. docet, vt vera tritaea sit.

g) Maximus est auctorum circa semitertianam seu hemitritaeam dissensus, ut alia sit HIPPOCRATIS, GALENI aliae, alia CELSI, rel., quod alia occasione fusius probaturus sum.

h) Cf. SPIGEL. de semit.

- a. QUINTANA. Paroxyfmi, quinto die fimiles, interpositis nycthemeris tribus apyretis ⁱ).
 b. SEXTANA. Paroxyfmi, sexto die fimiles, interpositis apyretis ^k).
 c. SEPTANA ^l). d. OCTANA ^m). e. NONANA ⁿ).
 f. DECIMANA ^o). g. QVATVORDECIMANA ^p).
 h. QVINDECIMANA ^p). i. MENSTRVA ^r).
 k. TRIMESTRIS ^s). l. ANNVA ^t).
 m. HEBDOMADALIS CATHAMERINA ^u). Cathamerina, affligens per hebdomadem, fequente hebdomade apyreta, tertia iterum cathamerina stipata.

N. Liceat GALENI, quem veterum plurimi fecuti sunt, de febribus doctrinam proponere. Ephemeræ et hæticæ genesin dixi, hemitritæarum autem illius nimis diffusam, alibi proponam. Reliquarum febrium genesin a putredine repetit, ratione supra dicta.

F 2

Dan-

i) HIPPOCR. epid. L. I. S. 3. t. 2. AVICENNA l. 4. f. 1. TVLP. l. 3. o. 1. 2. WERLHOFF de febr. p. 269. FOREST. l. 3. o. 43. v. SWIETEN §. 746. TISSOT §. 251. N. A. N. C. T. I. p. 388. Nonne est tritaæ vera, cuius paroxyfmi diebus interpositis 3. 7. rel. mitiones, ut vix animaduertantur?

k) SCHENCK l. 6. o. 2. E. N. C. c. VIII. o. 10. ZEVIANI progn. l.

l) HIPPOCRAT. epid. L. I. S. 3. t. 2. SCHENCK. l. c. ETTMVELLER II. 494. RHOD. C. I. o. 18. SPON. obs. de febr. qu. 9. ap. Nigrif p. 248. BOERHAAVE. SWIETEN l. c. MORGAGNI XLIX. 36.

m) AMAT. LVSIT p. 765. SALIVS. c. 12. ad H. VALLES. contr. L. 5. E. N. C. d. 1. a. 4 & 5. o. 70. p. 58. WERLHOFF l. c. ETTMVELLER l. II. p. 1. p. 505. de HAEN febr. div. IV. p. 9. TISSOT §. 251. E. N. C. d. 2. a. 5. app. p. 39. o. 64. SALMVTH C. III. o. 13. RA-

ZOVX tabl. nosol. p. 150. BALLON. epid. 1576. §. 14. T. I. RHOD. obs. 19.

n) HIPPOCR. l. c. ZACVT. LVSIT. pr. m. l. 3. o. 34. WERLHOFF l. c.

o) ZACVT. LVSIT. L. 3. o. 34. GILBERTVS ANGLICVS de febr. L. I.

p) WERLHOFF p. 270.

q) RHAZES. FOREST. l. 3. o. 43. sch. p. 170. BALLON. l. c. §. 34. WERLHOFF p. 270.

r) RIEDLIN. l. m. a. 6. dec. obs. 25. WERLHOFF. l. c. de HAEN. l. c. E. N. C. d. 2. a. 5. o. 64. p. 39. app. BALLON. l. c. §. 14. et a. 1578 p. 164.

s) FOREST. l. I. BALLON. conf. med. L. I. c. 48.

t) C. PLINIUS SEC. l. 7. c. 51. AMAT. LVSIT. c. 7. c. 75. sch.

u) Journ. de med. T. 42. p. 433. et Anserl. med. pr. Abh. T. II. n. 4. p. 74. sq.

Dantur igitur febrium genera tria, quotidiana, tertiana, quartana, et differentiae duae, intermittentes et continuae, seu remittentes. Febres autem continuae idem habent genus cum singulis intermittentibus. Scilicet: 1) quotidiana intermittens et continua, seu catamerina et amphimerina. 2) Tritaea et tritaeophya; 3) tetartaea et tetartophya. Tritaea oritur, si bilis flaua, sine aliquo visceris adfectu, per totum corpus defertur; tritaeophya, si intra vasa bilis accenditur. Tetartaea oritur, si atra bilis per totum corpus defertur, tetartophya, si immobilis eadem est. Similiter et quotidiana a pituita. — Continuae seu remittentes sunt, quae ad apyrexiam, ante solutionem perfectam non perueniunt, etsi declinatio aliqua sensibilis adpareat. Continens seu subintrans erit, vbi nec declinatio contingit, sed febris similis ad crisin vsque perseuerat, a continuis vero sola acutiae differt. — Aliae febres oriuntur ex quorundam locorum passione, et se habent, vti humores, ex quibus oriuntur. — Fluxus enim, qui inflammationem partis efficit, vel flauae, vel atrae bilis est, vel pituitae. Inde oriuntur febres eadem, ac supra dictum. — Quum vero ipse sanguis secundum naturam se habens, impactus in loco, fluxioni obnoxio, putruerit, est inflammatio, et febris inde orta similis maxime est ephemeris. Sed quum putrescit sanguis, iam in amarae bilis naturam transit x).

Nonne et recentiorum circa febres et phlegmasias theoria, a veteribus et GALENO potissimum repetenda? Hic enim respirationis et pulsuum vtilitatem eam esse, statuit, vt perflatus et ventilatio fiat natiui caloris, et putredinem repetit a transpiratione impedita, quod fiat obstipatis vasorum finibus, vel tota cute. Stipationem in vasorum finibus accidere vel ex vehementi refrigeratione, vel ex humorum, qui confertim in ipsis extrorsum ruunt, crassitudine, multitudine, len-

x) Cf. GALENVS de cris. l. 2, c. 6. et 12.

lentitia. Quare statuit, febrim sanaturum debere causam contrariis remouere, hinc, si corpus ex frigida causa stipatum et densum sit, eo relaxato, et rarefacto, sin ex obstructione, hac reclusa contrariis, vt, si ex abundantia humorum, hac imminuta, si a crassis et glutinosis, tenuitate et fluxilitate y). Commemorat etiam phlegmasias sanguineas, pituitosas seu oedematosas, biliosas, scirrhasas. Nonne male GALENI dogmata hodie negliguntur?

PASSIONES:

I. CAPITIS. ^z) — ET FACIUM, COLLIQUE.

APOPLEXIA. Cum somno profundissimo, vix fugando, respiratio stertorosa, omnium artuum laxitas: pulsus, *vt in omnibus soporosis*, solito rariores, vt frequentes sint sanis naturales.

CARVS. Somnus altissimus, vix fugandus: respiratio tacita, omnino pacata.

CATAPHORA. Status soporosis facile fugandus, citra febrim, delirium, obliuionem notabilem.

LETHARGVS. Status soporosis facile fugandus, cum febrim, imaginationis et memoriae torpore, delirio.

TYPHOMANIA. Cum propensione in soporem, somnio, et vigore imaginationis et memoriae, agrypnia.

ECSTASIS. Status soporosis subito ortus, vt aeger situm, quo corripitur, retineat, alios non seruet: aut, si mauis, pone: Cum perseverante animi corporisque statu (eo, quo incipit passio, homini familiari) perseverantia constans sensationum internarum, adeo intensarum, vt externae (si fiant) irritae sint, citra receptiuitatem motus passiuam.

CA-

y) Cf. meth. med. l. XI. c. 4.

z) Sunt, quae maxime et iure ad caput pertinent, aut quorum causa statuitur in capite obtinere. Trichoma, encephaloc-

le, hydrocephalus, phyocephalus in path. spec. proponuntur. Cf. cachexiam, ectopias, catharrheuma, morbum anonym.

CATALEPSIS. Sensus et motus suppressi, (cum pulsibus et respiratione obscurissimis) miraque artuum, situs, qui ab aliis inducuntur, suscipiendi et retinendi vis: aut, si magis placet, pone: Cum perseverante animi corporisque statu, (eo, quo incipit passio, homini familiari) confians, et conscientiae expers, impotentia alienandi sensuum organa (insensilia) et producendi motum (voluntarium) cum receptivitate motus passiva^a).

PARAPHROSYNE. (Post arteriarum carotidum aut temporaliū pulsationem validam, oculis percipiendam,) delirium fugax, saepe febrile: peruvigilium, ideae viuidae, vox insolita, audax, oculi truces: vrina tenuis, pellucida: pulsus praecedentibus tardiores, respiratio rara, magna, suspiriosa: sequuntur interdum carus, convulsio.

PHRENITIS. Paraphrosyne ferox, assidua, febrilis: vox mutata, loquela temeraria, ferocitas, inquietudo, pulsus duri, frequentes, celeres, somni turbulenti, oculi protuberantes, epistaxis, sopor, convulsio, suffusio, oxycoia, carphologia.

PARAPHRENITIS. Phrenitis, gradu remissa, manifestius sympathica (abdominalis, thoracica)^b).

CEPHALITIS. Paraphrosyne somnolenta, seu mentis stupor et sopor, cum carphologia: pyrexia, signa phlegmasiae capitis interni; dolor pulsatilis capitis, carebaria, rubor et magna oculorum sensibilitas, vigiliae.

MA-

a) Sensus et motus *suppressi* omnino dici possunt, quoniam *suppressum* denotat in pathologia eum rei statum, quo res perdurat citra alienationem, indeque et cum defectu phaenomenon. — Cereae flexilitas dici nequit receptivitas motus, quum haec potius, sed longe diversa, vera tamen ratione, adsit in varia osteocachexia, v. c. rachitide, ut pars possit ad variam directionem moveri, ad quam in sanis non potest: ut alias rationes taceam. *Receptivi-*

tas motus passiva mihi dicitur, dum corpus suscipit et tenet motum a causa externa *absolutum* (*Activa* erit, dum corpus non solum suscipit, sed ipsum absoluit motum, ad quem forte causa externa solus stimulus fuit, ut punctura.) et gravitatem artus adhuc superat.

b) Cf. circa phrenitidem, paraphrenitidem, diaphragmitidem, quem sufficit excitasse, Cl. SELLE pyr. p. 121 sq. 132 sq.

MANIA. Paraphrofyne cum audacia, furore, robore, musculorum rigiditate, adianeustia, febri passiva, apyrexiam simulante, imo activa ^c).

MELANCHOLIA. Citra febrim et furorem, mentis, olim vigentis, constans et fere perpetua hallucinatio, imaginatione potissimum erroneâ conspicua, insensibilitas ad stimulos receptos maximos, ut adfecti summos, indeque inductas euacuationes, citra magnam alienationem ferant ^d).

PANOPHOBIA. Melancholia circa malum in solitudine, somno.

PHILAUTIA. Melancholia circa corpus proprium, et rerum suarum statum.

NOSTALGIA. Philautia, sub absentia a patria, parentibus, oriunda, morositas, moeror, agrypnia, anorexia, languor, rel.

ATHYMIA. Melancholia, non raro philautia, cum animi abiectio, consternatione, tristitia, desperatione.

AMENTIA. Melancholia, circa omnia obiecta hallucinatione conspicua.

FATUITAS. Citra febrim et furorem mentis imbecillitas perpetua, taciturna, sensationum internarum, cogitationum expers.

SOMNAMBULISMVS. Sub somno perseverante (citra febrim, et furorem) exercitium motuum muscularium, tum mentis actioni, tum imaginationi potissimum viuidae, citra conscientiam obediens, sensibus ceterum integris ^e).

DAE-

c) Febrim dissimulari, aetiam adesse, SARCONÉ §. 585 sq. docet.

d) Quemadmodum tempestatis grauissimas saepe iniurias spernunt, ita etiam vesicatorium, licet maximum, aut ne inflammationem quidem producit, aut saltem pulsuum frequentiam vix auget. Tartarus emeticus ad grana X, XV camphora ad dragmam vnâ, idque quotidie aliquoties repetitum,

sine magno effectu tolerantur a melancholicis. Cf. Cel. MVZEL obs. cet.

e) Actionem mentis, ingenii-que adesse, patet ex eo, quod in tenebris scribant rationem testantes enunciationes; imaginatio viuidissima patet ex eo, quod loca petant, et varia quaerant, ut memoria res viamque doceat, et sensus integros esse externos, quis negat?

DAEMONOMANIA. Delirium apparens, aut simulatum, ut subiecta credulis se daemone obsessa, magi, saggae, artificio detenta, fistant.

AMNESIA. Memoriae imminutio, abolitio.

AGRYPNIA. Peruigilium immodicum, virium imminutio: — anxietas, inquietudo, cephalalgia.

CEPHALALGIA. Capitis dolor acutus, oxycoia, amblytes.

CEPHALAEA. Capitis dolor tensiuus, chronicus, oxycoia.

CAREBARIA. Sensus ponderis in capite, grauitas.

HEMICRANIA. Dolor capitis in alterutro latere, vehemens, fixus, potissimum ad tempora, frontem, oculum, vel intra orbitam depressum, vel tumentem, lucem non ferentem, cum pupilla coarctata, palpebrarum nictitatione, epiphora, stillicidio feri e naribus.

MENINGORRHOEA. Haemorrhagia facta ad meninges (supra et infra). Carebaria, lethargus, carus, apoplexia, paralyxis, epistaxis, otorrhagia, rel. f).

AMBLYOPIA. Visus organi vsus deprauatus.

PHOTOPHOBIA. Visus auctus.

DYSPHOBIA. Visus imminutus g).

AMBLYOSMVS (HIPPOCRATIS). Visus deprauatus, citra opacitatem corneae vel interioris oculi.

AMBLYTES (ARETAEI). Visus debilitas absoluta, quouis tempore, loco, situ et distantia obiecti h).

HEMERALOPIA. *Graec. Nyctalopia Recent. i).* Visus ad crepuscularem lucem, vel matutinam, vel vespertinam, hebes

negauerit, quum et vias, periculosas admodum, rite absoluant, et in aquam frigidam descendentes mox sui consciui fiant: quod autem citra conscientiam haec eueniant, ex eo palam est, quod acta nesciant, nec recordentur, ipsique factorum testimonia admirentur.

f) Non ad vulnera solum pergit, sed saepe a capitis passio-

nibus excitatur, quarum num causa, an effectus sit, per cadauerum etiam sectiones non constat. — Apocenos meningea, serosa, sub hydrocephali interni nomine fere insignienda, quod quidem fecisse videntur, qui febrim hydrocephalicam descripserunt, vide catarrh.

g) Hoc Mydriasis et cataraeta,

h) SAUV. *amblyos.* sp. 6.

i) SAUV. *ambl.* sp. 1.

hebes et confusus est, licet tum alii aetopes distincte videant ^k).

NYCTALOPIA HIPPOCR. *Visus nocturnus* BOERH. ^l) Aegri, interdiu nihil cernentes, vesperi et noctu satis acute vident.

MYOPIA. ^m) Adfecti obiecta, paullulum dissita, confuse vident, proxima vero distincte.

PRESBYOPIA. ⁿ) Adfecti proxima confuse, remota distinctius vident.

DIPLOPIA. Idem obiectum multiplicatum, geminum, aut multoties repetitum, cernitur.

SVFFUSIO. Hallucinatio, qua adfecti credunt videre obiecta, quae non adsunt, vt muscas, scintillas, colores varios obiectorum. cet.

VERTIGO. Hallucinatio, qua adfecto quiescentia obiecta e loco moueri, vel in gyrum agi videntur.

MYDRIASIS. Pupillae aut solito maior amplitudo, aut figura abnormis, cum torpore aut atonia eius sphincteris, vt amplitudo ad lucem multam, aut nullam, immutata permaneat ^o).

CALIGO. Visus abolitus. *Causa haeret:*

a. *Ante oculi globum.*

Huc passiones primariae topicae, quas vide in catarrh. atque ectop. pathologia.

b. *In oculi globo.*

CATARACTA. Visus (imperfectus, obscuratus), abolitus a corpore opaco, pone pupillam sito, radiorum luminis transgressum impediendo, per iridis hiatum distinguendo.

a. *Simplex*, quae ad solam lentem crystallinam, eiusque capsulam pertinet.

a. *Crystal-*

k) Epidemica fuit in oppidis, flumini vicinis, in vicinia Montpelii.

l) M. ocul. p. 161. SAUV. *ambl.* sp. 2.

m) SAUV. *ambl.* sp. 3.

n) SAUV. *ambl.* Sp. 4. *Visus Senilis Latin.*

o) Ad amblyosmum, praeter haecenus traditas species, pertinent etiam variae passiones primariae topicae, quare vide catarrh. ectop. path.

a. *CrySTALLINA*, quae, frequentior, sedet in lente crySTALLINA, pelluciditate sua naturali orbata. Incipit a macula parua, quae centro pupillae saepissime respondet, et versus latera, instar nebulae, euanescit.

Differt:

α. *Consistentia:*

a. *Solida, solidescens*, vbi lens crySTALLINA opaca, vel in corpus durum, gypseum, lapideum, solidescit: noscitur minori lentis volumine, maiori ab iride distatina diiudicando, punctorum et striarum, in cataractae superficie conspicuarum, immutato situ et directione.

b. *Fluida, tenuis, dissoluta*, vbi in materiam tenuem, aqueam, mucosam, gelatinosam, purulentam, lacteam, dissoluitur: agnoscitur solidae signis contrariis et motu vndulatorio in cataractae superficie.

c. *Mixta*, ex vtraque composita.

β. *Volumine et figura*, quibus:

a. *Solidescens*, minuitur volumine, a nativa figura vix recedens.

b. *Dissoluta*, in paullo maiorem ambitum, atque in figuram sphaericam mutatur.

γ. *Colore*: est griseo seu cineritio, interdum subalbo, albo perlato, luteo, viridescenti, fusco, nigricante.

δ. *Mobilitate*:

a. *Mobilis*, vt in ipso humore lentis tremor seu vndulatio, obseruetur, vel tota lens iridis motui vel ad quamlibet, vel ad certam regionem, respondet.

b. *Immobilis*.

ε. *Adhaerentia*:

a. *Adhaeret*: inter iridem et crySTALLINAM vel nullum, vel maius minusve superest spatium.

α. *Concretio totalis*: suspicatur ex plenaria iridis te cataractae immobilitate, et spatii inter has defectu.

b. *Par-*

b. *Partialis*, ex figura angulata iridis et cataractae, et cataracta, ad eam regionem sequente.

b. *Non adhaeret*.

ζ. *Maturitate*:

a. *Matura*, esse dicitur, quae tantam nata est opacitatem, ut lucis radios, directe in oculum incidentes, non amplius transmittat, oblique inter cataractam et iridem transeuntibus detur accessus, ut lux a tenebris, et obiecta, ad latera posita, ab aegrotis possint dignosci.

b. *Immatura*, quae non omnino impedit, quo minus obiecta, axi oculi respondentia, aliqualem fiant imaginem p).

b. *Membranacea*, quae est a capsula lentis crystallinae obscurata, plerumque secundaria prioris, etiam extractioni superueniens, nisi capsula exempta sit. Macula, magis aequalis, circumferentiam quoque occupans.

α. *Anterior*, ab anteriore capsulae pariete obscurato: macula superficialis.

β. *Posterior*, a posteriori capsulae pariete obscurato: macula profundior, sub cuius incremento lente minuitur, obfuscatur, aboletur visus.

γ. *Ab utraque*. Omnes tres

a. *Partiales*.

b. *Totales*.

c. *Interstitialis*, est ab obscuriore muco, lentem circumdante, nec lente crystallina, nec capsula peccante: rarissima.

b. *Compositae*:

a. Crystallina cum membranacea, aut interstitiali, aut membranacea cum interstitiali.

b. Simi-

p) Haec differentiae partim ad membranaceam etiam pertinent, partim faciunt, ut cataracta etiam ad amblyosum referri debuisset,

nisi coniungere cataractae affectiones praestaret ex altera parte.

b. Simplicium aliqua, aut compositarum quaedam cum bulbi adfectione, humores reliquos aut tunicas corripiente.

GLAUCOMA. Visus (obscuratus) abolitus cum oculorum opacitate, nec lenti crystallinae, nec capsulae, tribuenda, sed ad reliquas bulbi partes relata q).

c. *Pone oculi globum*, ad encephalon, causa haeret.

AMAUROSIS. CAECITAS. Citra sensibilem oculorum opacitatem, visus suppressio, *iridis motu simul imminuto vel amisso*, seu immobilitas pupillae, et huius decoloratione in pallidam, nebulosam, et relaxatione stipata: in incipiente, utroque oculo aperto, diplopia, vno aperto visus naturalis, aut contra r).

EXOPHTHALMIA. Bulbi oculi procidentia, ut a palpebris non tegatur bulbus, magnitudine ceterum pristina praeditus.

OPHTHALMIA. Oculi dolor, rubor, lacrimatio, lucis intolerantia.

OPHTHALMITIS VOGEL. Ophthalmia, tumor, tensio, calor oculorum, pyrexia. Pertinet ad partes internas.

CHEMOSIS. Rubor, tumor, dolor adnatae.

ANCHILOPS. s) Tumor cysticus canthi maioris oculi, rhinostegnosis, epiphora, inflammatio tumoris.

AEGILOPS. (*Fistula lacrimalis auct.*) Anchilops, epiphora puriformis, (aut purulenta).

EPIPHORA. Apocnosis ex oculis, potissimum glandulis, lacrimali, et palpebrarum, vber et constans.

NYSTAGMVS. Vel palpebrarum, vel oculi, imo iridis, seu vueae conuulsio, seu alternus motus spasmodicus, oculorum instabilitas.

STRA-

q) Vaga omnino notio, quoniam visus passiones, ob varias auctorum et vagas denominationes, synonymina multa, adhuc aegre cognoscuntur: quare huc referas, quae placet, et cf. scriptores chirurgicos.

r) Amblyopia fere semper utrum-

que oculum affligit, amaurosis plerumque vnum oculum tantum tenet. Vide ne, admitti posse GALENI theoriā supra (*introd.* p. 5.) stabilitam. In amaurosi laesa est videndi potentia, in cataracta visus ipse.

s) RICHTER. chir. B. V. 261 sq.

STRABISMVS. Oculi passio tonica, vt axes optici cum altero non conuergant.

a. *Conniuens*, oculorum axibus se decussantibus adest.

b. *Diuergens*, oculorum axibus non conniuentibus, sed ad libellam compositis.

c. *Inaequalis altitudinis*, dum alter oculus sursum, alter deorsum tendit ^t).

DYSECOEA. Auditus imminutus.

COPHOSIS. Auditus abolitus.

PARACVSIS. Auditus deprauatus.

a. **BARYCOIA.** SAUV. parac. sp. 1. Audiuntur tantum verba submissa et grauiori voce pronunciata.

b. **OXYCOIA.** SAUV. sp. 2. Auditus confusio, intolerantia soni, vt vel minimus strepitus aurem laedat.

c. **DVPLICATA.** SAUV. sp. 3. Praeter sonum verum sensus alius, non existentis extra aurem.

d. **WILLISIANA.** SAUV. sp. 4. Nullus auditus, nisi strepitu coniunctus sit sonus.

e. **LENTA.**

Qua sonus tardius auditum producit, quam in adstantibus vere producit. Sustinui ipse conualescens.

f. **SINGVLARIS.**

Qua vocum articulatarum syllaba vel prima, vel vltima, perit. Sustinui, paullo post illam e.

SYRIGMVS. Aurium tinnitus.

OTALGIA. Dolor auris: oxycoia.

OTITIS. Inflammatio auris: otalgia pulsatilis, calor, syrigmus, agrypnia, pyrexia.

a. *Externa.* Rubor, tumor, et dolor auris externae.

b. *In-*

t) Huc VOGELII: *hippos*: oculorum constans agitatio, malum ab ortu contractum n. 199. *illofis*: oculorum peruersio acuta n. 200. *Cincklejis* palpebrarum nictitatio perpetua n. 201. *cataclasis*; al-

terutius oculi oclusio spastica, acuta n. 202. *cillofis*: cilia superioris perpetuus tremor n. 202. *Hypophasis*, albi oculo um inter dormiendum subapparitio n. 234.

b. *Interna*. Dolor magnus, ardens et pulsabilis auris internae, auditus perfacilis.

OTORRHAGIA. Haemorrhagia aurium.

OTORRHOEA. Apocenosia aurium.

ANOSMIA. Olfactus deprauatus.

NASITIS. Phlegmasia nasi.

EPISTAXIS. Haemorrhagia narium (actiua).

RHINORRHAGIA. Apocenosia narium cruenta (passiua) ^u).

CORYZA. Apocenosia humoris pellucidi, limpidi, mucosi, visceridi, e naribus. Dolores varii, vagi, fixi, carebarraria, hemicrania: sternutatio, dolor grauatiuus, tensiuius ad sinus narium, extricatio materiae albae et acris, interdum striis sanguineis intermixtis (crudae): aliquando et crassioris, flauescantis (coctae).

OZAENA. Apocenosia puriformis (purulenta etiam) e naribus.

RHINOSTEGNOSIS. *Narium angustia*: difficilis per nares respiratio, vt per os potissimum fiat, dysodia e naribus, vox nasalis.

RHINOCRESMOS. *Narium pruritus*, vt adfecti nasum internum manu fricare cogantur, vt non raro epistaxis, rhinorrhagia, aut exulceratio sequantur.

GELASMVS. *Risus Sardonijs*. Subdelirium, sub quo aeger iracundia potius, quam gaudio, adfici dicitur, risu inuoluntario designatum.

STENOSTEGNOSIS. *Obstructio ductus saliuales Stenoniani*. Tumor parotidis, salivae copia in ore imminuta, vlcus in gena, ductui respondens, per quod saliuia profluit.

CHILON. Labrofulcium, cheilocace. Labium superius tumidum et inflammatum: tota pars gibba et prominens nasi crassescit cum dolore aut aucta sensibilitate: dein crispatur et rubescit cutis, sub naribus ad labium extenden-

^u) HIPPOCRATES epistaxin simpliciter haemorrhagiam vocat, eamque *errousin*, quando cum impetu fit (actiuam) et *stalagmon*, dum stillatim fit (passiuam).

tenfa, inftar eryfipelatis, labium vniuerfum craffefcit et induratur.

STOMADYSODIA. Foetor oris.

TRISMVS. Spafmus maxillae inferioris, tonicus (*capiftrum*), clonicus, color oris, compreffus externi, mutatus; in hoc ftridor dentium.

AMASTESIS. Mafticatio abolita.

BRADYMASTESIS. Mafticatio deprauata.

PTYALISMVS. Apocenofis ex ore, fine expectoratione et vomitu.

STOMACACE. Haemorrhagia paffiua ex ore, gingiuis emolitis, fordidis, putridifue.

ODONTALGIA. Dolor, ad dentes, gingiuas, relatus. — In specie citra phlegmafiam.

ODONTITIS. Inflammatio gingiuarum: tumor, calor, rubor auctus gingivae, dolor diftenuus, pulfabilis, ptyalifmus.

PARVLIS. Tuberculum dolens, inflammatum in gingiua, a dente recedente, dolor acerrimus, dens interdum vere, aut adparenter, ad fenfum, protrufus x).

EPVLIS. Tuberculum in gingiuis citra phlegmafiam.

PRISIS. HIPPOCR. *Stridor dentium*. Inuita, fonora, dentium concuffio, a maxillis, fub varia directione fubito fibi adpreffis.

AGOMPHIASIS, *Gomphiafis*. Dentium vacillatio.

AGEVSTIA. Guftus debilis, deprauatus, abolitus.

GLOSSITIS. Dolor, tumor, linguae; loquela, deglutitio difficiles, ptyalifmus vifcidus. Est et omnino phlegmafia linguae.

RANVLA. BATRACHVS PAVLLI y). Tumor glandularum fublingualium, (a ductu excretorio obftructo).

PARAGLOSSE. Linguae, *vel* ore extrufae, *vel* motu deglutitorio in fauces reuolutae, eius magnitudine vel aucta vel imminuta, ectopia z).

MVTI-

x) De HAEN pr. path. l. 200 fq. guae violenta acuta extrufio n. 197.

y) L. III. c. 24.

gloffocoma linguae violenta, acuta

z) VOGELIYS: *gloffocela*: lin- reuulfio n. 198.

MUTITAS. Voces articulatas edendi impotentia.

APHONIA. Plenaria vocis, citra stuporem, syncopen, asphyxiam, suppressio.

PARAPHONIA. Vocem solitam edendi impotentia.

PSELLISMVS. Syllabas quasdam pronunciandi impotentia ^{a)}.

CYNANCHE. ANGINA. Phlegmasia oris, faucium, actiua, passiuā, aut cum pyrexia (*cynanche*), aut apyreta (*angina*), per angustiae in faucibus sensum, et deglutitionem, respirationemque, difficiles, potissimum designata, ut tamen tumor et dolor glandularum externarum simul comprehendantur.

PHARYNGITIS. Signa cynanches magis perspicua. [Vox mutata, deglutitio difficilis, dolens, saepe impossibilis, materia deglutienda per nares rediens, aut in asperam arteriam pulsā, tussim violentissimam excitans. Pyrexia plerumque mediocris. Impetus, seu phlegmasia, refertur ad pharyngeam.

LARYNGITIS. Signa cynanches minus manifesta: pyrexia, vox acutissima, clangosa, sibilans, inspiratio acute dolens, respiratio parua, frequens, erecta cum summo molimine, deglutitio dolorosa, rubor faciei et oculorum, vertigo.

TRACHEALIS. Signa cynanches. Vox acuta, clangosa, sibilans, inspiratio parua, frequens, cum summo molimine, summa angustia, tussis clangosa, dolor sub laryngis, in deglutitione, eleuatione, ingens, loquela auctus, si muscularis ^{b)}.

PAROTITIS. Cynanche, angina, cum tumore externo parotidum et glandularum maxillarium magno, respiratio minus laesa, os aperiendi et deglutiendi difficultas, synocha plerumque lenis.

TON-

^{a)} Cf. m. anon. circa reliquas huc pertinentes passiones.

^{b)} Haec humida constituit hodie adeo celebrem anginam polyposam, quae maximam partem quidem, ut omnes phlegmasiae

humidae, ad catarrheuma spectat, plethorae tamen, et neurosi, relaeque communis est; quam enim Hallae vidi, ad neurosin omnino pertinebat, docente medendi methodo. Cf. catarrh. pathol.

TONSILLARIS. *Paristhmia, antiades, auct.* Cynanche, angina, tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens, respiratio difficilis.

THYMICA. Phlegmasia glandulae thymus: tumor ad imam colli partem, iuxta sternum: deglutitorum vomitus, nulla in faucibus mutatio.

NASALIS. Phlegmasia membranae pituitariae, nares posticas succingentis: difficultas loquendi, deglutiendi, et per nares respirandi, dolores, velum palatinum, eiusque columnas et tubas Eustachii distrahentes, noctu adaucti, rhinostegnosis.

HYPOSTAPHYLE. Phlegmasia, relaxatio, vuulae.

HIMANTOSIS: *Himantion: himas.* Vuulae solito maior longitudo et gracilitas.

CIONIS. Dolorifica vuulae crassities c).

DYSPHAGIA. Dolor et difficultas deglutitionem retardans, impediens, citra respirationis laesionem.

HYDROPHOBIA. Summa potulentorum aut auersatio, aut dysphagia, aut vtraque, sub deglutitione eorum summa anxietas, imo convulsiones, sitis ingens. Phlegmasia passiva, plerumque occulta, pharyngis. — **RABIES** dicitur, quae est a morfu, aut halitu, attactu, animalis, etiam hominis, potissimum rabidi, aut solum irati, ope salivae, eadem lege contagiosa, qua contagium fuit susceptum, stipata plerumque spuma oris, et insuperabili desiderio, contagium propagandi per inorsum, aut salivae in adstantes, exspuitionem; pulsus pleni, contracti, irregulares, urinae parcae copiae excretio frequens cum tremore et convulsione, rauco, vox, clamori animalis rabidi (v. c. canis) non absimilis, et similis decubitus: dyspnoea, oculorum rubedo, corpus extenuatur, pallescit, insudat, lingua ex ore exseritur, priapismus, gonorrhoea,

c) Huc defectus vuulae: sequuntur haemoptoe, pneumo- phthoe. MORGAGNI de sed. morb. XXII, 26,

norrhoea, vomitus bilis nigricantis, pars demorsa exulceratur; paraphrenitis, paraphrosyne, rel. d).

TRACHELOPHYMA seu BRONCHOCELE. SAGAR. et de SAUVAGES. Tumor anticae colli partis non inflammatorius, nec purulentus e).

OBSTIPITAS. Capitis inflexio (spastica) in vnam alteramue plagam, hinc lateralis, antica, postica, prona, supina. Ultima est clonica, reliquae tonicae.

II. THORACIS PASSIONES.

MASTODYNIA. Notabilis et constans mammae dolor.

SPARGANOSIS. Tumor mammarum in vbera praebentibus.

AGALACTIA. *Aglactatio*. Lactis defectus in feminis, vbera praebentibus, aut suppressio f).

GALACTIRRHOEA. Spontaneus lactis e papillis effluxus.

OSCEDO. Oscitatio repetita.

SINGULTVS. — STERNVTATIO. — SVSPIRIVM.

SCREATVS. Faucium muci sonora excretio.

TVSSIS. Sonora aëris, per clonicum organorum respirationis spasmum, per os expulsio:

I. Va-

d) Illa *spontanea* dicitur, ob rabiem, quae et *canina* vocatur, quum per canes frequentius inducatur, ea quidem ratione, vt in rabie interdum abesse hydrophobia vera praedicetur. Igitur ob vagas auctorum descriptiones vtramque distinguere non possumus, maxime quum natura hydrophobiae adhuc lateat, cui eruendae neque extispicia cadauerum huc vsque satisfaciunt. Nonne autem, si ponis, dari cellulosae palpitationem nimiam, quam fluidorum approximatio adaugeat, eandemque hic tum in toto corpore, tum maxime ad oesophagum ponis, hydrophobiam explicare poteris? Eam adesse suadent etiam cadauerum sectiones, quae oesophagi inflammationem

adesse docuerunt, et ficitas parrium, humorum spissitudo, vt sanguinis in encephalo, bilis ad hepar, vnde ad solidorum inertiam, seu irritabilitatem imminutam, concludere possumus. Nonne remedia huc vsque nota ea sunt, quae imminuunt cellulosa palpitationem, vt mercurialia, aut in specie irritabilitatem excitant, vt cantharides, et similia?

e) Huc *Apomytosis* SAGAR. Succussio cutis et capitis cum trunci totius agitatione tremula et violenta, exspiratio sonora, quasi stertorosa.

f) Huc *lactae metastases*, quas vide ad hanc passionem aliasque in catarrhem. pathologia.

1. *Variat se de:*

a. *Idiopathica*, ex respirationis organo primarie adfecto:

a. *Laryngea*. Sensus irritationis ad laryngem.

b. *Trachealis*. Sensus irritationis et spasmus ad tracheam.

c. *Pulmonalis*. Sensus irritationis et spasmus ad pulmones.

d. *Pleurodea*. Sensus irritationis ad pleuram, mediastinum vtrumque.

e. *Diaphragmatica*. Sensus irritationis et spasmus ad diaphragma.

b. *Sympathica*, ex respirationis organo sympathice adfecto:

a. *Oesophagea*, sensus irritationis et spasmus ad oesophagum, aut signa, sedem eius hic declarantia.

b. *Gastrica*, causa irritationis haerens in ventriculo.

α. *Simplex*, gastrica, aucta post repletionem ventriculi.

β. *Convulsiva, ferina, clangosa, coqueluche* dicta, Kinkcough Anglis. *Pertussis* ALLEN. 8).

Incipit cum febricula, ut plurimum sensim crescit tussendi conatus, cum repetita, diu protracta, expiratione, insequente tarda, difficili, sonora (instar gallinacei), clamosa inspiratione, dein mucus sincerus expectoratur. Paroxysmos praecedit vel titillatio gutturis, vel suffocatio minata, in paroxysmo venae tument, arteriae fortius pulsant, caput dolet, oculi prominent, lacrimae fluunt, palpebrae tument, facies turgescit, rubet, aut livescit, aeger veluti suffocatus sensim ad se redit, dum e naribus et per os, vomitu etiam, et maiori quidem leuamine, aliena reiicit. Convulsiones aut apoplexia metuendae, nisi accendant,

imo diuturna phthisin minatur et infert. Pertinet ad varios morbos, et irritabilitati ventriculi debetur, ad respirationis organa propagatae. Bina tempora distinguit *ill* STOLL.

1. Quo ventriculus fere solus aegrotabat, et materies prava abdominis, necdum in reliquum corpus, aut non, nisi perparum, dimanavit.
2. Quo pulmones non per sympathiam solum adficiuntur, sed ipsi iam suam e ventriculo labem, eamque variam, attraxerunt.

c. *Ex varia corporis parte oriunda.*

2. *Variat indole:*

- a. *Thymos. HIPPOCRATIS.* Tussis sicca, sine sputis.
- b. *Anacatharsis.* Tussis humida: humor mucosus, limpidus, viscidus, aut dilutus, interdum plus minus cruentus (crudus), aut flaescens, flavus (coctus), expuitur ^h).

CATARRHVS. *Rheuma.* SAUV. Post frigus vagum, horrores, rigorem, cum calore alternantes, tussi, coryza, ptyalismo, odontalgia, otalgia, aliquamdiu praegressis, aut perseverantibus quoque iisdem cum pyrexia vespertina, doloribus vagis, grauantibus, respirandi difficultas, cum coryza critica: sensus compressionis in pectore, anxietas, tussis initio sicca, post humida, critica,

h) „Tussim conuulsuam, inquit *ill*. STOLL l.c., quae sui generis et specificus morbus esset, numquam vidi; semper enim epidemicae febris characteres exhibuit luculentos, ut ab eadem etiam causa generari et eiusdem popularis aegritudinis diuersa solum modificatio videretur. -- Tusses conuulsucae, a me cum Viennae, tum in Hungaria obseruatae, fuisse omnes stomachicae: at non omnis stomachica fuit ideo con-

uulsus, hinc latius patet, et plures species complectitur. Tussis conuulsucae origo ex ventriculo communissima esse videtur. -- Explicare ex his certe poteris, cur multi tussim conuulsuam epidemicam viderint, dum morbilli epidemici erant, aut praegressi, non, quod tussis conuulsua ab acri esset, quod aer contineret, sed quod irritabilitas gastrica vnaque produceret.

critica, corporis totius lassitudo, plumbea grauitas, non raro angina ⁱ).

PLEVRODYNE. Pectoris ad latera, sternum, dorsum, dolor pungitius cum respiratione difficili, tussi, raro spuito cruento, apyrexia, sono thoracis integro.

a. MYOSITIS. Pleuritis notha, species. Phlegmasia musculorum intercostalium. Signa myositidis et pleurodynes.

b. PLEVROSPASMVS. Pleuritis notha, species. Palpitatio maior membranae, thoracem inuestientis, pleurae, et pulmones succingentis. Signa pleurodynes, absentia myositidis thoracicae.

a. Lateralis. Dolor ad latera.

b. Mediastinus:

α. Anterior. Dolor, ad sterni sinistram partem, ad pectus directus.

β. Posterior. Dolor, ad vertebrae dorsum, ad pectus internum tendens.

γ Diffusus. Spasmus tonicus pleurae, ut haec libera pulmones quasi fune constringat, coarctet; sensus constrictius ad mediastinum anterius et posterius.

N. Pleurodynes omnes vidi, sustinui, et quis non viderit simplices et haemoptyses comites ^k).

PNEV-

ⁱ) „Catarrhus morbus est, qui haeret in tota membrana Schneideriana, distributa per os, sinum ethmoidalem, sinus frontales, maxillares, siue antra Highmori, ossa spongiosa, per fauces, oesophagum, ventriculum, intestina, laryngem, asperam arteriam, bronchia, et vesiculas pulmonales; hoc omne est membranae Schneiderianae territorium. Hic locus catarrhorum est. Leuissima fit ibi inflammatio; stagnat humor, liquidissima pars exprimitur, tumet membrana, coquitur materia, et post 3. 4. spissa ex-

cernitur copiosissima., de HAEN. pr. path. I. 189. Ne negligas glandulas, simul occurrentes in his partibus.

^k) Sonus thoracis cognitus supponitur tum naturalis, tum praeternaturalis, secundum dogmata Cel. AVENBRVGGER, (cf. eius nouum inuentum, ex percuss. thoracis abstrus. morb. cognosc. in Cl. de WASSERBERG coll. opp. min. F. I. p. 319 sq.) cui fides omnino habenda, quum ill. STOLL. non dubitet, eius labores laudare.

PNEUMONIA. Pyrexia, febris, cum impetu ad respiratio-
nis organon, respiratio difficilis, dolor ad thoracem, tuf-
fis, sputa varia ^{l)}).

PLEVRITIS. Pneumonia, dolor pectoris acutus, viuidus,
punctorius, inspiratione, tussi, auctus, pulsus quasi spa-
stice constricti. Variat:

a. Indole:

a. Febrilis. Subito pleuritis, mox febris ^{m)}).

b. Febrifequa. Febris, dein die 3. 5. pleuritis ⁿ⁾),
aut post reditum paroxysmi intermittentis.

b. Sede:

a. Vera, lateralis, sicca. Dolor punctorius, in late-
re fixus (vt tamen in alterum, aut aliam pectoris par-
tem interdum migret), tussis aut deest, aut sicca est,
oritur tamen non numquam, maximeque temporis
successu, anacatharsis (ob pulmones), decubitus in la-
tus adfectum faciliior.

b. Mediastina, grauitas pectoris, respirandi difficul-
tas, tussis sicca.

α. Anterior, dolor punctorius ad sterni sinistram
partem, ad xiphoideam et pectus internum
tendens.

β. Posterior, dolor ad vertebrae dorsii, ad regionem
subscapularem extensus.

c. Pericardina. Dolor punctorius ac grauitas in
pectore, profundiores, anxietas, palpitatio cordis,
perpetua ad tussendum procliuitas.

d. DIAPHRAGMITIS. Dolor punctorius ab inferiori-
bus costis ad vltimas dorsii vertebrae. Oppressio pe-
ctoris, anxietas, spiritus brevis, interruptus, *singul-*
tuo-

^{l)} Tamquam genus, compre-
hendens species, mox dicendas,
ab auctoribus non sufficienter sae-
pe cultas, earumdemque affinita-
tem maximam, congrue ponitur,
voce, non nullis omnino vltra-
ta. -- Oritur interdum, a specie-

bus etiam vere distincta, ab in-
termittentibus, calidis initio tra-
ctatis. HUXHAM II. 30. CLEG-
HORN p. 263. SARCONE §. 221.

^{m)} e. c. SARCONE §. 149. 159.

ⁿ⁾ e. c. SARCONE §. 142.

tuofus, tuffis ficca, hypochondria reuulfa, fenfus tensionis, dolorisque vehementis, inftar cinguli thoracem inferiorem stringentis, inspiratione auctus, refpiratio breuis, vel parua et frequens, crefcens inaequaliter, feu, vel parua et frequens, vel rara et magna, palpitatio cordis, (gelafinus, paraphrenitis, paraphrofyne °).

PLEVROPERIPNEVMONIA. Signa pleuritidis et iam dicenda peripneumoniae, vt mox huius, mox illius signa emineant P).

PERIPNEVMONIA. Dolor pe&toris obtufus, obfcurus, quafi pe&tus comprimens: refpiratio breuis, aequalis, pleurumque fonora, fpiritus calidus, anxietas (genarum rubor): tuffis humida, lingua ex flauo rufa, pofttea nigrefcens. (Dolor pe&toris interdum fub fterno et inter fcapulas eft).

a. *Diffimulata.*

a. *Acuta*, ftipata pluribus hepatitidis fymptomatibus. Pyrexia, refpiratio difficilis, tuffis ficca, dolor fub fcapu-

o) Pleuritis inflammationem et ficcam et humidam conftituit, hanc autem frequentiore effe, credere fas eft, quum ex iis toleratis frequentiore pulmonum et pleurae coalitum repetas. --- Nonne quum pleurodyne pofta eft, obferuationes, vbi poft praegreffa pleuritidis figna nulla tamen alias confpicua pleuritidis figna in cadaueribus occurrebant, explicari poterunt? Pleuritidem enim fimulatam effe putes a pleurodyne, praecipue pleurofpafmo, eodemque forte plethorico. --- Num autem pleuritis habenda pro phlegmafia pleurae? etiam membranae contiguae pulmonum externae? Pleuram phlegmafiam pati, quis negauerit? Etiam citra pulmonum confenfum poffe, conftat, lites tamen auctorum ne tangam quidem, multo minus

ulterius ea de re hic difquiram, cuius vtilitatem non capio. Diaphragmitidem hic pofui, tum quod pertineat diaphragma ad refpirationis organon, tum quod non poffit facile et tuto definiri, an fit phlegmafia ipfius diaphragmatis, num pleurae contiguae.

p) Hac voce facile carere poffumus, eidem pneumoniae fubftituentes. Quamuis enim in cadaueribus pleuritidem ad folam pleuram referre poffis, pleuroperipneumoniae ad pleuram et pulmones, in viuientibus tamen adeo faepe non poteris: quare pulmonum etiam inflammationem in pleuritide etiam adeffe multi ftatuerunt, ideoque diftinctionem neglexerunt. Retinui tamen vocem, vt in pathologia fpeciali auctorum obferuationes poffint ad fuum titulum referri.

scapula et in regione hepatis, et alia hepatitidis signa, icterus, signa pyogeniae, phthiseos, rel. 9).

b. *Chronica, occulta* STOLL. ^{r)}) *Stenothoraces*, id est, thorace breuiori, angusto et compresso, praediti, collo longo, scapulis eminentioribus (ii dicuntur a veteribus *pterygodes*) corpore gracili, fibra tenera, delicata, summe irritabili, genis roseis, praediti, post catarrhi, pneumoniae, signa praegressa, laborant febris exigua, aut nulla, decubitu in vtrumque latus aut facili, aut non multum molesto, in vno tamen aliquando difficili et angustante, tussicula rara, sicca, aut cum sputis paucis, aridis, mucosis, lingua modice albescente, siti nulla, oppressione pectoris ex motu, dolore punctorio, ardore, pressione pectoris ex fortiori inspiratione, aut tussi, sub varia corporis positione, digestionem ventriculi languida, circa 3. 4. a sumto cibo horam.

b. *Simulata*; v. hepatitidem et splenitidem ^{s)}).

HAEMOPTYSIS. Pneumonia, cuius praecipuum symptoma est sanguinis, vel puri, vel cum sputis mixti, per os reiectio.

a. *Vera.* **HAEMOPTYSIS.** Quae oritur a vasis sanguiferis, ad respirationis organon pertinentibus. Notanda hic dispositio, quae est:

1. *Haereditaria* ^{t)}). Multis constat observationibus, procliuatatem ad haemoptysin alere integras saepe familias, vt certo aetatis anno compareat, imo exitialis fiat, licet omnes cautiones adhibeantur. Haec procliuas se manifestat signis peripneumoniae chronicae, pecto-

q) SARCONE §. 258.

r) R.M. T.I. p. 213 sq.

s) Peripneumonia, phlegmasia, ab omnibus ad pulmones relata, praecurrentibus praeter veteres, BOERHAAVIUS et SCHACHTIUS, distingui poterit, in *phlegmonodem*, quae ad vasa sanguifera pulmonalia pertinet, eandemque

duplicem, dum vel ad vasa pulmonalia, vel ad bronchialia spectat, atque in *erysipelatodem*, quae vasa etiam lymphatica tangit, et procul dubio est erysipelas pulmonum veterum, catarrhus pulmonum recentiorum.

t) LOMMII obs. p. 119. v. SWIETEN IV. 80. 81.

pectoris, colli, scapularum, conditione dicta, cute flaccidiori, tenuiori, pinguedinis defectu, systemate nervoso irritabili, mutationes anni temporum et tempestatum, animi pathemata, abusum calidorum, eupeptorum, aegre ferente, catarrho frequenti, colore faciei albicante, aut subflauo, cum viuido et amoeno rubore, cum profundis temporibus, ossibus zygomaticis eminentioribus; dentibus sanis, eorum colore lacteo, transparente (pneumophthoën etiam indicante); difficultate respirandi et anxietatis sensu sub scalarum montiumque adscensu, a leuiori corporis exercitio, vel solis cachinnis, tussi, pulsus fit celerior, oriuntur palpitatio cordis, facies rubedine suffunditur, et fatigatur corpus. Hypochondriacae subinde compressiones circa pectus, seu pleurospasmus, crebra suspiria, faucium spasmi, quasi hysterici, secretus phlegmatis salsi, dulcis, amari, et sapor oris similis, varius. Ingenium praeterea subtile atque acre, sensationes acutiores, imaginatio viuidior, propensio ad hilaritatem. Vita a parentibus, tum simili procliuitate, tum vera haemoptysi laborantibus, adepta. Aetas, impetum praefertim ad pectus plerumque experiens, ab anno XV. ad XXXVI.

2. *Adquisita.* Per corporis debilitatem, introductam per ea, quae robur vniuersi corporis deiciunt, aut in specie conformationem pectoris labefaciunt, quorsum vestes angustae, thoraces feminarum, aut congestiones ad pectus efficiunt, quorsum vitae genus, e. c. tibialium confectorum, eruditorum, tandem acris, calefacientia, cantus, risus, clamor, nimia. — Atque his similia tum haereditariae, tum adquisitae, occasiones etiam non raro constituunt. — *Differt autem haemoptysis:*

- a. *Gradu:*

- α. Maior, copiosa. germ. *Blutstürzung*. Tussis sicca, oppletio pectoris, anxietas, respirandi difficultas, proclivitas ad iracundiam, lassitudo, sapor oris salius, dulcis, amarus, varius, pulsus celeriores, plethorae, spuriae saltem, symptomata, obstipatio, signa spasmi: quibus fere praecedentibus et comitantibus, instanti se adiungunt: spasmi abdominales, praesertim praecordiorum, respiratio anxiosa et anhelosa, pleurospasmus et caloris sensus in pectore, interdum ardens aut pungens dolor, artuum grauitas, pulsus spastici, iidemque vel parui, vel maiores, palpitatio, genarum rubor, motus vndosus in hypochondriis versus diaphragma manifestus, grauior sapor oris salis, vel dulcis, vel amarus, vel diuersimode alienus. Deinde cum tussi, conuulsiva, etiam vomitui aemula, sanguinis sinceri, coccinei, spumantis, aliquando cum vasculis, fibris, membranulis commixti, excretio contingit, ad libras aestimanda. Postea respiratio fit liberior, et symptomata pleraque euanescent, ut tamen cum sensu lassitudinis, frigoris phaenomenis, sputum cruentum, sputum muci cum striis sanguineis, per plures dies continuet.
- β. Minor, germ. *Blutspucken*. Post anxietatem, ruborem genarum, frigus extremorum, horrorem, spasmos, palpitationem, sub pulsu etiam paruo in pulmonibus et faucibus sensus titillatorius, levisque stertor, quo sanguis ad aliquot uncias, aut minori copia, sputatione, screatu, sine vehementia, cum tussi placida, purus fluidusque elicitur: aut, his fere plerisque signis deficientibus, post pectoris angustiam, sub leui intra pulmones et fauces titillatione, in os adscendit, aut absque hoc etiam sensu excernitur.
- γ. Sede, non satis certo vere definienda:
- α. Trachealis. Laryngea ^{u)}).

Paruus

^{u)} CAELIVS AVREL. chron. II. II.

Paruus ac flauus sanguis, saepe sub striae, etiam tenuissimae, imagine, cum sputis redditur. Pruritus, titillatio ad tracheam, laryngem, cum leui tussicula: deinde plurimus sanguinis fluor, seu largior excretio, (si vere succedit); vox rauca, obtusa cum dolore, qui nunc titillatu, nunc tussicula vehementi, mouetur; plurimus, tenuis, spumofus, plerumque feruens, sanguis excluditur. Signa haemoptyseos, adq̄isitae, minoris.

β. Pulmonalis. Signa haemoptyseos haereditariae, aut adq̄isitae, maioris, minorisue.

1. *Idiopathica, primaria*:

a. *Ex arteriis pulmonalibus* veniente sanguine. Sanguinis, potissimum tenuis, floridi, spumosi, excretio, nisi in bronchiis moratus profundiorein colorem adsumferit.

b. *Ex arteriis bronchialibus*, plerumque exigua tantum sanguinis minus floridi et spumosi, cum muco solum permixti, rarius sinceri, sanguinis excretio, tussis forte facilius expers, rarius aut numquam magna.

2. *Sympathica, secundaria* *). Debetur haemoptysi tracheali, laryngeae, rarius pulmonali idiopathicae, et dein enumerandis spuriae speciebus, sanguine per laryngem delapso, et dein iterum reiecto. Signa haemoptyseos variae praegressa, et potissimum minoris. Color reiecti sanguinis, non spumosi, profundus. Cf. pathol. special.

b. *Spuria*. HAEMOPTOEN dixerim. Quae oritur a vasis sanguiferis, ad respirationis organon non pertinentibus. Absentia signorum haemoptysis verae.

a. A capite, naribus posticis.

Signa congestionum ad caput, non raro catarrhi, sputa rubicunda, non spumofum, nec rutilantem, sed profundiorein sanguinem, exhibentia.

b. E

x) v. c. v. SWIETEN IV. 3.

b. E faucibus y).

Signa praecedentis: scretu redditur sanguis; cibis, potus, gargarisma, sensum adstrictionis in faucibus excitant, insipientibus, depressa lingua, ostium arteriae apertae, sanguinem fundentis, et tumor aliquis patet.

c. Oesophagi.

Signa similia, scretu redditur sanguis parua copia: sensus adstrictionis in oesophago ab adsumtis.

d. Hypochondriaca z).

Est, quae debetur variae constitutioni aduersae viscerum hypochondriacorum, atque ad pathologiam specialem pertinet. Exhibet autem potissimum signa propria variae labi viscerum, et spuriam haemoptysin sistit. Huc tensio hypochondriorum, doloris grauatiui ad vniuersum abdomen sensus, dyspepsiae phaenomena. In gastricam, hepaticam, lienalem, sic dispecsi posset a).

PNEVMOPHTHOE, phthisis pulmonalis auctor.

Pneumonia chronica cum macie. (Praegressis plerumque aut dispositionis ad haemoptysin veram, aut catarrhi diuturnioris, signis.) Febris lenta, hectica, hemitritaea b), tussis, anacatharsis puriformis (purulenta), decubitus in latus adfectum difficilior, lateris adfecti manus tumida, pedis, in primis in latere adfecto, tumor, sudor nocturnus, matutinus, etiam solius faciei, frontis, pectoris, cum diarrhoea, aut alternans aut ea comitatus,

grypo-

y) CAELIVS AVREL. l. c. v. SWIETEN

z) CAELIVS AVREL. l. c. P. G SCHROEDER pec. d. de haemoptysi. Goett. 1766. Sect. 2.

a) Vix est, quod moneam, saepe difficulter species et varietates haemoptysis satis distingui posse, maxime in pathologia speciali, aut praxi, quum non omnia sem-

per signa adsint. Sic tussim non numquam abesse, exempla testantur. Cf. v. g. E. N. C. a. 1670. obs. 42. E. N. C. a. 1719. c. 7. p. 305. RHODII C. 8. obs. 33.

b) Exacerbationes, etiam hecticae, tempore digestionis contingunt, vt saepe hectica solum intermittens et hemitritaea videatur,

gryposis seu vngues adunci, spes sanitatis recuperandae admirabilis.

N. Affines esse passiones, pleuritidem, peripneumoniam, haemoptysin, pneumophthoën quis neget? Pleuritidis et peripneumoniae affinitatem facit pleuroperipneumonia, vt limites vtriusque aegre definias. Affines esse peripneumoniam et haemoptysin, quis neget, quum tam in vniuersum topicarum phlegmasiarum et haemorrhagiârum, quorsum pertinet haemoptysis, summa affinitas sit, quam negari nequeat in haemoptysi obtinere pulmonum phlegmasiam: quod enim pneumophthoë veram haemoptysin non raro sequatur, id certe non potest repeti a sanguine extra vasa fuso, putrescente, suppurante, sed a phlegmasia pulmonum: et varia etiam haemoptysis verae symptomata phlegmasiam testari possunt, quorsum et, praeter signa supra stabilita, sanguis, e vena missus, corio pleuritico tectus. Pneumophthoën vero ad phlegmasiam pulmonum pertinere, quis perneget? quum multa signa omnino peripneumoniam, chronicam scilicet, doceant, quod quidem et medendi methodus comprobatur. Catarrhum denique huc non inepte referri posse, inde concludas, quod toties peripneumoniam, haemoptysin, pneumophthoën excitet, et similem curationem desideret ^c).

2. Omnem pneumoniam esse tum actiuam, tum passiuam, et febribus variis tum intermittentibus, tum continuis stipari, quae vel praecedant, vel subsequantur, non est, quod repetam, quamuis in praxi summi momenti sit, haec aestimare.

3. Dolor, per SARCONÉ ^d) obseruata, potius tamquam primarium symptoma considerari debet, quam vt secundarium, vt, si dolori cito et rite prospicias, pneumoniam facile tollere possis. Anodyna autem sunt, quae

c) Consentunt etiam PRINGLE p. 194. et TISSOTVS §. 125.

d) §. 154. sq.

quae morbo respondent, ceterum et opiata ^{e)}). Quare ne mireris, opium etiam in haemoptysi et pneumophthoë commendari.

ANHELATIO. *Anhelitus*. Respirandi difficultas apyreta, angustiae in pectore sensus, potissimum, modo a decubitu, modo a gressu, augmento innotescens.

ORTHOPNOEA. Subitanea, sublimis, et suffocationem minitans, anhelatio, acutissima, periodica ^{f)}).

DYSPNOEA. Anhelatio continua, chronica.

PLEVRORRHOEA ^{g)}). Haemorrhagia, apocenos, facta in cauo thoracis: dyspnoea, sonus pectoris percussi obscuratus ad eam altitudinem, quam liquidum, extra vasa fusum, occupat.

a. **HAEMATHOEAX.** *Pleurorrhoea sanguinea* ^{h)}). Subperpetua magnaue praecordiorum anxietate, atque pectoris oppressione, corporis iactatio continua, sonitus in parte adfecta nullus, pulsus maxime contracti, celerissimi, ordinate inaequales: respiratio summe anxiosa, cum tussi crebra, suspiriis interruptis, venarum omnium detumescencia, oculorum rubedo, ephidrosis frigida circa iugulum et tempora, mutitas.

b. *Serosa, lymphatica*, v. pathol. catarrh. Hydrothorax.

c. *Purulenta. Empyema.* v. pyogen. pathol.

d. *Chylosa.* v. vulnera.

MACROPNOEA ⁱ⁾). Respiratio per longa intervalla contingens.

ASTHMA. Anhelatio chronica, periodica.

EPHIALTES. *Incubus auct.* Anhelatio querula, cum insomnio terrifico, dormientis in dorso.

STERTOR. Anhelatio sonora, seu sono respiratorio inuoluntario, sibiloso, saepe rauco, stipata ^{k)}).

APNOEA.

e) SARCONE §. 165 sq.

f) Huc catarrhus suffocativus auct. angina pectoris Anglor. cf. patholog. spec.

g) AVENERVGGER l. c. §. 32.

h) AVENERVGGER l. c. §. 47.

i) VOGEL n. 266.

k) VOGELIO n. 271. 272. *Rhachus*

APNOEA. Respiratio suppressa, abolita. Signa fere asphyxiae.

CARDITIS. Phlegmasia cordis: dolor punctorius sub ster-
no, palpitatio cordis, anxietas, continuæ, animi deli-
quia frequentia, pulsus parvi, frequentes, inaequales:
pyrexia, aliquando hydrophobia ^{l)}).

PALPITATIO. Pro ratione pulsus arteriarum maior cordis
pulsatio, validius pectus percutientis ^{m)}).

ANXIETAS. *Dysphoria, inquietas, iactatio, auct.* Mole-
sta ad praecordia sensatio.

a. Praecordialis. ALYSMVS Graec. Repetunt ab
impedito sanguinis per venam portarum circuitu, recti-
us nervis abdominalibus adfectis tribuitur. Pulsus et
respiratio minus mutati, summus ponderis opprimentis
ad scorbiculum cordis sensus, vt auellere tentent aegro-
ti, cardialgia grauissima, icterus saepe salubris.

b. Pneumonica. Cum extremorum frigore summa
pectoris angustia, respiratio difficilis, pulsus vacillantes,
celeres, debiles.

α. *Ab immeabilitate sanguinis per cor sinistrum et maio-
res aortae ramos.* Pulsus inaequales, debilitas, an-
gor cordis et praecordiorum intolerabilis.

β. *Ab immeabilitate sanguinis per cor dextrum et arte-
riae pulmonalis.* Frequentia et profunda suspiria,
praecordiorum grauamen, orthopnoea, adiuncta saepe
specie α. Peripneumoniae, cynanches, orthopnoeae,
comes ⁿ⁾).

CAR-

chus s. stertor dicitur sonus, e na-
ribus editus: *Rhochmus* seu
Ronchus sonus stertorosus intra
fauces.

l) Caue, signa pleraque refe-
ras ad morbum, neurosin, aliam-
que subesse passionem pures. Il-
lustrat affinitatem morborum et
passionum. -- b. MECKEL (mem.

de l'ac. des sc. de Berl. 1756. p. 31.
Comm. Lips. VIII. 703 sq.) eius
existentiam negat.

m) *Palpitatio*, non adiecto vo-
ce *cordis*, hanc semper denotat,
quum aliis, v. c. palpitationi cel-
lulosaë, vox adiciatur necessaria.

n) Cf. BOERHAAVE. §. 631.
BRENDL. op. III. 100.

CARDIOGMVS. Grauis et pertinax molestia in praecordiis cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis, a minimo motu increfscens, dyspnoea, pulsus intermittens.

III. PASSIONES ABDOMINIS:

VIARVM VRINAE ET GENITALIVM.

HEPATITIS. Phlegmasia hepatis o).

a. *Acuta:*

a. Vera, designata. Pyrexia, tumor et dolor hypochondrii dextri, decubitus difficilis in latus dextrum.

α. *Lobi hypochondriaci dextri hepatis:*

1. Partis conuexae. Hepatitis designata, dyspnoea, tussis sicca, leuior, quam in pleuritide, dolor acutus, tensius, per singulas respirationes crescens, ad iugulum saepe adscendens, tumor, nisi sub costis spurii lateat, pulsus duri.

2. Partis concauae. Dolor grauatiuus, praecedenti (1) mitior, saepe tactu solum innotescens, respiratio minus turbata, nausea, vomitus maiores, pulsus molles, aurigo. Illâ (1) frequentior.

3. Cystidis felleae. *Cystitis* Cl. SABATIER P).
Signa hepatitidis, tumor hypochondrii dextri, tactu innotescens, turgor vesiculae, digitis cedentis.

β. *Lobi epigastrici,* FERREIN 9).

Cardialgia, alysinus, urgente magis dolore, febris, epigastrium, in aegro, genua flectente atque in dorsum cubante, exploratum *pressumque dolet*.

b. Simulata. v. myositis et nephritis.

c. Diffimulata. Pyrexia, dolores vagi, caput, collum, dorsum, occupantes: die 3. aut 4. dolor hypochondrii dextri.

o) In arteriosam et venosam distincta a nonnullis, v. c. SCHACHT.

p) D. de calculis fell. Monsp.

1758. p. 74. Comm. Lips. VII. 26 sq.

q) Mem. de l'Ac. des sc. de Paris 1766. p. 121.

poichondrii dextri, interdum et hypochondrii sinistri, totiusue abdominis, *aut* dolor pulsatilis *sub scapulis*. Tussis sicca, profunda. Diebus 1. 2. 3. sputa cruda, vt in peripneumonia, deinde flaua et sanguine tincta, respiratio difficilis; *decubitus* inde a die 3. 4. alienatus, vt truncus incuruetur.

b. *Chronica*. Hepatalgia SAUVAG. Hepatitis chronica, apyreta, symptomata ceterum a) similia r).

SPLENITIS. Phlegmasia splenis. (*Splenalgia* SAUV. chronica potius).

a. *Designata*. Pyrexia, saepe tetartophya: tumor et dolor hypochondrii sinistri pulsatilis, tactu auctus, decubitus in latus sinistrum difficilis, tumor renitens in regione lienis: pedes et genua rubent, nares aurefque interdum pallescunt.

b. *Diffimulata*. Simulata pleuritis s).

c. *Simulata*. v. myofit.

PANCREATITIS. Dolor in superiori et media abdominis regione, profundus, cum pyrexia, pancreatis phlegmasiam sistit.

PERITONITIS. Phlegmasia peritonei. Pyrexia, abdominis, atque ad spinam dorsii, dolor, punctorius, corpore erecto auctus, defectus signorum aliarum phlegmasiarum, tumor abdominis.

EPIPLOITIS SAUV. OMENTITIS. Pyrexia, dolor in superiori et media abdominis regione, plerumque cum tumore.

GASTRITIS. Phlegmasia ventriculi:

a. *Vera*. Febris, plerumque *typhus*, anxietas praecordialis, epigastrii ardor et dolor, respiratione, ingestis, tactu, auctus, vomituritio, adsumtorum vomitus, singultus, alui

r) Aequae est actiua, passiuæ, ac pneumonia, atque eadem varias ad febres relatione gaudet.

s) v. SWIETEN §. 958. SAUV. pleurit. sp. 19.

alui obstipatio, extremitatum frigus, pulsus depressi, inaequales.

α. Pylori. Dolor in regione pylori, vomitus omnium adfumentorum.

β. Cardiac. Dolor in regione cardiaca: grauior singultus, cardialgia et syncope frequens.

b. *Simulata*. v. myofit. ^t).

APEPSIA. Digestio ciborum abolita.

BRADYPEPSIA. Concoctio ciborum imbecillis ^u).

DYSPEPSIA. Concoctio vitiose eueniens.

CARDIALGIA. Sensatio ad epigastrium molesta, syncopen minitans.

GASTRODYNIA. Dolor in regione stomachi notabilis et constans, citra pyrexiam, aut syncopes periculum ^u).

PYROSIS. Sensus ardoris, ad ventriculum et oesophagum relatus.

FLATULENTIA. RVCTVS. RVMINATIO. Flatuum emissio ^x).

BVLIMIA. ADDEPHAGIA. Iusto maioris alimentorum copiae appetitus.

PICA. Alimentorum non suetorum, (sanisque insalubrium, cum consuetorum auersatione) appetitus.

POLYDIPSIA. Potulentorum immodicus appetitus.

ADIPSIA. Potulentorum auersatio.

ANOREXIA. Citra fastidium abolitus ciborum appetitus.

VOMITVRITIO; NAVSEA, CALOSITIA, ANATROPE. Abolitus ciborum appetitus, ructus, ptyalismus, vomendi conatus frustraneus ^y).

VOMI-

t) Caue, signa febris typhodes habeas pro morbi, neurosis, sepsis, signis, et passionem cum alia confundas, nisi morbi vere subsint dicti.

u) GALEN. sympt. diff. c. 4.

v) Cardialgiae nomine saepe apud auctores indicatur.

x) *Flatulentia* retentos potius flatus, stomachum et intestina di-

stendentes, designat. *Borborygmi, murmura*, flatus intestinorum oberrantes cum sonitu indicant.

y) Si mauis, *Nausea, anatrope*: Abolitus ciborum appetitus cum fastidio, horrore. *Vomituritio*: Ructus, ptyalismus, vomendi conatus frustraneus.

VOMITVS. In ventriculo, oesophago, contentorum per
s reiectio ^z).

DIAPHTHORA. VOGEL. Ciborum corruptio in ventriculo.

CHOLERA. Vomitus assiduus, biliosus, vel acris, dolor abdominis, nausea, tenesmus, diarrhoea, eclipsis, furarum gongrona (crampus, s. spasmus tonicus).

ENTERITIS. ILIACA. ILEVS. COLICA. Auctor. Phlegmasia intestinorum. Dolor abdominis summus, tactum non ferens, plus minus fixus, qui a phlegmasiis reliquis abdominalibus distingui potest (vt tamen hepatitidem, splenitidem, imo quibusdam pleuritidem mentiatur) cum tumore abdominis, meteorismo, obstipatione alui, dyspnoea, vomitu assiduo et vehementi, aliquando dysenteria, pyrexia aut conspicua, aut latente, aut nulla ^a).

MESENTERITIS. MESENERICA. Phlegmasia mesenterii. Dolor circa umbilicalem regionem profundus, aluus tarda, obstipata, signa phlegmasiae.

MESENTERITIS ET OMENTITIS. *Febris puerperarum Anglorum*, Cl. HVLME, alior. Dolor fixus, permanens, circa umbilicum et regiones iliacas, abdomen tactum non ferens, cephalalgia frontalis, temporalis, dyslochia, agalactia, obstipatio.

RACHIALGIA SAUV. Colica pictonum *auctor.* Passio, etiam veteribus ^b) non incognita, ab anno 1572.

H 2

potif-

z) Num vomitus ab irritabilitate ventriculi aucta; an ab imminuta potius et adaucta contractilitate mortua? Certe opium non raro vomitum ciert, ipecacuanha, in diminuta dosi, ad 8. grani partem. antispasmodicum hodie celebre est. Num vomitus a contractilitate vtraque?

a) Iliaca auctoribus dicitur, quae ad intestina tenuia spectet, et potissimum dolore fixo circa umbilicum atroci, distensione epigastrii et umbilici, rel. stipata sit; colica vocatur, quae ad crassa intestina pertineat, colon et caecum, atque dolore ad late-

ra abdominis, lumborum gravitate, dolore, potissimum agnoscat. Quemadmodum vero dolor saepe non certus satis sedis passionis index est, ita in primis de enteritide statui debet, nullo autem rei detrimento, testibus praeter alios egregio MORGAGNO de sed. m. XXXIV. r sq. XXXV. 20. de HAEN l. c. XIV. S. l. c. 3. qui etiam monent, subesse interdum enteritidem, quae sui signa vix edat. Ileus dicitur auctoribus poterit, quae stercoris vomitu conspicua est.

b) Vt PAVLLO l. III. c. 18.

potissimum celebris. Dolores abdominis atroces, ad lumbos et dorsum serpentes, obstipatio pertinax, tubercula ad manus, artuum dolor rheumaticus, aut torpor, pulsus duri, vt arteriae filum ferreum, valideque tensum referant, aequales, tardi, vibrantes: Anus clauditur sursum tractus, faeces, stercoris ouilli instar, cinericeae et durae excluduntur. Transire solet in paralyfin, contracturam, potissimum extremitatum superiorum, hydropem, phlegmatiam; rel. Soluitur haemorrhagia, sudore largiore; rel. Distinguitur varie potissimum in vegetabilem et mineralem, ab iis, qui venenis solis tribuunt, quare confer pathol. special.

HAEMATHEMESIS. Vomitus cruentus *auct.* Post vomituritiones, vomitus materiae cruentae, et ante adsumptorum, cum signis spasmi, etiam abdominis.

MELAENA. *Morbus niger auct.* Materiae nigricantis per os, aut aluum, aut vtrumque, eiection, cum vomitu, spasmis, doloribus abdominis, pulsu debili, lipothymia, syncope, ephidrosi frigida.

HAEMORRHOIS. Haemorrhoides *auct.* *Haemorrhoidaria febris STOERCKII.* Post **DYSHAEMORRHOIDEM** (*anomalias haemorrhoidum STAHLIAN.*) seu congestiones abdominales (venae portarum), lumbaginem, ischiadem, colicam, anxietatem praecordialem, dyspnoeam, tensionem ceruicis, cephalalgiam, vertiginem, rel., e **MARISCIS**, seu tumoribus ad ani marginem sanguineis, dysuria, tenesmo, proctalgia, stipatis, dolorificis, rubris, duris, in recto etiam altius latentibus, citra abdominis tormina, haemorrhagia e podice (c).

PROC-

c) Tres fere species constituit LORRY (m. cur. p. 50).

α. *Erysipelatosa*, dictae.

β. *Phlegmonodes*, quae cito in suppurationem transeat.

γ. *Herpeticae*, quae herpetibus ani et pruritu molesta sit.

Maximi vero ponderis est distinctio in *actiuam* et *passiuam*.

PROCTITIS. PROCTALGIA. Extremi recti et vicinarum dolor, tumor, alui difficultas, pyrexia.

INTERTRIGO, diatrimma, paratrimma, auct. potissimum *graec. d*). Passio puberum, caste viuentium, vtriusque sexus, veneris stimulos sentientium, hac auctos, per aliquot horas detinens, potissimum noctu, a familiari consortio etiam subiecti cum altero sexu, stimulis ad venerem excitatis, hinc et a spirituosorum, aromaticum, usu aucta. Perinaeum primum admodum prurit cum artuum tremore, et palpitatione sub scalptu: dein partes maculis flavis, vix supra cutim exstantibus, distinctae sunt, scrotum est rugosum, retractum sub paroxysmo, ut labia pudendorum in feminis: adest erectio penis et libidinis ardens cupido, partis epidermis rugosa olet, et alluitur liquore vinctuoso; pruritus sensim magis magisque augetur et per intervalla quasi acubus punguntur partes, ut eiulent adfecti, ardor semper adest, et ad leuissimum incessum exhalat humor olentissimus. Lichenis, crustarum per se expers, nisi scalptu frequenti epidermis escharosa secesserit. Fit, ut frequenti scalpura semen effundatur, ut a repetita possit tabes dorsalis induci. Neque ab ea sunt immunes senes: feminae maturius ea corripuntur.

OBSTIPATIO. Obstructio alui *auct.* Segnis, difficilis, rara, vel omnino diutius sublata, faecum aluinarum excretio: symptomatibus aut nullis, aut his fere stipata: Flatulentia, borborygmi, abdomen tensum, colica, alymus, dyspnoea, urinae difficultas, congestiones ad caput, pedum frigus, rel.

TENESMVS. Assidui, faeces aluinas egerendi stimulus et conatus, cum deiectione deinde subsequente parca, mucosa.

DYSEN-

DYSENTERIA. Cum faecum aluinarum fere retentione, aut tarda, rara, earundem durarum, ficcarum glebularum, excretionem, et tenesmo, tensione et dolore abdominis, pyrexia, frequens, torminosa, mucosa, cruenta, parca per anum apocenosia, ut simul sumpta deiectionum quotidianarum copia non adaequet congruam adsumtorum, aut sani hominis deiectionum suetarum, copiam — Phlegmasia interioris intestinorum, villosae membranae, catarrhus intestinorum: testibus v.g. A. WILSON ^{e)}, de HAEN ^{f)}, ill. STOLL. ^{g)}. Plerumque *acuta, epidemica, contagiosa* (per morbum puta, sepsin simplicem aut biliosam), feбри, aut intermittente, aut continua, aut nulla fere stipata. *Chronicam* sistit STOLL. ^{h)}: remittens acuta, secessus rariores, vix torminosi, multis septimanis: cadauera sistunt enteritidem chronicam, duritiem, rigiditatem intestinorum, potissimum crassorum. — *Tenesmus* vere est dysenteria ad intestinum rectum ⁱ⁾.

DIARRHOEA. Apocenosia aluina larga, frequens, apyreta, cum faecibus aut dissolutis, aut scybalis etiam induratis (saltem initio).

LIENTERIA. Cito subsequens adsumptionem alimentorum, parum aut vix mutatorum digestionem, per aluum deiectionem, diarrhoea.

COELIACA. Faecum, diuersimode constitutarum quoad colorem (albarum, albicantium, cinerearum, grisearum), et consistentiam, excretio subitanea, plerumque copiosa, vel

e) Comm. Lips. X. 408.

f) L. c. ad catarrh. p. 101. n. i.

g) R. M. T. 3.

h) R. M. T. 3. p. 292.

i) Noli putare, veterum de dysenteria doctrinam si passionis signa spectes, recedere a recentiorum descriptione. Etenim si veteres euoluas, et loca de dysenteria integra, nequaquam male auulsa, spectas, nullum fere signum desiderabis. Theoriam e contrario longe aliam esse, ac vere deberet, deprehendes. Quod

quidem alia occasione, stabilitis per collecta veterum loca dysenteriae antiquitatibus forte comprobaturus sum: forte inquam, laborem enim, iam ante aliquot annos peractum, huc usque seposui, licet vir Cel. eius editionem suaderet, laudaret collectionem. — Secessum muci enterici, sub polyporum, membranarum, ipsorum etiam intestinorum forma euentientem, et phlegmasiae humidae testem, in pathologia speciali ulterius considerabo.

vel assidua, vel ex interuallo vnus vel plurium dierum. In ventriculo sensus ardoris, aut frigoris, adpetitus probus, aut anorexia, ructus, sitis, murmura, ventris tumor, dolor, progrediente passione febricula, febris, virium decrementum, cutis ariditas, phlegmatia pedum, dein et aliquando sanguis purus, vel flauus, faecibus admixtus est *).

HEPATIRRHOEA. Apocenos, haemorrhagia intestinorum passua, diarrhoea; deiectiones dilutae, et loturae carnum similes, largae, citra tormina, mariscas¹⁾).

ASCITES. Cum grauitatis sensu totius abdominis tumor, citra elasticitatem ac sonum, fluctuationis ideam exhibens. Est autem *fluctuatio*, antitypia seu percussio percepta, dum latus abdominis manu vna premitur, altera latus abdominis percutitur oppositum. — Est humoris in abdomine collectio cum dyspepsia, dyspnoea, alysmo, pyrexia, saltem passua, occulta, non raro tympanitide, phlegmatia, vrina lateritia. — In specie est collectio aquarum intra peritonei cauum et viscera. — **INTERCVS** est humoris intra peritoneum et musculos abdominis collectio, intumescencia partialis: deficiunt sitis, dyspnoea, phlegmatia, vrina lateritia. **SPLANCHNODES** est humoris intra viscus abdominale collectio: intumescencia partialis, sedi visceris respondens.

TYMPANITES. Levis et elastica totius abdominis intumescencia, pulsata sonum edens: dolores, borborygmi, obstipatio, ceterarum partium macies: passio tarda.

a. *Ab-*

* Cf. VOGEL ther. §. 333 sq. et d. de flux. coel. gen. not. Goett. ed.

1) Nonne intestinorum hactenus traditae passiones in eo omnes sibi affines, quod ponant irritabilitatem ventriculi, imo intestinorum, imminutam, vt nauseosa, v. g. tartarus emeticus, ipecacuanha, rheum barbarum, rel. non ideo iuuent saepe, quod multum causae (quae redeat ad

faburram, adiapneustiam) euacuando per vomitum, aluum, sudorem. detrahant, sed quod excitent irritabilitatem ventriculi? Quare nec obstipatio et diarrhoea adeo sibi oppositae sunt passiones, vt vna facile in alteram potius transeat, vtraque insdem cedat medicamentis, quod rhei, chinae corticis, vsus vel solus comprobatur. —

a. *Diffusus: Abdominalis* ^{m)}):

a. *Siccus*. Recens fere quicumque; resonitus euidentior, flatus rari, minus leuantes, dolores exteriores, obstipatio minus pertinax.

b. *Humidus* ⁿ⁾) ascitis comes: intumescit abdomen et subito, digitis pulsatum, digitum cum sonitu repellit, flatulentia, flatus, ano et cato erumpentes, leuantes, obstipatio, vrina pauca, rubra, phlegmatia pedum.

b. *Topicus*:

a. *Intestinalis* ^{o)}).

Incipit a borborygmis, doloribus abdominis atrocibus, pertinacibus, initio ad umbilicum, dein ad ambitum abdominis conspicuis, obstipatio, a flatibus erumpentibus leuamen fugax; deficiunt phlegmatia, sitis vrgens, vrina lateritia.

b. *Enterophyodes* ^{p)}).

Tympanites diffusus et partialis; tumor inaequalis, v. c. pneumatomphalos, pneumatocele.

METEORISMVS. Intumescencia abdominis, vel hypochondriorum, acuta, aut doloris experts, cum exiguo dolore, et sensu grauitatis lumborum, ischuria.

a. *Diffusus*. Abdominis tumor, versus umbilicum, cum tensione, vt in tympanite. Comes acutarum, tri-taeophyae, amphimerinae, synochae, enteritidis, rel. (nisi ad morbum, potissimum sepsin, neurosin, at-tinet).

b. *Topicus*.

a. [Ventriculi.]

Inflatio epigastrii, vt nullum cauum sit a sterno ad umbilicum, cum aut sine dolore.

b. *Intestinorum*. —

NEPHRITIS. Dolor fixus in regione renum et vre-terum, raro ad abdomen atque externas partes delatus, in-

m) SAUV. sp. 2.

n) SAUV. sp. 4.

o) SAUV. sp. 1.

p) SAUV. sp. 4.

interdum ad spinæ dorsi latus procedens: mictio turbata, vrina colore et contentis varia, obstipatio, tenesmus, vomitus, cruris stupor, aeger, antrorsum flexus, truncum erigit sine notabilio dolore, pyrexia, febris, qua destituta NEPHRALGIA dicitur.

VRETERITIS. Symptomata maxime nephralgiae: dolor, iter vreterum sequens.

CYSTITIS. Phlegmasia vesicae vrinariae. Tumor ovalis in regione pubis, dolor acerbus, ardens ad perinaeum, interdum rubicundum, distensum, dolor et ardor ad pubem et umbilicum, dysuria maxima, ischuria, summo meiendi desiderio et conatu stipata, mictio dolens, obstipatio, tenesmus, catheteris ultra vesicae collum immitendi impossibilitas, alvismus, pyrexia actiua, acuta, feruida, aut passiva; accedunt extremorum frigus, vigiliae, paraphrenitis, paraphrosyne, fitis maior, singultus, tumoris durities increfcens, dolor in nucha.

— b. *Phlegmasia vuulae vesicae vrinariae.* SAUV. (II. 529.) MORGAGNI. Signa cystitidis: catheteri vero nulla obicitur resistentia, nisi superatis prostata et sphinctere, et intra vesicam non nihil adaeto, non superanda cathetere, sed iniectione. Facilius sequuntur gangraena, abscessus.

CYSTOSPASMVS 9).

Vesicae iuxta pubem tumor durus, ischuria cystica, obstipatio, febris. Passio grauis saepe in sphacelum transit, erysipelas criticum: alternat eum cystocatarrho, (purpura scorbutica).

VRETHRITIS. Dolor vrethrae, aut totius penis, initium saepe inflammationem prodens.

HAEMATVRIA. *Mictus cruentus auctor.* Haemorrhagia, passiva ut plurimum, per vias vrinarias: humor effluens aut sanguinis, aut commixtorum, vrinae, feminis, ideam sistit. Huc cysthaemorrhoids, *haemorrhoides vesicae auctor.*

PYVRIA.

q) KLEIN int. clin. p. 254.

PYVRIA. Apocenosis vrinaria: humor effluens coloris, consistentiae, et contentorum variorum (citra sanguinem). Huc cystocatarrrhus, seu *haemorrhoides vesicae mucosae, catarrhus vesicae* auctor. ^r).

DIABETES. Apocenosis vrinaria cum corporis colliquatione, febricula, anorexia, siti magna, quantitatem potus fere superans, mictio saepe post paruam potus copiam sumtam statim eueniens: vrina limpida, aquosa ^s).

ENVRESIS. *Eneuresis* VOGEL. Vrinae parum, aut omnino non abnormis, mictio, inuoluntaria, saepe subiectis insciis, absque vesicae stimulo accidens.

BRADYSVRIA. Irritabilitas telae cellulosa totius corporis, e stimulo ad emittendam vrinam, sub voluntaria retentione. Oculorum turgor, epiphora, coryza breuissimi temporis, spasma, pleurodyne, anxietas, pedum motus inuoluntarius, dein vrina voluntarie emissa sub corporis succussione quadam, aut enuresis.

DYSVRIA. Difficilis et dolorifica, guttata et ardens saepe mictio. Huc *stranguria auct.* seu dolorifica mictio guttata.

ISCHVRIA. Vrinae retentio:

a. *Spuria.* Lumborum dolor, punctorius, obtusus, grauatiuus: absentia stimuli et conaminis mingendi, et protuberantiae in hypogastrio et viciniis, vesicae contractio, collapsus, catheterismo vel exploratione (digiti in anum immissione,) cognita, catheterismus citra vuulae phlegmasiam frustraneus, nihil lotii educens.

a. Renalis.

b. Vreterica.

} Signa dicta ^t).

b. *Vera.*

r) Cf. catarrh., quorsum potissimum pertinet.

s) Haec vera. Spuria est, quae vrinam sistit vari coloris crassam Cf. Cl. STOELLER obs. I.

t) Inter vramque limites certi statui vix possunt, quum vix

vretericam inducat, quod renalem non excitet, et ad suum morbum relata vtraque eandem admittat: medendi methodum, citra damnum limites statui non possunt.

b. Vera. Sensus ponderis in hypogastrio, pube, perinaeo, perceptus, ad mictionem, irritam tamen stimulus (nisi vesicam teneat stupor vel paresis), protuberantia supra os pubis magna ^u), ad attactum dolorifica ^x), nativam vesicae figuram referens ^y), nisi lotio referta admodum sit, subfluctuans, urinâ sponte aut arte emissa, evanescens, detectio tumoris insoliti, mollis, cedentis, immisso in anum aut vulvam digito, loti effluxus sub profundiori catheterismo nisi adsit vulvae phlegmasia, tumor notabilis ad muscutorum rectorum infernorum latera, ad inguina, scrotum aut intra vaginam, perinaeum; interdum (sed raro) protuberantiae hypogastrii alia additur, huic similis, saepe minor, interdum maior, illius imo vices supplens.

a. Vesicalis. Liberum iter ad vesicam usque.

b. Vrethralis. Obstaculum, in vrethra obuium, maioris momenti.

Vtrique, *spuriae et variae*, superuenire solent: anorexia, cardialgia, nausea, vomitus, sapor vrinofus in ore, anxietas, singultus, agrypnia, febris, cachexia, corporis tumor, hydrops, foetor vrinofus, passiones soporofae, delirae, conuulsiones. ephidrosis frigida, vomitus vrinofus, humoris vrinofi effluxus e mamma, rel.

DYSMETRORRHOEA. *Dysmenorrhoea* SAGAR. Catameniorum emanatio, obstructio, suppressio, dolorifica, lumbago, dyspnoea, anxietas, palpitatio, cephalalgia, rel.

HYSTERALGIA. Dolor in regione vteri, citra phlegmasiam, parturiendiue nisum.

METRITIS. Phlegmasia vteri: tumor, ardor, grauitas, dolor in regione vteri, os vteri vehementer calens, re tractum, durum, clausum, non fert attactum absque dolore: dolor ad inguina, femora, diaphragma, imo claviculas

^u) Minus patet protuberantia, si vesica contracta, indurata parum extendi potest, aut in fugaci a calculo vesicae ischuria.

^x) Abest prorsus aut fere do-

lor in ischuria, quae est a vesicae paresi, s. stupore, anæsthesia.

^y) Alienam figuram inducant conformatio, cystocele, rel.

culas extensus, cum dyspnoea, symptomatibus pleuritidis, nausea, vomitione, singultu, obstipatione, ischuria vel dysuria, horrore perpetuo, cephalalgia, mastodynia, menstruum vel lochiorum suppressione, frigore extremorum, anxietate, alysmo, oculorum languore, abiectione, animi deliquiis, paraphrosyne, paraphrenitide, sopore, tetano, catalepsi, conuulsione. Pyrexia actiua, passiuua, febris continua, synochus ardens, lipyria, amphimerina.

Variant signa per locum z) :

- a. *Vteri caui, fundi.* Dolor summus, vt ne exterius quidem (in abdomine) tangi patiatur.
- b. *Partis posterioris.* Dolor lumborum, obstipatio stercoreis duri.
- c. *Partis anterioris* et inferioris regionis: vrinae difficultas.
- d. *Partis lateralis.* Dolor inguinum, crura difficulter mouentur.

METRRORRHAGIA. Sanguinis ex vtero, aut vagina excretio nimia. Signa spasmi, haemorrhagiae, actiuae, passivae.

ABORTVS. Cum signis grauiditatis et partus, fetus non vitalis exclusio ex vtero. Metrorrhagia, rigor, horror, cum aestu volatico, inappetentia, nausea, dein lassitudo, lumbago, palpitatio, lipothymia, syncope, hysteralgia grauatiua ad inguina, frigus genitalium, tenesmus, vteri conatus ad excludenda contenta, interdum conspicuus in hypogastrio tumor, subitanea mammarum extenuatio, flacciditas, cum galactirrhoea serosa; tum hysteralgia spasmodica, tenesmus acrior, metrorrhagia maior cum lipothymia, ac syncope, extremorum frigore, mentis deiectione, aestus et rigor alternant, cephalalgia, hypogastrii delapsus, aquarum et fetus (immobilis) exclusio.

COL-

COLPOSIS. Phlegmasia labiorum vulvae, nympharum.

LEVCORRHOEA. Apocenosus ex vtero, aut vagina, flavi, albidus, serosus, mucosus, humoris: vrina sedimentum album, crudum, pituitosum, aut eiusmodi flocculos sistens.

NYMPHOMANIA. Feminarum effraene concubitus desiderium.

STERILITAS. *Acyisis* VOGEL. Conceptus impeditio.

HYDROMETRA. Muliebris hypogastrii tumor, successively crescens, pressioni cedens, fluctuans, vteri figuram referens, ab ischuria et graviditate diuersus: borborygmi, in ambulando grauitas, dyspnoea, faecum graueolentia insolita, catameniorum turba aut suppressio, dolor abdominis, lumborum, hypochondriorum, inguinum, pollutio nocturna, rigor, saepe febris passiva, phlegmatia, mammarum molities.

PHYSOMETRA. Feminini hypogastrii constans permanensque tumor, levis, elasticus, vteri sedem et figuram referens.

GRAVIDITAS. Feminae, annorum XIV-XLVIII., coitum foecundum, expertae, partu fetus terminanda, abdominis intumescencia, in axi hypogastrii prominens, sensim adscendens, umbilici demum protuberantia: menstruum iam citra morbum absentia constans, os vteri molle, fere clausum, rima alias transversa, iam fere circularis, dum labium posterius, alias breuius, descendit, vaginae vteri elongatio et ampliatio, incommoda varia, etiam singularia, carni fastidium, pica, nausea, vomitus, cephalalgia, vertigo, lipothymia; motus embryonis suo tempore, galactorrhoea serosa. (Cf. script. obstetric. si haec rite definita cupis.)

PARTVS *instans*. Signa graviditatis praegressa, abdomen superne detumescens, tumor inferius auctus, stimulus ad aluum et vrinam, dolores dorsi et lumborum, per intervalla aucti, intensitate et duratione perpetuo aucti, ordinario

dinario recurrentes, sub quibus abdomen magis indurefcit, atque os vteri in rotunditatem aperitur, tenditurque, ex quo rotunda vesica, aquis repleta, protruditur, cessante dolore, os vteri, ea vesica, et abdomen, tensione remittunt, dein vesicae ruptura, aquarum effluxus, fetus transitus per os vteri, vaginam, donec editus sit, secundarum exclusio, lochiorum effluxus ^a).

DYSTOCIA. Partus difficilis, laboriosus admodum. Signa partus instantis, et pro speciebus varia.

DYSLOCHIA. Lochiorum:

a. *Sanguineorum*;

b. *Alborum*, emanatio, suppressio.

PHYSCONIA. Totius fere abdominis, aut eius partis notabilis et constans, a partibus solidis intumescencia, a hernia, et grauiditate in feminis, distincta.

a. *Hepatica.* Tumor, tensio, durities, dolor hypochondrii dextri, thymos, anorexia, alvismus, dyspnoea, aurigo, *ischocholia* s. excretio bilis per aluum suppressa.

b. *Splenica.* Tumor in fede lienis, splenalgia, thymos, dyspnoea, color pallidus et luridus, non raro haematemesis.

c. *Renalis.* Tumor in regione renum, ischuria renalis, pyuria, vomitus frequentes.

d. *Vterina.* Tumor durus in hypogastrio feminino, mutatio situs et figurae orificii vterini, hysteralgia.

e. *Ovarii.* Tumor et dolor in regione ovariorum, grauiditatis vterinae absentia, sterilitas.

f. *Mesenterica.* Tumor, dolor, in medio abdominis, appetitus ciborum, albi et vesicae munitiorum vigor.

g. *Intestinalis.* Tumor in medio (ad latera) abdominis, sub palpo tumores varii, excretiones suppressae, obsti-

a) Saltem ut possint aliae passionibus a grauiditate et partu discerni, grauiditas et partus commemorari debent, nisi huc perti-

nere putes: sed huc pertinent utique, tum ut passionibus, tum ut aegrotationibus.

patio pertinax, vomitus, dolores abdominis obscuri, color luridus, atrophica.

h. *Omentalis*. Tumor ad regionem omenti indolens, plerumque mobilis, color luridus corporis, phlegmatia, alius obediens.

i. *Polysplanchna*. Concurfus physconiae plurium viscerum b).

HERNIA. Ectopia partis solidae, mollis, abdominalis.

a. *Peritoneocele*. Hernia, sub laxato peritoneo eueniens.

b. *Peritoneorixis*. Hernia, sub peritonei ruptura contingens.

c. *Peritoneocelerixis*. Hernia ex specie a. et b. composita c).

PHIMOSIS. a) Praeputii et saepe simul glandis, tumor inflammatorius, stipatus et b) Praeputii adducendi aut reducendi difficultate.

PARAPHIMOSIS. Praeputii retro coronam tumor, ut adduci non possit, dysuria.

GONORRHOEA. Apocenosia e genitalibus:

a. *In viris*: apocenosia puriformis aut feminiformis ex urethra stillatitia.

b. *In feminis*: apocenosia puriformis aut genituram simulans e pudendis extremis, glandulis eiusdem.

EXONEIROSIS VOGEL d). *Pollutio nocturna auct.* Involuntaria, saepe et iniucunda, geniturae in utroque sexu ex erectis, turgidis, genitalibus profusio.

SATYRIASIS. Effraenis, impudensque, in viris obuia, veneris cupiditas, cum libidinosa penis tentigine.

IM-

b) Omnis physconia supponit situm viscerum consuetum, digitorum exploratione adhibita. Ad uterinam referre poteris graviditatem. modo hanc a dicta distinxeris, et signorum memor fueris, ut et reliquas distinguas. Graui-

ditas ovarii, tubaria, vere huc pertinet.

c) Cf. ectop. Sumitur etiam pro tumore molli, herniae sensationem excitante, hernia spuria.

d) N. 120.

PRIAPISMVS. Ingrata, libidinis expers, brevis, saepe reuertens, dolorifica, penis erectio.

IMPOTENTIA. *Agensia* VOGEL ^{e)}). Prolem generandi vis, viro denegata, *ob defectum* :

a. *Erectionis congruae.*

b. *Eiaculationis debitae.*

c. *Seminis fertilis.*

d. *Congruae penis formae*, quoad longitudinem, crassitiem, numerum.

AEDOPSOPHIA. Flatuum e genitalibus emissio sonora.

III. AD PERIPHERIAM CORPORIS ET EXTREMITATES RELATAE PASSIONES.

N. Commemorandae iam sunt *myositidis* et *rheumatismi species*.

a. **Cephalica.** *Myositis capitis.* Cephalaea immanis citra delirium, maxime ad ceruicem et partem capillatam, vt adfecti ob vehementiam furant.

b. **Pleurodyne.** *Pleuritis spuria.* *Myositis pectoris* BOERH. ^{f)} MORGAGNI ^{g)}. Dicta ad pectoris passiones.

c. **Spasma**, *rhegma, tilma Graec.* ^{h)}. *Myositis*, pleurodyne dorsalis.

d. **Myocoilitis** VOGEL. *Myositis abdominalis*: signa peritonitidis.

α. Hypochondriaca dextra, s. hepatica. SAUV. *hepatitis muscularis*.

Signa myocoilitidis: tumor in regione hepatis pulsans, extensus vltra hepatis limites et supra costas, absentia tussis, dyspnoea, vomitus, singultus.

β. Epigastrica. SAUV. *gastritis muscularis*.

Signa myocoilitidis in regione epigastrica, signa fere gastritidis, tumor tamen magis apparens et circumscriptus,

e) N. 283.

f) Aph. 878.

g) L. c. XXI. 36.

h) v. SWIETEN C. I. 345. VOGEL n. 479.

scriptus, maior cutis sensibilitas, tactu apparens: gastritis facile ob tumorem, pressionem, calorem, sequitur.

e. *Lumbago*. Myositis lumbaris: trunci erigendi difficultas.

β. *Psoadica* i). Myositis psoadica: lumbago, impotentia, femur extendendi.

RHEVMA, *rhoos*, *rhus*, *rhyxis*, *rheumatismus*, *arthritis*, *rheumatismus arthriticus*, *febris rheumatica arthritica auct.*

Phlegmasia, actiua, passiva, ad aponeuroses: spontaneus, vagus, fixus, periodicus, continuus, constans, ad articulos et iter aponeuroseon, oriundus, a calore lecti auctus, dolor cum tumore: febris post tumorem remittens, crampus, impotentia motum partis suscipiundi.

a. *Calidum*: tumor rubicundus, calidus, tensus, febrilis.

b. *Frigidum*: his notis destitutum.

α. *Ischias* k).

Rheuma coxendicis, cruris, et tibiaram, ad fasciam latam, standi, progrediendi difficultas, claudicatio.

α. *Postica*: dolor fixus in coxa, maxime ad maiorem femoris trochanterem, qui sursum ad os sacrum, deorsum per exterius femoris latus, ad poplitem usque, se extendit, raro in poplite definit, sed plerumque a poplite per capitis fibulae exteriora declinans, in priorem cruris partem descendit, quam, secundum exterius spinae tibiae anterioris latus, percurrens, ante malleolum exteriorem, in pedis dorso definit.

β. *Antica*, fixum dolorem in inguine habet, et per interiorem femoris et surae partem propagatur.

b. *Rachi-*

i) SYDENHAM. op. I. SAUV.

sp. 6.

k) Nervosa COTYNNI l. pec.

§. 3.

b. *Rachirheuma*. Rheuma ad spinam dorsi. Contractio trunci corporis ad anteriora, erigendi impotentia.

c. *Cedma*. VOGEL. 1).

Rheuma ad ossa pubis, genitalia.

d. *Gonorheuma*, *gonagra auct.*

Rheuma ad genua.

e. *Podorheuma*, *podagra auct.*

Rheuma ad pedes.

f. *Chirrhema*, *chiragra auctor.*

Rheuma ad manum.

g. *Panaritium*. *Paronychia*.

Rheuma ad extremum digitum, dolor perterebrans, calor vrens, tensio maxima m).

OSTEOCOPVS. (Rheuma ad periosteum; potissimum internum).

Dolor constans et notabilis circa partem solidiorem ossium cylindricorum, pressione non exacerbans, a lecti calore quoque auctus.

GONGRONA. Crampus. *Phyfaspasma seu spasmus flatulentus, auct.* HELMONTII. Musculi vnius alteriusve subito accedens et recedens rigiditas, dolor saepe atrox in artubus, vel in collo, mobilitas sublata, aut saltem imminuta. Spasmus tonicus, clonicus n).

MYOPALMVS o).

Musculorum quiescentium, et eorundem fibrarum palpitatio, directionem fibrarum manifestans, cum ingrata

1) N. 168.

m) Quum nominis confusione saepe res confundantur, atque, si his passionibus arthritidis nomen imponis, fieri facile possit. ut cum aegrotorum damno, confundantur arthritidis morbus, deinde adducendus, et arthritidis passio, e re esse credidi, his passionibus noua imponere nomina, quae et confusionem, auerterent, imo variam praestarent in explicandis

aegritudinibus utilitatem, quum res ita facilius distingui possint.

n) *Gongrona* nomen est usitatum ad designandum tumorem rigidum, in specie etiam colli, aptius mihi visum voce *crampi*. Si occupat pectus, oritur pleurodynē fugax, sed atrox, cum metu suffocationis, si guttur, angina spasmodica.

o) Comm. litt. Nor. 1731. p. 395. SAUV. tremor sp. 16.

grata sensatione, ut adfecti situm et locum partis adfectae continuo mutant. Occurrit in toto corpore, digitis, palpebris, abdominalibus, cruralibus musculis, ubi manifestam vidi.

TREMOR. Sub motu voluntario artus, aut totius corporis, praecipue innotescens, artus moti, aut capitis, frequenter per breuissima spatia alternans, motitatio, absque acuto frigoris sensu. — Nonne palpitationi cellulosae tribuendus nimiae?

CARPHOLOGIA. Manuum digitorum, vel tendinum, motus palpitans, tremulus, spasmus clonicus.

a. *Delirantium.* *Crocidismus auct.* Est manuum digitorum contractio, cum extensione frequenter alternans, vel suffusioni, muscas, festucas, referenti, tribuenda, ut floccos e vestibis, paleasque euellere, colligere aegri studeant, vel ab ingrato manuum sensu, quas citra arbitrium mouent.

b. *Spasmodica.* Subfultus, tremor, tendinum *auct.* Motus palpitans, aut tremulus, vel digitorum, vel simpliciter tendinum, potissimum iuxta carpum situm, comes febrium, deliriorum.

PANDICVLATIO. Plurium, vel successiue omnium, membrorum distensio, plerumque cum oscitatione, voluntaria, ad superandum ingratum artuum sensum.

LASSITUDO. *Fatigatio, copos.* Ingrata debilitatis sensatio, quae excitat quietis desiderium p).

I 2

STV-

p) Est *naturalis*, post exercitia, viribus validiora, eueniens; *praeternaturalis*, praeter spontaneam; aegritudines praecurrens. Tres a veteribus commemorantur species. a) *Tensiva*, *tonodes*, quorsum fere et naturalis, vasis sanguiferis distensis tribuitur, quum vis vitalis aliquantum remisit, ut sanguis lentius circumeat. b) *Phlegmonosa*, *phlegmonodes*, *aestiuosa*, *osteocopus*, quae ple-

thorae commotae, sanguini rarefacto tribuitur: unde et *febres copodes* HIPPOCR. aphor. IV. 31. 74. Epid. VI. S. 2. t. 24. Coac. t. 642. his stipatae. c) *Ulcerosa*, *elcodes*, quae ab acrimonia sanguinis, cum sensu erosionis quasi coniuncta sit, potissimum cutis, et carnis, cum membrorum concussione, imo rigore. Cf. GALEN. de tuenda san. L. 3. c. 5. sq.

STYPOR ARTVVM. Molesta sensatio cum tactus obscuritate, citra musculi rigiditatem (a vibrationibus membranarum, medullam nervosam ducentium). — Caue, confundas cum stupore nervoso, eclipsi.

TARANTISMVS. Summa saltandi cupiditas, explebilis per modulamina musica, ad certam rationem instituta.

BERIBERIA. Spasmus crurum, ut aegri, genibus retractis, eleuando crura, tamquam oues, progrediantur.

SCELOTYRBE. Motus abnormis artuum aut laterum, semiuoluntarius, gressu, situ erecto, innotescens q).

LORDOSIS. Ossium directio vitiosa, ut vel protuberent vel excauentur praeter naturam. v. m. anon.

CONTRACTVRA. Anchylosis. Immobilitas in artubus constans, rigiditati plerumque sensim superueniens.

CLAUDICATIO. Vitiosus gradiendi modus, quo crus peruersè mouetur, vel difficulter trahitur, et truncus singulis passibus huc illuc inclinatur.

ECTOPIARVM (quae sunt partium solidarum e sua sede dimotiones, continentibus relaxatis, designatae per tumores, dolores, spasmos, febrim, phlegmasiam) species sequentes :

a. **EXARTHREMA.** *pararthrema, exarthrosis, Graec. Luxatio, subluxatio, distorsio, auct.* Ectopia ossium mobilium.

b. **DIASTASIS.** *Ossium recessus, auct.* Ectopia ossium immobilium.

c. **LOXARTHROS.**

Ossium mobilium obliquitas respectiua citra spasmus aut exarthrema.

INTVMESCENTIAE. Tumores peripherici molles, a fluidis.

a. **ANASARCA.** *Leucophlegmatia auct.* Cutis totius intumescencia, pallida, non elastica, dyspnoea, lassitudo, inappetentia, febricula, urinae, tenues, aquosae.

b. **PHLEG-**

q) Huc chorea S. Viri SYDENH.

b. PHLEGMATIA. Oedema *auct.* Intumescencia extremitatum, praecipue inferiorum, non elastica, frigida, cuti concolor, indolens, praeter distensionis sensum in aucta.

c. PHYMA. Intumescencia particularis, solitaria ^{r)}).

a. BVBO. Phyma partis glandulosae subdurum, subinflammatorium, praecipue in glandulis inguinalibus, aut et axillaribus, rel.

b. FURUNCULVS. Phyma subdurum, inflammatorium, prominens, sphaeroideum, profunde rubrum, iuglandis magnitudine, cuius centrum occupat vortex fibrosus, qui digeri nequit.

c. ANTHRAX. Phyma, inflammatum in ambitu, in apice gangraenosum.

d. SCIRRHVS. Phyma, subdurum, indolens, frigidum, mobile, cuti concolor, pruritu, (lancinationis sensu) vel pondere molestum.

EXANTHEMATA. Phymata exigua et maculae integumentorum corporis, et membranarum, his continuarum, phlegmasiarum naturam seruantia. Virium prostratio, morbi rationi non omnino tribuenda, horrores, deinceps calor, dyspnoea, alvismus, anorexia, vomituritiones, vomitus ^{s)}).

a) ERYSIPELAS. *Febris erysipelatoſa, erythema, auct.*

Cum febris acuta, amphimerina, eruptio erythematis, seu maculae amplae, subtumidae, superficialis, non suppurantis, desquamabilis, cum dolore calente, rodente: sanguis missus pelle alba tenui, et sat tenaci, tectus.

α. Vulgare.

STA-

r) Huc et phlegmone referri potest.

s) Ad peripheriam corporis, exanthemata, passiones cutaneas, recte retulisse credo, quum ad febres non pertineant maiori iure, quam omnes phlegmasiae, ino-

febris, quae tum abest, tum varia est, et vel communis, comitata. solum cum exanthemate passio, vel exanthematis potius symptomata, non potest passioni, exanthemati, nomen imponere, ut dixerunt v. c. febris erysipelatoſa.

STADIUM 1. Grauedo, horror, inappetentia, lassitudo, amphimerina.

STADIUM 2. Die 2. 3. 4. eruptio erythematis, in 4. usque diem aucti.

STADIUM 3. Tumor, calor, dolor erythematis, epidermis desquamatur intra dies 4. seu humor serosus, ad cutem haerens, in crustas tenues resolvitur ^t).

β. ROSA ^u).

Post horrorem, rigorem, sequenti circiter die erumpit erysipelas, summi et subitanei in quadam parte rubor et dolor, apud *Germanos* in inguinibus, alis, femoribus, cum praeuio glandularum, axillarium, inguinalium, dolore, in *Anglis* vero et *Gallis*, (nec infrequenter *Germanis*) saepius faciem occupat tumor, calore acri, rubore roseo, cum summa cutis tensione et eleuatione exigua, lata diffusa, non circumscripta; febris intenditur cum calore, siti, anxietate (non raro linguae albedine, oris foetore).

γ. HIEROPYR ^x).

Rosa grauior: supra erysipelas eleuantur phlyctenae, quasi ab apum inflictu ortae, aqua sublutea turgidae, postea flavescentes et crepantes, crustam efformantes, criticae. Per frontem, palpebras, capillitium, collumque circumit. Terminatur intra septimanam.

δ. ZOSTER ^y).

Corporis truncum, et modo thoracem, modo scapulas, modo latera et costas occupat, saepe medium corpus totum, cinguli instar complectitur, aut infernum tenet. Subnascuntur interdum vesiculae flavescentes, saepe liuescentes instar her-

^t) ERYTHEMA in specie vocatur erysipelas apyreton.

^u) SAUV. sp. 1. SENNERT. de febr. l. 2. c. 15. SYDENH. S. 6. c. 5. FR. HOFFMANN T. 2. c. 13. v. SWIEFEN C. T. 2. p. 400. ELLER de cogn. m. p. 156. QVARIN infl. p. 110. SELLE pyr. p. 153.

^x) SYDENH. l. 173. v. SWIE-

TEN. I. §. 380. II. '623. 400 sq. de HAEN febr. div. p. 21 sq. VOGEL. 344. LORRY m. c. p. 179.

^y) PLINII H. N. l. 26. c. 11. LANGII ep. p. 110. RVSSSEL de robe gland. p. 125. Herpes SCRIBONII LARGI. TVLP. l. 3. c. 44. FR. HOFFMANN febr. erys. §. 6. et obs. 6. SAUV. sp. 8.

herpetis corroderentes. Medium, PLINIO teste, enecat. Vltimum oedema saepe habituale relinquit.

N. Febris erysipelatis est continua, remittens, v. c. tritaeophya; semitertiana, teste FORESTO ²).

b. VARIOLA. Variolae HALY ABBATIS *al.*, *Euphlogia* vel *Chaspe*, RHAZIS.

Designant: constitutio epidemica, (cui fauent calida et humida tempestas, hinc potissimum ver et auctumnus,) subiecti, hanc passionem nondum experti, vsus commercii cum homine, vestibus, exhalationibus, variolosis, crustarum variolosarum deglutitio, lymphae, puris, variolosorum, praegressa laesione integumentorum, in eam insitio. Signa futuri exanthematis: dein eruptio pustularum phlegmonodearum, pisi magnitudinem aequantium, sensim suppurantium, dein crustacearum, deciduarum, cum pyrexia plerumque, et pustularum exhalationibus, odoris specifici, subdulcis, in malignis haecini, nauseosi. — Symptomata varia, quae tum morbo vario, qui subest, tribuendae sunt, tum ab adiapneustia, et irritabilitate cutanea pendent.

α. *Discretæ* :

α. Benignae. 1. *Regularis*. 2. *Insititia*:

STADIUM 1. *Praeludium*. Signa exanthematis erupturi: cephalalgia cum somnolentia in infantibus, capitis tumor, epiphora, (praesertim sinistri oculi, minus calida, quam in rubeola,) horror, calor, pulsus frequentes, celeres, molles, conuulsio, eclampsia, raro ominosa. Obstipatio, vrina turbida, furfuracea.

STADIUM 2. *Eruptio*. Die 3. 4. cum sudore, aut in infantibus cum eclampsia, eruptio macularum rubrarum, morsui pulicum similium, profundiori rubore in centro punctatarum, acuminatarum, sensim incrementum. Eruptio primum in facie, dein in pectore, tum in manibus, trunco et extremitatibus inferioribus (raro alia ratione) fit, vt primum paucis sen-

sensim plures superueniant, crescunt, extuberant, asperiores fiunt, abit febris, si erat. Rubet et cutis sana, et pustularum apex sensim albescit, suppuratione, sensim ad basin descendente, dum tenuis pars partim exhalat per pustulas, partim resorbetur.

STADIUM 3. *Suppuratio*. Die 6. pustulae faciei pallescunt, et tumor sub palpebris oritur. Die 7. in centro, die 8. in basi, albescunt, circulis rubris circumductis. Die 9. flauescunt.

STADIUM 4. *Exsiccatio*. Die 10. nitorem amittunt: die 11. crusta formatur, quibus delapsis remanent in cute foveolae. Die 12. exarescunt, tumor faciei euanescit cum apparente caecitate.

Suppuratio, tumor et exsiccatio, eundem ordinem seruant, atque eruptio. — Fissae etiam sponte die 10 sq. flauam materiam stillant, quae, ad pustulam collecta, molem siccantis pustulae auget.

N. Numquam intra octiduum finitur. — Pyrexia interdum nulla omnino esse videtur, aut tam mitis est, ut nullius ponderis sit. Saepe duplex est, alia stadii 1. et 2, alia stadii 3. et 4. Huius utriusque stadii, sunt, qui duas iterum febres statuunt, ut in vniuersum tres sint: 1) *Variolosa* seu *eruptionis*. 2) *Cocatrix*, seu *maturationis*. 3) *Purgatrix* seu *persiccationis*. Sed sufficit duas numerasse, vnam stadii 3. et 4. quae purulenta est. Passio enim ratione stadii 3. et 4. ad pyogeniam merito restringitur, licet stadium 1. et 2. ad varium pertineat morbum, cuius etiam in pyogenia memor esse debes. Variat febris vtraque, dum vel est actiua, vel passiuua, et continua, synocha, synochus, typhus, vel remittens, v. c. tritaephya, (vel hemitritaea SPIGEL. ^a), (vel intermittens) potissimum secunda ^b).

2. Num

^a) De semit. l. 2. c. 16 et 21.

^b) Testibus: Vratisl. morb. epid.

d. a. 1702. p. 6. HVXHAM op. III.

29. de HAEN R.M. II. c. 4. p. 90
seq.

2. Num variola differt per morbum, qui subest, et requiritur, vt passio oriatur? Ita videtur, tum per pathognomonica, tum, quod variola, v. c. verminosa, aut contagiosa non fit, aut tantum in verminosos c). Num igitur insitio omnino a passione liberat? Nonne non rara exempla variolae, saepius idem subiectum corripientis, sic explicanda? Nonne exempla, vbi per contagium nulla comparet variola, sic explicanda, quod morbus nullus excitatus fuerit? Nonne insitio ideo saltem commendanda, quod saepe liceat optimum eligere morbum, qui plethora, phlegmasiam simplicem praebens, erit? — Nonne pepsis obtinet, dum contagium gratis seu innoxie susceptum; nonne pepasimus, vbi variola oritur, et pus in pustulis mucosis, lymphaticis deponitur?
3. Distinctio variolae in discretam et confluentem proprie nullius est ponderis, quum per observationes vtraque et grauis et mitis existat d).
4. COTVNNIVS duas potissimum species recenset: 1) *Umbilicatam*, quae ab initiis, aciculae similis, verticem habeat retusum, veluti decurtatum, lenticulae propiorem, quam coni figurae, et foveolam, seu umbilicum, quasi in centro habeat: variat, vt sit *gangraenosa*, *corruptoria*, *crystallina*, *verrucosa*. 2. *Vesicularem*, quae umbilico careat, acrior saepe petechiis stipata. Degeneres sunt *purpurea*, *violacea*, *nigra*. *Benignam* habet, cuius ambitus eleuatus, circuli forma, circa umbilicum in abscessum mutetur, nec foveam, nec cicatricem relinquentem.

5. Num

(q. TISSOT ep. ad HALLER p. 122.
ROEDERER m. var. p. 53. f. 1.
p. 78. SCHROEDER pr. de var.
inf. p. 8. SARCONI l. c. §. 243.

c) Cf. Cl. BEIREIS d. de variolis.

d) Testibus MEAD de var. p. 16. ELLER l. c. p. 139.

5. Num variolae partes internas aeque corripiant, atque integumenta, in vtramque partem disputatur a Cl. V. Videntur internae non vere esse liberae.

6. Anomaliae:

1. *Sanguinea*. Pustulae sanguine turgidae e).

2. *Verrucosa*. Pustulae verrucosae, seu aggeries pustularum densissimarum, non confluentium.

3. *Crystallina* (*siliquosa* FREINDII). Pustulae pellucidae maiores, emphysematicae fiunt, post transpirationem pustularum, et nucleus ater est.

β. *Subalbens* ROEDERERI f).

Humore leuiter purulento scatent, ad caesium colorem vergentes, pustulae.

4. *Sebacea* ROEDER. g)

Materia vnguinea (ab oleo animali, coctione ichorosa, seu gangraenosa liberata) turgidae pustulae.

5. *Ampullis stipata* h).

Vesicae maiores, ichorosae in artubus.

6. *Miliaris*. Pustulae minori numero, vesiculae densae, minutissimae cum purpura et pustulis morbillosis prodeuntes. Symptomata febris malignae (typhi). Interdum pustulae artus obsident, dum pectus obsident, miliares, petechiae, erysipelas rubeolofum, aut pectus obsident, sero pellucido plenae, cutim tantum exasperantes.

7. [*Dysenteriodes* SYDENHAMI i).

Tempore dysenteriae accidit, et huius indolem sapit, et facile ex calidiori regimine stipatur dysenteria. Eruptio iam die 8. fit; pustulae sunt minoris molis et asperiores, et sub finem in apice nigricantes; ptyalisimus adest.]

Has omnes febris maligna (typhus) comitatur. Dysenteriodes proprie solum ad sepsin pertinet.

β. Con-

e) GESNERS Entd. I. 51.

f) p. 62.

g) l. c.

h) ROED. p. 63.

i) Conit. a. 1670.

β. *Confluentes, cohaerentes:*

Pustulae plures ab viciniam coeunt, vt tamen suo quasi septo distinctae sint.

a. *Benigna.* Incedit vt discreta benigna, magis periculosa est.

b. *Anomaliae:*

1. *Crystallina* ^k).

STADIUM 1. Febris viuida, diarrhoea serosa notabilis, cephalalgia, sitis magna, cutis alba, pallida, subtumida.

STADIUM 2. Pustulae minus rubrae, citius crescentes, et maiores aliis, circulus pustularum minus ruber, vel pallidus, pellicula vesiculae tenuissima, fundus vesiculae pallidus, magnus tumor oedematofus artuum, demum febris maligna, saepe tritacophya.

2. *Depressa* ^l).

Pustulae cohaerentes, in apice depressae, interuallis miliaribus et petechialibus plerumque; in facie saepe vna superficies aequalis: pyrexia maior, exacerbatio longior, fortior, rigiditas tendinum, cutis ardens, arida, etiam sudoribus non remollescens: pulsus duri, parui, vel magni et celeres: oculi nunc rubri, scintillantes, prominentes, lucis impatientes, nunc liuidi cum mydriasi, cephalalgia violenta, nisi delirium, aut coma accedant: conuulsiones in hac frequentiores.

3. *Nigra, haematodes, scorbutica* ^m).

Praeludium anomaliae. Eruptio die 2. incipiens, pustulae parum eleuatae, nigricantes, sanguinem nigrum fundentes, liuidumue, fundus gangraenosus, interualla pustularum atra, febris vehemens, mictus plerumque cruentus, deiectiones alui, vrinae,

k) SAUV. sp. 10.

l) SAUV. sp. 11.

m) SAUV. sp. 12.

vrinae, sputa, vomitiones, lacrimae etiam quibusdam sanguineae; paroxysmi violenti. Vt plurimum mors die 2. v. 3.

4. *Corymbosa* ⁿ).

Aggeries pustularum densissimarum, potissimum in facie, proprie non confluentium: intervalla pustulis destituta, symptomata malignarum ^o).

N. In infititia variola comparent pustulae diebus ab infitione 11., febris die 7. conspicua. Tenuis lymphæ aequæ, ac pus, imo hoc fere melius variolam producit, teste DIMSDALE.

VARICELLA. Variola notha. Variola breuioris decursus.

1. Emphysematica. (Germ. *Windpocke*) variola, aërem continens.
2. Lymphatica, crystallina (Germ. *Wasserpocke*) variola aquosa.
3. Verrucosa. Destituta febris maligna.
 - a. *Acuminata*. (Germ. *Spitzpocke*).
 - b. *Sicca*. (Germ. *Steinpocke*) variola durior.
 - c. *Dura ovalis*. (Germ. *Schweinspocke*).

Varicella post breuem febriculam erumpit; pustulae, non suppurantes, post paucos dies in squamulas desinunt, nulla cicatrice relicta ^p).

RUBEOLA ^q):

I. Regularis.

STADIUM I. *Praeludium*.

Praecedunt symptomata catarrhalia, tussicula, stertutatio frequens, epiphora calida (magis, quam in variola) febris; his perdurantibus: quae incidunt in subiecta, quae hanc nondum passa sunt, et vel contagio rubeolae exposita fuerunt, vel quibus insita fuit, dum vul-

n) SAUV. sp. 13.

o) GEL. LORRY p. 184. tr. de m. cut. variolam notham, varicellam, ad erysipelas refert, veram variolam ad phlegmonem quoniam hae ut phlegmone abeunt in suppurationem.

p) Cicatrice tamen. Comm. Lips. XII. 149. XVIII. 60.

q) HALY ABBATIS *pract.* l. 3. c. 1. *Blacciae*. AARONIS interp. *Alureschin Maahah: Arabum. Morbilli Latinobarbar. Roseola CASTEL- LI lex. med.*

vulnusculeo vtriusque brachii sublimi gossypium, fure morbilloso repletum, impositum fuit. Atque haec quidem ea lege contingunt, vt saepe die 1. horrorem sequatur calor, sensim crescens: vt, si tussis vehemens sit, epiphora sit mediocris, sicut et sternutatio, et contra: facies tumet, vt palpebrae, vnde oculi difficulter aperiuntur, nec lucem facile ferunt, qui sint rubicundi; ad alas nasi pruritus. Praeterea virium prostratio, carebaria, pleurodyne, dolores faucium et lumbago adsunt, cum anorexia, vomitu, siti, lingua alba, colica, diarrhoea, delirium, epistaxis, raro eclampsia.

STADIUM 2. *Eruptio.*

Die 3. vel 4. sequitur eruptio papularum, numerosarum, pulicum morsus aequantium, primo die cutim supereminentium (quod nisi visus, certe tactus docet) secunda vero cuti aequalium, latiorum, irregularium figura. Primo faciem, dein truncum et extremitates occupant, vbi cutim non supereminent: pars intermedia faciei solito magis rubet. Ab eruptione symptomata non mitigantur, imo, excepto vomitu, incrementum facile, vt febris, dolores, respirationis difficultas. Die 6. vel 7. rubor faciei imminuitur, cutis frontis et faciei aspera est tactu, et papulae per cutis desquaminationem separantur, dum eae trunci tum adhuc magis rubent. Die vero 9. in toto corpore papularum nihil superest, praeter furfura.

STADIUM 3. *Sequela.*

Non raro iam febris denuo incrementum, cum maiori respirationis difficultate, tussi, vt peripneumonia vel pleuritis aut metuenda, aut iam praesens sit. Haec mitigat diarrhoea mediocris, nec admodum longa, longa vero hecticam, phthisin, arcessit. Huius vices et bene subit ephidrosis debita. Epistaxis tollit cephalalgiam, oculorum et faucium adfectus.

2. Anomala ¹⁾).

Signa

¹⁾ SAUV. sp. 2,

Signa benignae: tamen eruptio lenta, quae fit die 5. 6. 7., aut celeris ante diem 4.: symptomata tum praeludii, tum eruptionis graua: exanthemata ab humeris et trunco incipiunt. Sequelae periculosiores. Ad symptomata praeludii, praeter ea benignarum, pulsus frequentes exiles, respiratio frequens et brevis, hypochondriorum oppressio, urinae pallidae, sopor, subsultus tendinum, spasmi, deliria cum oculorum rube-dine, aquositate, palpebrarum grauitate, punctura cutis dolorifica; accedit angina cum rauedine clango-sa, tussis molesta, ferina, in qua pueruli veluti suffo-cantur, nigrescunt facie, ingesta euomunt. Succe-dente tum eruptione passio mitior euadit, et febris ho-motona vsque ad exsiccationem papularum perdurat. Sequelae sunt peripneumonia morbillosa; vel diarrhoea, acris, torminosa, dysenterica, periculosa, vel febris hectica per tussim, dyspnoeam; vel phlegmatia et anasarca, vel ophthalmia: quae omnia curationem, rubeolae affinem, exposcunt.

3. Variolodes^{s)}.

Praeludium morbillosum: eruptio papularum acumi-natarum, maiorum, quam in rubeola vulgari, reple-tarum lacteo humore, qui quotidie spissior fit, quae sui vestigia relinquunt, in farinam facefcunt.

N. Nonnumquam pustulae in squammas non abeunt, sed insensili modo, bono aegrotorum habitu, euanescent^{t)}.

2. Febris tum est continua, tum remittens, tum inter-mittens.

3. In insititia febris comparet die 6. 7., eruptio post dies 3^{u)}.

SCARLATINA.

α. Benigna. PLENCI⁷.

STADIUM I. Symptomata exanthematum: lassitudo, virium prostratio, mox horripilatio, calor, febris. Die

I. 2.

s) SAUV. sp. 3. DVBOSQ de la Robardiere.

u) Comm. Lips. XV. 590.

t) Id testantur SYDENHAM. I. p. 520. et SELLE l. c. p. 155.

1. 2. subinde et tardius, erumpunt maculae rubrae, plus minus latae, ad se mutuo interdum accedentes, ut uniformem per corpus scarlatinae colorem videre liceat, primo in facie, collo, faucibus, pectore; dein in dorso, abdomine et reliquo corpore, coloris primis diebus cinnabarini, die vero ab eruptione 3. aut 4. pallidiora sensim eodem ordine, ac eruperunt, euanescent. Die vero 6. aut 7. ab eruptione plerumque in manibus et pedibus prodeunt papulae, seu pustulae, satis numerosae, emphysematicae, sensim latiores, miliaria alba, aut variolas lymphaticas referentes, quae aucto volumine fundamentum praebent desquamationi. Desquamatio vero plerumque consequitur, dum cutis in facie, collo, pectore, maxime vero in extremitatibus abit in lamellas sat longas, latas et densas, quae pro scarlatinae gradu variat.

STADIUM 2. Plerumque, diebus 15. 16. 20. elapsis, sequitur tumor leucophlegmaticus, aut phlegmatia, si compareat, quod tamen in benigna rarum est.

β. Maligna. PLENCIZ.

STADIUM 1. Symptomata benignae, at grauiora: praeterea cephalalgia, sopor, delirium, nifus ad vomitum, imo vomitus, ob ventriculi adfectum, et lipothymiae; febris et sitis magnae, anxietates, vigiliae; eruptionis scarlatinae tempore fauces dolent, tument, rubent, nimirum palatum, tonsillae, vuula, lingua, larynx, pharynx, ut aegri nec deglutire, nec loqui, nec respirare possint, nisi praesentaneum adferatur auxilium, breui suffocati. Diutius haec habitum cutaneum occupare solet, ad 6. vel 7. protrahitur. Ante vero, quam euanescat, una alteraque die exsurgunt phymata, miliaria alba referentia, maiora et ampliora spatio, hinc similia variolae spuriae lymphaticae, quae post bidduum flaccescunt et collabuntur, unde oritur desquamatio. Color macularum purpureus.

STADIUM 2. Die 14. 15. aliquando et tardius a dis-
pulta scarlatina aegrotus incipit fieri languidus, debi-
lis, morosus; tandemque facie, manibus, pedibus,
abdomine, scroto, corpore dein vniuerso intumescere
incipit. Urina pauca, plerumque cruenta, aut lotu-
rae carniū similis. Tumor, in facie ortus, per totum
corpus serpit: tantus interdum, vt nec pedibus insistere,
nec progredi possit aeger. Quo maior desquamatio,
eo maior tumor, (est tamen et in illis, qui desquam-
ationem passi non sunt). Facilius infantes, magis-
que hieme, et aërem liberum cito ingressi, tuent.
Ex hoc tumore plures, quam ex scarlatinae stadio I.
moriuntur.

N. Ad symptomata maligna pertinent: epistaxis, tussis,
stomacace, sternutatio molesta, glandularum colli,
parotidum tumor, obauditio, aut surditas, purpura
alba, aut rubra, vel comes, vel pedisequa: dein
et varii abscessus. Aliquando et in leuiori omnino
adfectu die 7. aut 8. aut tardius, aegri fiunt in-
quieti, mox conuelluntur, delirant, tristes clamo-
res edunt, et continuo e lecto exsilire nituntur:
qui malus status in quibusdam ad horas aliquot, in
aliis ad aliquot septimanas producit, viresque vi-
tamque exhaurit.

γ. Variolodes x).

Post epidemiam varioloden comparet cum praeludio
variolarum; passio intra dies 3. recedit, sola rubedo
trunci, quasi canceri cocti, superest. Pustulae cito
exsiccantur, nec suppurant, nec crustas, nec macu-
las rubras, relinquunt.

N. Febris tum est continua, tum remittens, tum in-
termittens, in omni scarlatina y).

VRTI-

x) SAUV. sp. 5. Journ. de med.
Juill. 1763. p. 275.

y) Est et sine febre scarlatina.
GESNER. B. I. 179. sq.

URTICARIA CVLLENI ²⁾).

Symptomata exanthematum mitiora: febris plerumque ephemera, deinde cum multo pruritu et cutaneo rigore pustulae, quasi ab urticae punctura, prurientes, albae, circulis rubris circumductae, vel coloris ex pallido rosei, cutim paullulum supereminentes, interdum protuberantiis fere erysipelaceis, et asperitate serpiginosa, primo in facie, deinde in trunco, rel. comparent. Intra remissionem interdum euanescent, redeuntes cum exacerbatione vespertina. Post 3. vel 4. dies cessant, et minutissimae squamulae ex cute secedunt.

Febris est ephemera, amphimerina, tritaeophya, tritaea ^{a)}.
 ESSERA. Porcelaine SAUV. ^{b)}).

Symptomata exanthematum vix conspicua, pyrexia vel nulla, vel parua: eruptio macularum latarum, discretarum (ardentium), in diuersis corporis partibus subito erumpentium. Cuticula eleuata post diem 1. aut 2. exsiccatur et frustulatim abit.

SAUVAGESIVS vidit huius exanthemata pollicaria diametro, ex intense rubris demum albescentes.

MILIARIS. Febris esserosa ZACVTI LVSITANI, puncticularis, culicularis, purpurata, miliaris, purpura *Auct.*

α. Benigna. ALLIONI *simplicissima*.

1. *Ante eruptionem*. Die 1. horror sine calore insolito sequente, febris lenissima, pulsus depressi, duriusculi, vrina sana, nullus dolor, nec sitis, viget appetitus, sudor importunus. Die 2. pulsus celeriores, densi, fortes, inordinate salientes, et vrina aquosa, metus et tristitia, scrobiculi cordis compressi.

²⁾ Febris urticata SELLE. 156. VOGEL p. 115. SAUV. *scarlatina* sp. 2. *urticata*. *Purpura urticata* IVNCKER tab. 74. p. 599. MEY-ZEREY mal. des arm. T. 2. p. 251. febris erysipel. sp. 2. SY-

DENH. f. 6. c. 6. GESNER. Beob. I. 131 sq.

a) Solum in latere dextro. GESNER. l.c.

b) VOGEL p. 114.

pressio, suspiria cogens, subitanei motus inuoluntarii, sensus stuporis cuiusdam pungitiui in digitis (*Krampf*, seu corrupte, *granf.*), somnus interruptus, sudores, acidum corruptum olentes, assidui, cum pulsu magis contracto. Die 2. 3. vel 4., raro ferius, sudoris impetus, alterni horrores et calores, praecedentibus puncturis, nec raro pruritu in collo, pectore, dorso, raro in facie efflorescunt, rubrae aut albescentes minutae pustulae.

2. *Post eruptionem.* Hae pustulae cito grandescunt, limpidio sero replentur, basi inflammata, vbi cutis plenior et tumefacta per sentitur. Intra horas 30. fere absoluitur eruptio, symptomata conuulsiva mitescunt, euanescent, sudor imminuitur, urinae colorantur. Die 7. pulsus molles, aequales, exanthemata exsiccantur, cuticula squammatum decidit.

β. *Maligna.* ALLIONI *acutior.*

Symptomata benignae: sed conuulsiva ab eruptione incrementum; febris maior, urinae tenues, aquae, lingua albida arefcit, agrypnia, cephalalgia distensiva, calet et inflammatur cutis, sudores minuuntur. Die 3. eruptionis omnia grauiora, febris ardet, pulsus duri, celeres, tendinum subsultus, sudores euanescent, pustulae subsident, calor vrens, cutis scabra fit, urina aquosa copiosissima, aegri inquieti, sitibundi, morosi, queruli, loquaces, quoquouersum se iactant, dein delirant, conuelluntur; aluus, huc vsque dura, biliosa foetida egerit; si redeat sudor, dicta saeuities erumpentibus iterum pustulis mitescit, sequenti die copiosiora erumpunt exanthemata, maioraque fiunt, prima vero incipiunt exsiccari. Haec post 2. 3. dies iterum accidunt, vt 3. 4. exanthemata pari molestia superueniant, vt ante diem 14. aut 20. non in vado sit salus.

Si malus exitus promte secuturus est, his se adiungunt delirium, conuulsiones, lacrimarum profusio,

fusio, moeror insolitus, loquacitas, caligo, visus duplicatus, strepitus inter potandum, eclampsia, asphyxia, mors.

N. Febris est continua, remittens, intermittens.

2. Non essentialiter differunt miliaris rubra et alba, quum utraque et grauis et lenis interdum adpareat, testibus ALLIONI, SELLE, BAVTEILLE.

3. Distinguitur et in primariam, criticam, et symptomaticam, quarum illa adesse statuitur, dum exanthema ad minimum die II. adparet, haec vero potius comes alius passionis esse statuitur, et progenies esse calidae nimis medendi methodi.

4. Cel. SAGAR : c) „non fido, inquit, pro certo affirmare, aut opinari audeo, quod forsan omnium miliarium causa sint vermes cum sua saburra in primis viis nidulantes; nam odor infantum verminosorum ex ore et odor sudoris miliaris aequales sunt aceti corrupti vappidi; quod vero hinc infantes febrientes multo rarius, licet quasi soli verminosi miliaribus maculentur, ratio esse videtur, quod hi lympham, miliares vesiculas replentem sudoris forma emittant per rarissimum suum reticulum integumentorum, obseruamus enim constanter, quod ii, qui multum sudant, paucas habeant papulas miliares, vel plane nullas; insuper in calidis regionibus rara sunt miliaria, quia in illis plus sudant homines d). „

5. Nouus adfectus circa annum 1650 primum comparuisse dicitur in puerperis Lipsiensibus, vnde postea latius serpsisset e).

PEMPHIGVS f).

α. Externus g).

K 2

Pyrexia

e) Nosol. p. 590.

d) v. SYDENH. T. I. p. 384.

e) Cf. ALLION. p. 3 sq.

f) SAUV. et VOGELII p. 116. febris bullosa SELLE p. 161.

g) SAUV. sp. I et 2. maior f.

Castrensis. Hydatides C. PISONIS obs. 147. 149. Febris vesicularis catarrhalis. DELII amoenit. sp. THIERY med. exp. p. 134.

Pyrexia acuta, die 2. vel 3. eruptio vesicularum pellucidarum flavescentium, ferofarum, nucis auellanae magnitudine in cute erumpentes, quibus ruptis, atque effuso fero succedunt amplae maculae, atrae, rubrae, crustis epidermidis nigricantibus circumdatae: passio intra duas septimanas terminatur.

β. Internus ^{h)}).

Anno 1752. epidemicus in valle Simmia, contagiosus. Inuadit cum dolore leui, tensiuo, vix perceptibili, in faucibus et externe pone aures, vsque ad thoracis partem anticam, cum horrore, nausea, frigore, calore vix subsequente. Collum externe plerumque intumescit, interne in faucibus, circa vuulam et pharyngem, bullae, aut pustulae, magnitudine circiter auellanae, sine magno dolore oriuntur, quae ichorem flauum, ingrati admodum odoris, in se continent. Saepe et in aliis partibus, vt in inguine, inter femora et pudenda, in labiis, digitis, rel. enascuntur similes. Die 2. 3. aut 4. collabuntur pustulae in faucibus, earumque loco apparent frustula albidula; anxietas, colli tumor vel euanescit, vel increscens in abscessum degenerat, a quo rupto salus. Quodsi colli tumor aut penitus euanescat cum pustulis faucium, aut abscedat, et grauitas in pectore sentiatur, empyicorum more pereunt aegri. Salus ab expulsiu materiae in abscessus glandularum inguinalium, axillarium, parotidum, maxillarium, oesophagearum, aut a vesiculis externis; periculum, mors a repulsiu.

APHTHA. Pemphigodes GALENI defin. med. Algola *Arabum*. vlcuscula oris F. PLATERI. Vesiculae gingiuarum SENNERTII. febris aphthosa *Auct.* ⁱ⁾).

Vlcuscula exigua, rotunda, albicantia, partes internas auris et faucium, imo ventriculi et intestinorum ^{k)})

occu-

^{h)} SAUV. sp. 3. *Helueticus*.
LANGHANSII Acta Hely. vol. 2.
p. 260.

ⁱ⁾ SELLE p. 161.
^{k)} ROSENSTEIN v. d. Kinder-
kr. p. 53.

occupantia: imo cutim, nunc albae, nunc flavae, aut nigrae obsident, praesertim apud Africanos¹⁾. Initio tumor est, seu eleuatio epidelidis instar grani milii, apice foraminulum gerens: vesicula alba, emphysematica cohaeret partibus subiectis, et dein tenacem et glutinosum mucum emittit, postea crustam, tenacissime adhaerentem, et frustulatum decidentem format, quibus in ore deciduis multis non raro ptyalismus. Variant:

a. Sede^{m)}:

1. In labiis, gingiuis, lingua, interne ad genas, palato, vuula et tonsillis comparentia, nullius periculi.
2. In pharynge, larynge, deglutitionem et respirationem reddunt difficilem.
3. In ventriculo latitantes vomitum, singultum efficiunt.
4. In intestinis, resorptionem chyli impediunt, diarrhoeam et marasimum procreant.
5. In pudendis mulierumⁿ⁾;
6. In cute conspicuae, malignae per se.

b. Colore: qui est:

1. Albus, pellucidus, flauus, rubicundus.
2. Ruber, atroruber, liuidus.

N. Periculosae sunt, quae vel oriuntur vel transeunt ad pharyngem, laryngem, ventriculum, intestina, quarum color profundus est, profundae proxime sibi adiacent, aut euanescentes mox redeunt.

2. Et cum, et sine febre, et breues, et diuturnae sunt.

PETECHIAE. Purpura SAUV. Porphyra *Graec.* Peticulae, febris petechialis, *auct.*

Symptomata exanthematica leniora, aut nulla. Vel a morbi initio, vel a die 2. 7. 9. erumpunt maculae rubrae, pressione digiti non euanescentes. Perstant in collo, mam-

1) LORRY m. c. p. 32.

n) HIPPOCRATES de nat. mul. c. 61.

m) ROSENSTEIN l. c. ROERH. v. SWIETEN p. 196.

aph. 981.

maninis, feminae, brachiorum interioribus, musculo bicipite, maxime a flexura cubiti ad carpum usque, vel per triduum, et ultra, vel ad morbi finem usque, aut reuertuntur.

„Sunt autem petechiae maculae rubrae, paruae, rotundae, seminis papauerini aut milii magnitudine, cutim non excedentes. Atque inter has, si plurimae vniuersum corpus impleuerint; minimae, tamquam acu punctae, intercedunt. Nonnumquam etiam, densae vbi sunt, aliquae latae supra scapulas ventremue apparent, cum duae aut tres petechiae coiuerunt. Profunde vt ex liuido rubrae istae maculae sunt; aliae magis roseae, nonnullae etiam liuidae sunt, potissimum iuxta internam carpi cutim, in quo loco multae venae conueniunt. Quorundam petechiae veluti splendent, quasi vitreae eae essent, haeque colorem vt paeoniae flores habent., Cel. STRACK o).

„Has propterea quod aequaliter rotundae sunt, et limbo non excedunt, sed intra suum circulum consistunt, *circumscriptas* nomino. Alterum genus non rotundas, neque aequales maculas habet; sed diffusas, quae intra cutim paullo latius procedunt, has *diffusas* voco., STRACK p).

Perpetuum non est, peius eos habere, quibus multae, quam quibus rarae petechiae sunt. Alii enim cum multis petechiis non multum aegrotant et erecti ambulant, alii cum paucis exitiose habent. Febris etiam ab eruptione non remittit plerumque, imo potius intenditur, vt vix sint criticae. Eas tamen aliquando esse criticas, docet SARCONE q), qui et negat, eas semper esse pravae medellae sequelas r). Febris si est, est vel continua, vel remittens, vel intermittens.

„Forte et notatu dignum erit, quod in pessima illa purpura, in Galliis obseruata, aegri, quibus prompte succurrebatur, vermes excreuerint, et dein exanthemata appa-

o) De pet. p. 18.

p) l. c. p. 25.

q) T. II. p. 116. III. p. 145. 157.

r) T. II. p. 170.

apparuerint. Vermium excretorum pariter meminerunt alii auctores, qui de febribus petechialibus scripserunt, ut L. DONCKERS ^{s)}, FORESTVS ^{t)}, V. SWIETEN ^{u)}.

N. A pulicum morfibus in eo differunt, quod rubedo hic a pressione euanescit.

PESTIS. Pestilentia SCHREIBER. Febris pestilens FR. HOFFMANNI.

Passio, admodum contagiosa, ex Aegypto, vel aliis Turcici imperii prouinciis, ad nos per contagium allata, petechiis, bubonibus, carbunculis, anthracibus plerumque, et (nisi subito trucidet) etiam febris stipata; cuius symptomata in aliquibus, aut pluribus aegris coniuncta adpareant, necesse est.

Incipit vario modo, iuxta diuersas corporum constitutiones, atque anni tempestates, et interdum sub larua aliarum passionum, v. g. pleuritidis, catarrhi, anginae, breui tum comparentibus bubonibus et carbunculis ^{v)}, incedit. Plerumque vero incipit cephalalgia, temulentia, horripilatione, virium prostratione, febricula cum nausea et vomitu, plus minusue copioso, materiae variae, oculi rubicundi sunt, adspectus tristis, lingua alba, fordida: quibus correpti interdum per 1. vel 2. dies obambulant. Pruritus imo dolores, percipiuntur in iis locis, ubi bubones et carbunculi erupturi sunt. In furore pestis plures 1. vel 2. die moriuntur, ante, quam prodeant tumores, petechiis vel maculis rubris paullo ante mortem cutim deturpantibus, et non nulli sine his exanthematibus.

Secunda vel 3. die bubones et carbunculi apparere solent, raro 4. In aliquibus sub primo insultu calor vrens, sitis ingens, urinae flammeae, genae rubentes, delirium ferox et phreniticum; in plerisque vero in principio calor leuis, sitis mediocris, urinae crudae et aquosae, aegri leui-

s) Idea febris petech. p. 3.

v) Cf. V. SWIETEN §. 1404. T.

t) L. 6. obs. 39. T. I. p. 238 sq. 5. p. 152 sq.

u) T. II. p. 405.

leuiter se aegrotare putant, donec summa virium prostratio, bubones, carbunculi, petechiae, vibices, nullum de periculo dubium relinquunt. Ante sextam diem omnes fere moriuntur, qui 7. superant, maximam spem recuperandae valetudinis iure fouent. Pulsus est inconstans, mox frequens, durus, fortis, mox lentior, mollis, paruus, sed plerumque debilis, cum vario frequentiae gradu. Febris est continua, remittens, imo interdum intermittens.

BVBONES pestilenciales vulgarem suam sedem habent in inguinibus, infra commissuram femorum, et sub axillis, aliquot digitos transversos infra caui fundum: sed et genas, et collum, cet. obsident. Nisi ante tumorum et exanthematum eruptionem ephidrosis critica excitetur, quod fit interdum, bubones pestis crisin constituunt, quae, vt sanitas sequatur, bonam maturationem et suppurationem requirit. Saepe accidit, vt bubo perueniat ad molem nucis auellanae, imo iuglandis, et paullo post euanescat, *vel*, dum remanet, non inflammetur, nec doleat; si prius, mors non procul est, si posterius, nullum leuamen percipitur, aut si est, fit, vt aegri, iam morti proximi, comedant, ambulent, elapsis vix aliquot horis subito moriantur. Reperiuntur non raro bubones in utroque inguine, rarius sub ambabus axillis, at frequentius in vno inguine et sub axilla simul. Bubones, sensim mole aucti, dolentes, rubentes, ad suppurationem tendentes, sub imminutione symptomatum, veram et perfectam crisin spondent.

PAROTIDES occurrentes, non adeo completam crisin perficiunt, ac bubones inguinales et subaxillares.

CARBUNCVLVS est macula gangraenosa cutis, partis adiutae faciem prae se ferens, rubor nempe, vesiculis pallidis, liuidis, aut nigris obfusus, inflammatione cinctus, in escharam nigram duramque cito degenerans.

ANTHRACIS nomine venit malum, carbunculo simile, sed grauius, male prominens, et panniculum adiposum altius penetrans, carnibus circumiacentibus valide inflammatis et dolentibus.

Carbunculi sedem suam habent in collo, genis, pectore, dorso, et extremitatibus, et nonnumquam ipsis bubonibus insident. Anthraces in collo et dorso plerumque obseruantur. Incipit carbunculus a puncto minimo, unde expanditur, vesiculam vnā, vel plures referens, quibus ruptis sanies effluit, et subiecta cutis liuescens fideratur. Si vires aegri deficiunt, non eleuatur, istis vero adhuc vigentibus, partes vicinae inflammantur, circulus ruber in ambitu escharae apparet, suppuratque et sic separatio mortui a viuis incipit; procedente suppuratione sub parte gangraenosa versus fundum, eschara vndique soluta cadit, et vlcus relinquit. Aliquando sine bubonibus carbunculi prodeunt, saepius eos comitantur, sed serius illis tunc superuenire solent. Petechiae sunt, uti in febribus putridis, aliquando magnitudinem lentis aequantes, coloris purpurei, liuidi, aut nigri. Accidit quoque, ut cutis varietur innumeris minimis punctis, et vibicibus, liuidis, nigrisue, partem verberatam referentibus. Haec omnia exanthemata pessima instantem mortem denunciant.

Adnotatione dignum est, pestem in nostris terris non generari, sed contagio, aliquando per vnum hominem, ad nos ex Aegypto ferri: ut, si vitetur communio hominum, vsusque rerum, peste infectarum, tum vrbes, tum domus, immunes a peste maneant: quod docet de **MERTENS** in l. de peste, quem cf.

STADIUM I. *Status neruosus. de MERTENS x).*

Est ille pestis status, qui praecedat exanthematum eruptionem et designatur calore, siti mediocri, vrinis crudis et aquosis, rel,

Idem

x) L. c. p. 128.

Idem in plethoricis inducit symptomata inflammatoria, calorem, sitim, ingentes, genas rubentes, vrinas flammeas, delirium imo phrenitidem.

Nisi pestis in hoc stadio iuguletur, succedit

STADIUM 2. *Status putridus de MERTENS y).*

Ab eruptione exanthematum, eorumque suppuratione definitur.

N. Phthisis et scabies pestem tamen admittunt z).

2. Aliquando est pestis sine exanthematibus consuetis, solis cum petechiis a).

3. Febris est intermittens, continua simplex, inflammatoria, putrida, ardens b).

Liceat iam quaedam *de affinitate exanthematum* addere.

1. Dantur symptomata, omnibus communia, pathognomonica exanthematum citra respectum differentiae: nimirum virium prostratio maior, quam per morbum expectares, horror, dein calor, lumbago, dyspnoea, (anxietas) alvius, pyrexia, febris varia, apepsia, nausea.

2. Omnia videntur per statum praeternaturalem primarum viarum, ob consensum cum cute, produci, quod suadent c):

a. Efflorescentiae, natae a rebus alienis primarum viarum, ut usu cancerorum, eorumque lapidibus, oryza, aqua calcis d).

b. Eaedem facile natae a febribus intermittentibus, quae primis viis merito tribuantur e).

c. Apepsia, nausea, vomitus, praeuia et communia omnibus exanthematibus symptomata f).

d. Erysi.

y) L. c. p. 129.

z) CHENOT. de peste. Comm. Lipf. XVI. 685.

a) L. m. c.

b) Ibid

c) Cf. STOLL. T. I. p. 44.

d) Testibus COLL. FRANC. T. 7. p. 367. Comm. Lipf. XV. 103. LORRY m. cur. p. 37 sq. v. SWIETEN T. p.

e) LORRY l. m. c.

f) LORRY p. 284.

- d. Erysipelas saburrae biliosae potissimum tribuenda.
- e. Variola, quod :
 - a. Diarrhoeâ eius eruptio cauetur g).
 - b. Diarrhoeâ, a die I-XI. ingruente, mitificatur h).
 - c. Febris prima est amphimerina, seu ephemera plurimum dierum ;
 - d. Febris altera est intermittens, aut hemitritaea, quae primis viis potissimum tribuendae.
- f. Rubeola, quod diarrhoeam quoque, et emetica cum purgantibus bene ferat i).
- g. Petechiae ab auctoribus potissimum saburrae, verminosae etiam, habentur progenies.
- h. Miliaria certe quoque saburrae, verminosae etiam, non sine ratione tribuere debebis.
- i. Aphthae quoque saburrae recte adscribuntur.
- 3. Praeludium exanthematum est inconstans, si quoddam vni peculiariter adscripseris, dum v. g. variola habet praeludium morbillorum, et contra.
- 4. Omnibus fauet calida et humida tempestas, laxa cutis.
- 5. Omnia certum quidem decursum seruant, sed fit, vt absque exanthematum eruptione, simili ratione decurrant. v. morb. anon.
- 6. Omnia simili ratione alia symptomata excitant: ita datur angina seu cynanche variolosa, morbillosa, miliaris, aphthosa, pemphigodes, petechialis, pestifera, rel. idemque de peripneumonia, dysenteria, rel. valet: nisi haec symptomata morbo potius tribuenda esse credas, quod similem omnino per morbum curationem possint.
- 7. Omnia et symptomata et critica sunt, et modificantur per morbum varium, et per hunc similem admodum

g) BALLON T. I. p. 168. Comm. Lipf. VIII. 493.

h) Comm. Lipf. VII. 125. VIII. 493.

i) Rec. period. T. 8. p. 338.

dum curandi rationem admittunt, ut potissimum morbo, dein febri, satisfiat ^k).

8. Exitus omnibus communis, per iacturam cuticulae, sordium enatarum, exulcerationem, phlegmatiam, rel.
9. Plura non raro sunt epidemica eodem tempore, v. g. variola et rubeola ^l).
10. Aut proxime se excipiunt earum epidemiae, sic aliquoties contigit Hagae comitum, ut variolosam epidemiam praecederet morbillosa ^m).
11. Vnus aegrotus habet plura exanthemata:

a. *Coexistentia*:

- a. *Diffusa*: variolam et rubeolam ⁿ). Variolam lymphaticam et rubeolam ^o). Scarlatinam, miliarem, variolam ^p). Variolam, miliarem, petechias ^q), pemphigum et miliarem ^r).
- b. *Solitaria*, v. c. ita, ut vnum latus morbilli, alterum variolae occupent ^s).

b. *Succedentia*:

1. Variolis variolae ^t);
2. Variolis varicella ^u).
3. Variolis rubeola ^x).
4. Variolis aphthae: ^y).

12. Conueniunt omnino omnia inter se, quum conueniant:

a. Ery-

k) Febris exanthematum non est essentialis, quum et adesse et abesse soleat, et varia sit, actius, passius, et aequae sit effectus morbi atque exanthemata ipsa. Quare mireris, esse, qui statuunt, exanthemata potissimum ex febre aestimanda esse.

l) ROSENSTEIN l. c. p. 294.

m) Comm. Harlem. VIII. 488.

n) ROSENSTEIN l. c. Comm. Lipsf. XV. 591.

o) Comm. Lipsf. XIV. 365. SIDOBRE de var. p. 242. DIEMERBROECK h. 19. HARRIS m. inf. ac.

p) De HAEN R. M. II. 95. 87. 91.

q) RIVERII C. I. obs. 21.

r) SELLE l. c. p. 193.

s) ETTMVELLER op. T. 2. p. I. c. 10. p. 347.

t) ROEDER. m. var. h. 12. 13. Comm. Lipsf. XII. 151. XIV. 364.

u) HAGENDORN obs. 237. ROEDER l. c. p. 61. Rec. period. T. 7. p. 49.

x) De HAEN l. c. p. 97. DIEMERBROECK h. 19. Act. P. M. vol. 6. p. 370. ROEDER. d. h. 9. 15. Comm. Lipsf. XII. 151.

y) ROEDER. l. c. p. 70. rel.

- a. Erysipelas et pestis, dum idem a peste eo saepe tantum distinguitur, quod contagii expers fere sit, nec tanto stipatum periculo, licet idem contagiosum aliquando sit, et bubonibus stipatum, pestis e contrario mitis.
- b. Erysipelas et variola, saltem idem pustulosum ^z).
- c. Variola et rubeola ^a), quod
 - a. Passio utraque aut coëxistens, aut
 - b. Proxime sibi succedens, etiam epidemice ^b),
 - c. Rubeola sit variolodes.
 - d. Symptomata sint communia, nimirum oculi madidi, semiconcreti, lingua alba, somnolentia, febris, delirium, et variola saepe excitat symptomata catarrhalia, ut incipiat a tussi, lacrimatione, oculorum splendore, ut rubeola ^c).
 - e. In eadem familia, quae solidorum rationem plerumque communem habet, uti eadem vigent exanthemata, v. c. scarlatina, in dissitis etiam subiectis, teste PLENCI⁷, ita hic variolis, alter rubeola laborat ^d).
 - f. Eruptio in utroque exanthemate et anticipat et postponit.
 - g. Diarrhoea variolam et rubeolam leuat et aufert.
 - h. Rubeola non semper desquamatur ^e).
 - i. Loco insitae variolae comparuit rubeola, et dein (ob morbum perseverantem) variola ^f).
- d. Variolae et petechiae, dum hae interdum exulcerantur ^g).
- e. Variolae et pestis, quod vel solae veterum descriptiones probant, quae tum ad illam, tum ad hanc referri possunt ^h).

f. Scar-

z) ROEDER. l. c. p. 58. SCHROEDER. op. T. II. p. 210.

a) SCHROEDER. op. II. 213.

b) Act. Harlem. X. p. 489.

c) Journ. de med. Juill. 1758. p. 81.

d) De HAEN l. c. p. 98.

e) Cf. de HAEN f. d. p. 110 sq.

f) Act. Suec. XXVII.

g) v. SWIETEN C. T. II. p. 405.

h) Cf. WERLHOFFII et HAHNII scripta et MERTENS l. c. p. 120.

- f. Scarlatina et erysipelas i).
 - g. Scarlatina et rubeola, quod vel exinde patet, dum vtraique passionem olim auctores commutauerunt, sicut praecursus variolarum interdum habet vtraque k).
 - h. Miliaris a rubeola, fere solo gradu et impetu l).
 - i. Miliaris et aphthae, quae sunt fere interna miliaria m).
 - k. Pemphigus et miliaris solo gradu n).
 - l. Miliaris et petechiae, dum vtraque saburrae, subacidae, verminosae, potissimum tribuenda.
 - m. Petechiae, et morbilli, dum illae interdum sunt asperae, ut ad rubeolam accedant, quales Viennae 1758. Cl. HASENOEHRL vidit.
 - n. Vrticaria et scarlatina fere solo gradu.
13. Tempus eruptionis omnibus inconstans est, dum de omnibus exempla 1. 2. 3 sq. diebus factae eruptionis prostant.

Quare non sine ratione statuere licebit, omne exanthema esse progeniem alienatae irritabilitatis gastricae, indeque alienati toni integumentorum corporis, ut simul putes, tum contenta in primis viis, et modificationem circuitus humorum, pyrexiam, febrim, tum tonum vasorum cutaneorum varie adfectum, constituere essentiam et essentielles exanthematum differentias. Quibus positis, patet, ob characterem erysipelatis fere omnibus reliquis exanthematibus communem, erysipelas posse tamquam genus, reliquae tamquam eius species, considerari, nec multum interesse, unam speciem aliquando cum altera commutasse, modo attenderis, num actiua, an passiva, critica, an symptomatica sint exanthemata, quod per febris naturam facilius euincitur, nisi irritabilitatis gastricae conditiones sufficienter cognoscas.

EFFLO-

i) v. SWIETEN II. p. 401. LORRY I. c.

k) Cf. de HAEN febr. div. p. 113.

l) HELD Med. chir. Ausz. I. 118.

m) v. SWIETEN III. p. 200. de HAEN f. d. p. 48. 68.

n) SELLE p. 193.

EFFLORESCENTIAE. Protuberantiae et maculae cutis apyretae, plerumque chronicae.

PHLYCTAENAE. Tumores exigui, humore repleti, qui rupti exsiccantur, excoriantur.

PVSTVLAE. Tumores exigui, colorati, apice suppurantes, in pus vel crustas abeuntes.

PAPVLAE. Tumores exigui, non suppurantes, sed humidi quid apice reiicientes, dein abeuntes in squammas furfuraceas.

VARI. *Ionthoi Graec.* Tumores duri colorati, pertinaces, veluti tubercula scirrhouidea, nec suppurationem, nec desquaminationem subeuntes.

EPINYCTIS. Phlyctaeenae atrorubrae, aggregatae, 3. v. 4. linearum in diametro, extremitates potissimum obsidentes, noctuque inprimis acriter pungentes.

PSYDRACIA. Phlyctaeenae rubrae, intus firmae, post cuticulae a cute separationem cauae, vacuae, vel sero flauo turgidae.

HYDROA. Phlyctaeenae, granis milii non maiores, subito oboriundae, conferta, plerumque fugacia, non cohaerentia.

HERPES °). Tumores leuissime asperi, inaequales, cutim eminentes, digitum appressum glutinoso humore imbuentes, a vesiculis lymphaticis, quae oculo, vitro armato, conspici possunt, exsudante: hae vesiculae omnes, limbo rubello distinctae, inter se fissuras, in rimae formam apertas, reticulum subcutaneum colore pellucido, sed flauesciente et sordido donatum, ostendunt. — Raro solitarius est herpes, sed vel in viciniam, vel in distitas partes, se diffundit improuise, et pruritu potissimum noctu, et sub chyli ad sanguinem admixtione, molestus est. Vere ut plurimum erumpit, aestate praeferuida viget, autumno fouetur, filet per hiemem, calore fouetur humido et non perspirabili, et passionum ex adia, neustia fata sequitur.

Insert

Infert saepe coryzam habitualement, tonsillarum inflationem, vocis alterationes, narium inflationem, secreta matutinos, saepe phthisin, maniam, melancholiam.

- a. MILIARIS P). Rubor per areolas emicans, tumoribus albidis, grani milii adinstar cuti nitenti superpositis, asperis, et limbo rubello circumscriptis, stipatus, apyretion, corpus, raro faciem, tenet, plerumque solitarius, cute integra, areola limbo rubello distincta. Pustulae emicant, sero repletae, sub epidermide aggregatim compositae, interstitia replent lemae epidermidis, quae areolam faciunt asperam: post horas aliquot enascitur altera pustularum agglomeratione, quam aliae per plures septimanas sequuntur. Pruritus summus, anxietas, appetitus prostratio, eiulatus, marcor, passio sensum fit mitior, atque, ubi deferbuit materies, locus remanet levis tenuissimis et asperitate notabilis, cum pruritu enormi. Saepe recrudescit, aut ad annos extenditur.
- b. VIVVS q). Signa herpetis, se diffundentis, ut ruber limbus quotidie extendatur, et limes, antea rubens, iam fiat asper, cruciatus remissiores.
- c. ERODENS r). Foeditate potius, quam cruciatu, incommodus frequenter faciem occupat, contagiosus est: euidentes papulas non profert, nec ulceris crustosi formam inurit.
- d. PHLYCTAENODES, PHAGADENICVS s). Nascitur pustula simplex et cutim subiectam in tumorem durum et asperum attollit, scabrumque, epidermis cito a cute secedit cum humoris rodentis, calentis sensu, ut vicinae partes attollantur et crispatae findantur, partim crustis, partim tabo horridae. Pustulae solitariae, aut frequentes, quum et manus, ob pruritem scalpentes, passionem propagent: contagium enim, et ab aliis, tactu suscipitur. Crustis deciduis succedunt aliae, locum, tabo turpissimo defluentem, apertum tegentes. Humor profusus,

glu-

p) LORRY p. 305.

q) LORRY l. c. p. 307.

r) LORRY p. 308.

s) LORRY p. 309.

glutinosus, mucosus, rancidulus, acescens est, alui excrementa interdum virescunt. Palpebras, genas, mentum, alas narium, et regionem aurium internam et externam frequenter occupat. Volumen partium immaniter auget, et tum partes, tum linthea, erodit. Occupat et inguina, et dorsi infima, et genitalia virilia ^t).

IMPETIGO ^u). Oriuntur in extremitatibus; etiam vnguibus.

a. Similis scabiei, rubens, durior, videntur in ea quasi bullulae quaedam, ex quibus interposito tempore quasi squammulae solvuntur; certioribus temporibus reuertitur.

b. Peioris indolis, similis fere papulae, sed asperior, rubicundiorque, figuras varias habens. Squammulae ex summa cute decidunt, rosio maior est, celerius et latius serpit, et certioribus temporibus fit et desinit; *rubra* dicitur.

c. *Nigra*. Deterior est, crassior, durior, et magis tum in summa cute funditur, et vehementius rodit et squammosa nigraque est. Procedit et latet, nec tardat. Minus vero errat in temporibus, quibus oritur, aut desinit; neque ex toto tollitur.

d. *Subalbida*, recenti cicatrici similis, squammulasque habet pallidas, subalbidas, lenticulae similes, quibus demtis profluit interdum sanguis. Alias humor albidus est, cutis dura, fissa, et procedit latius.

PSORA. PSORIASIS ^x). Scabiei similis, et sub huius nomine plurimis descripta, essentiales tamen eius notas non seruans, sed passio vera aliorum morborum; pruritus immanis, crurum et femorum phlegmatia, anhelitus, hydrops, indoles rebellis, et cutis aspera durities, odor acidus, acescens.

MACULAE. Coloris mutationes cutis (hanc vix supereminentes) particulae, apyretae.

LICHEN.

^t) Cf. et Journ. de med. Avr. 1767. p. 335.

^u) CELSVS l. 5. c. 28. 17. LORRY l. c. p. 349.

^x) LORRY l. 5. p. 241.

LICHEN Y). Cutim non indurans asperitas, modice, ad limbos, saepe rubellos, pruriens, epidermidem in foliola conuertens.

PORRIGO. Pityriasis Z). Maculae, fundo rubicundo praeditae, desquammabiles, partem capillatam occupantes, interdum ad frontem, mentum, extensae.

VITILIGO, scabies crustacea A). Maculae, summam cutim obsidentes, non profunde inustae, cum pruritu immani, partibus vicinis non tumentibus, at crassioribus et densioribus redditis, laeuibusque ad tactum, pilis defluentibus, parcoque humore, albo flauo, squalido, interdum viridescenti, ex vlcusculis prodeunte.

a. ALPHVS, morphaea alba Arabum. Macula pallescens vel alba, maculis minoribus discretis, serpens, dum vetus est, et squammas excitans.

b. LEVCE. Graec. Color albidior, quam in alphi, pili partis adfectae albi, pars adfecta, antea capillata, glabrescit, pili delabuntur, vitium altius serpit in cutim.

c. MELAS. Morphaea nigra. Maculae paucae et diffusae, subsquammosae, fusci coloris.

CVTTA ROSEA, rosacea, exerythron, Graec. b). Faciei maculae tenues primum, et vix notabiles, dein serpentes, tubercula rubra supra partem, iam scabram et leuiter tumentem, elata, saepe per totum vultus ambitum dispersa, saepius per genas diffusa, nasumque rubore inhonefco et frontis nitidum honorem deturpantia. Maculae, propius inspectae, vasorum, sibi quasi adpositorum, intricatorem sistunt, per interualla minima diuisam. Adultis, (vix pueris et senescentibus) familiaris est.

EPHELIS. Maculae umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem, vel manus et tibias, adficientes.

NAEVVS. Macula congenita, varii coloris.

ECCHY-

y) LORRY l. c. p. 243.

z) LORRY p. 460. sq.

a) LORRY p. 352. sq.

b) LORRY p. 641.

ECCHYMOMA, ecchymosis, sugillatio, *suffusio*, *effusio*. Macula plana, aut parum prominens, et subfolitaria.

- a. LIVOR, melioma, ecchymoma coloris liuidi.
- b. MELASMA. GALEN. *Nigror. Latin.* Ecchymoma coloris nigri.
- c. VIBEX, vibices. Liuores, quasi a verberibus, in acutis comparentes.
- d. HYPOPTHALMIA. HIPPOCRAT. *Hypopyon.* PAVILLI AEGIN. Liur sub oculis : symptoma maxime profluuiorum (sympathiae externae).
- e. HYPONYCHON. Ecchymoma vnguium : symptoma potissimum tritaeae.

PHRICASMVS.

- a. RIGOR. Succussio tremula, coacta cutis, cum sensu frigoris.
- b. HORROR. Rigor et alior alternantes.
- c. ALGOR, FRIGVS.
 - a. Realis. Imminutio caloris, tum aegrotis, tum adstantibus, ratione conspirante, atque ad thermometer, conspicua.
 - b. Sensitiuus :
 - 1. *Aegroti*, quando vel frigus, vel horrorem, aeger sentit maiora, quam adstantes sentiunt, et thermometer suadet.
 - 2. *Adstantium*. Si calet admodum ille, qui aegrum tangit c).

ARDOR. Caloris sensatio molesta.

- a. Realis. Quando consentiunt cum aegroti ardore sensatio adstantium, bene calentium, et thermometer.

L 2

b. Sen-

c) Cf. de HAEN R. M. -- Sub phricasmo pulsus euadit rarus, parvus, contractus, mollis, inaequalis, intermittens, facies albet, pallor, vngues liuescunt, tremor occupat artus, dyspnoea, trismus,

rel. adfunt : qui ex intermittentibus moriuntur, plurimi sub frigore moriuntur : nocet in primis sudoribus et exanthematibus superueniens, haec repellendo.

b. Sensitiuus.

1. *Aegroti*, quando maiorem aeger sentit caloris gradum, quam adstantes et thermometer alienantur.
2. *Adstantium*, dum friget plus minus ille, qui aegrum tangit d).

α. Vniuersalis.

Huc CAUSVS et τὸ πῦρ HIPPOCR. *febris ardens auct.* Non constat inter auctores, quae proprie febris sit causus. „BOERHAAVIUS e) illam pro summo sanguinis statu inflammatorio, IVNCKERVS, TISSOTVS f), VOGEL g), alique, pro summo febris biliosae gradu, tradunt; ELLERVS h) adhuc aliud quid sub illa intellexisse videtur: et quisque priscorum testimoniis sententiam suam probare potest. „ Haecenus CL. SELLE i). Sed docet GALENVS k), HIPPOCRATEM omnem febrem, in qua eminebant aestus ac fitis, nominasse ardentem, ut recte videatur VOGELIO causum dixisse febrem, mox inflammatoriam, mox synochum imputrem, putrem, seu biliosam et putridam, addo et verminosam. Quae si vera sunt, quid boni expectari poterit a BOERHAAVII descriptione febris ardentis, quam composuisse e variis veterum scriptis videtur? et cur nomen hoc retinendum, nisi sub dicto HIPPOCRATIS significato febris gradum et indolem designare velimus?

β. Partialis. *Epiphlogisma, phlogosis, erythema volans, volaticum:*

1. *Faciei. Aestus, ardor volaticus.* Subitaneus faciei calor et rubor per horae quadrantem durans, interdum in sudorem erumpens. Tribuitur et aliis partibus, ut collo.

2. *Auris.*

d) Thermometerum raro consensit cum caloris, vel realis, sensu. Cf. de HAEN l. c. — Sensitui ardoris et phricasini meminisse iuuabit, dum aegroto manum adiuuamus, aut relata ab adstantibus aestimamus.

e) §. 738. sq.

f) Opp. T. I. p. 15. ed. BALD.

g) De morbis cogn. p. 51. 56.

h) M. cogn. p. 69.

i) l. c. p. 50.

k) Comm. III. in L. III. epid. HIPPOCR. p. 281.

2. *Auris. Pyrosis* VOGEL 1).

3. *Volae manuum.* In hecticis.

PRURITVS. Molesta cutis sensatio, ad scalpendum incitans, cogens.

CELSA. VOGEL. Sensus flatus, vaporis, aut formicarum, oberrantium subter cute.

ADIAPNEUSTIA, *ariditas cutis.* Ξυρόσια aut Ξυρὸς ὕδρος HIPPOCR. Transpirationis naturalis et liquoris, cutis organon humectantis, suppressio, siccitas et rigiditas cutis (tactu frigidae), sudor partis corporis glutinosus, aut mador, saepe cum anxietate.

EPHIDROSIS. Transpiratio, quantitate, qualitate, tempore, abnormis.

a. SVDOR. SVDATIO. Transpiratio, copia maiori potissimum abnormis.

b. MADOR. Transpiratio, copia mediocriter adaucta.

α. *Calida*, cum calore, sanguinis velocitatem et feri abundantiam arguens.

β. *Frigida*, cum frigore, vbertatem materiae transpirabilis et cutis laxitatem designans.

DYSODIA. Foetidorum vaporum e corpore exhalatio.

CACHEXIAE. Habitus deprauatus totius, vel magnae partis, corporis, citra neurosin, vel pyrexiam primariam.

ICTERVS. AVRIGO, *regius, arquatus morbus, auct.* Cutis color aureus, croceus, luteusue, ad virorem inclinans, ut vere viridis aliquando sit, saepe cum physconia hepatica, et signis polycholiae, quorsum oculorum flauedo, visu etiam flauo, vrina bile abundanti, ut tingat lintea, linguâ, saliuâ, sudore, sanguinis fero, flauis, quin et vnguibus (et ossibus), pruritu, adiapneustia. constipatione.

MELASICTERVS, *icterus niger, melanchlorus auct.* Color cutis niger, vel diffusius, vel guttatus et maculosus, excreta vix alienata, aut simili ratione, quam in ictero.

N. Nili

N. Nisi multa auctorum icteri reicere exempla volueris, praeter flauedinem cutis nihil ad icteri essentiam requirere poteris, et alia icteri exempla potius possent ad physiconiam hepaticam referri, icterusque eius symptoma statui: ischocholia quoque, potissimum in epidemicis, spasmodicis, abest. Verius igitur tamquam symptoma consideratur, aut tamquam passio, vbi vero potius ad physiconiam pertinet. Si omnem ad suum morbum retuleris, vix opus erit, vt causas pathologicas icteri adeo subtiliter rimaueris.

Datur, quod expedit notasse:

α. Icterus dimidii corporis:

a. *Transuersim sumti*, vt capitis et pectoris ^m).

b. *Longitudinaliter diuisi* ⁿ).

β. Partis ^o).

Coexistunt interdum icterus et melasiicterus:

a. Facies melasiictero laborabat, reliquum corpus ictero ^p).

b. Facies virescebat, dextra pars corporis laborabat melasiictero, sinistra ictero, dein facies ictero cum parte dextra, sinistra melasiictero, (vrina ceterum viridi, modo atra, interdum viridi, noctu atra ^q).

Causas sic ponere poteris. Oritur

1. Ob secretionem bilis impeditam: a) per sanguinis, viarumque eius vitium, vt atram bilem. b) per vitium hepatis, et quidem ob impeditam viam: *α*) ramorum ductus hepatici, aut trunci ipsius, *β*) ductus communis, *γ*) arteriae hepaticae ^r).

2. Ob auctam materiam biliosam, polycholiam.

3. Ob

m) v. SWIETEN T. 3. p. 141. Journ. de med. Oct. 1765. p. 312.

n) E. N. C. C. 3. obs. 64. p. 141. ETTMVELLER opp. T. II. p. 344.

o) DE HAEN d. de ictero adn. T. 2. pr. path. p. 114. PAVLINI

obs. dec. I. 9. A. N. C. C. IV. o. 112. Journ. de med. Fevr. 1768. p. 163.

p) BOERH. cons. med. XVI.

q) E. N. C. C. V. obs. 41. p. 61.

r) Cf. Comm. Lips. III. 534.

3. Ob resorptionem bilis adauctam ^{s)}: a) per impeditam viam ramorum ductus hepatici, b) ductus communis, c) ductus cystici, d) effusionem largam bilis in primas vias, rel. ^{t)}).

PHOENIGMVS. Cutis rubedo diffusa, maculata, virgata, vel punctata, totum fere corpus, aut magnam eius partem occupans, apyreta. — *Petechialis* SAUV. sp. 1. purpura apyreta D. CUSSON dicuntur maculae purpureae in cute vniuersa, vt in petechiis, sine pruritu, tumore, febris; puncturae vestigio.

GHOLOROSIS. Abnormis cutis color cum asthenia habituali: color albus, cereus, luridus, cinereus, fuscus. *Vera* dicitur, quae pica, malacia, nymphomania, stipatur.

PNEVMATOSIS. EMPHYSEMA. Tumor cutis flatulentus, elasticus, diffusus, pressione crepitans, cum naturali cutis colore.

ALOPECIA. OPHIASIS. Graec. Pilorum epidermidis decisio.

α. CALVITIES. Alopecia in solo sincipite.

β. AREA. SAUV. sp. 4. vbi per areas capille deficiunt.

γ. PORRIGINOSA. SAUV. sp. 5. *Phthiriasis* HIPPOCR. Vbi pilosa cutis desquamatur in capite.

OSTEOCACHEXIA. Cachexia cum alienata indole ossis.

a. GUMMI. Tumor ossis admodum mollis, planus, aequabilis, circumscriptus.

b. TOPHVS. Tumor paullo durior, at mollis adhuc, instar cornu vitulorum, sub cute adhuc haerentis, planus, aequabilis, saepe dolens, in compactiori fabrica ossea enascens.

c. NODVS. Tumor durior, instar cornu vituli, quod solitam duritiem nondum adquisiuit.

d. EXOSTOSIS. Tumor, duritie ossis praeditus, aut ad eam proxime accedens.

a. Collectio

s) Cf. b. MECKEL nov. obs. p. 97. NVS, BRVENING, MARCARD,

t) Cf. v. SWIETEN, MORGAGNI, DE HAEN, alii.

- a. Collectio humoris in ipso ossis cauo, vt substantia ossea protrudatur.
- b. Tumor a succo, in ossis substantiam effuso.
- c. Tumor periostei, tumidi, indurati, etiam a succo nutritio.
- d. Tumor e collecta materia ossea, circa os fissum.
- e. HYPEROSTOSIS. Tumor notabilis, plus minus durus, inaequabilis, tuberosus.
- f. RACHITIS. Dura ossium, in articulos coëuntium, intumescencia, media illorum parte potius ad ceream interdum flexilitatem emollita: carniū marcor, flacciditas, cutis, praeter eam capitis et abdominis, laxitas et rugae, vasorum sanguiferorum magnitudo, caput magnum, nutans, facies plena, pectoris laterum compressio, sterni protuberantia, pigritia ad ambulandum ex languore potissimum lumborum, ingenium praecox, sensuum, famis et digestionis vigor, stomadyfodia acida. Passio tenellos, pueros, corripit saepe intra 3 - 6 aetatis annum, aut ad 12 annum, aut per vitam, durat, aut euanescit ^{u)}.
- g. OSTEOSARCOSIS. Tumor mollis, quasi carnis, aut pinguedinis a luxuriante compage ossea degenerata, dolorificus.
- h. OSSIVM MOLLITIES VEL LIQVEFACTIO cum mira artuum contorsione et successiua totius corporis contractione, rachialgia acerbissima.

i. TEREDO,

u) Compages ossea mollescit, musculorum actio ossium inducit curvaturas, anguli atque eminentiae complanantur vel rotundae fiunt, extrema articularum intumescunt, superficies externa inaequalitatem et incrustationis speciem contrahit, et innumeris foraminulis, saniem rubellam fundentibus, stipatur, colorem denique cineritium induit, medulla simul fluidiore et abundantiore: dentium germina delentur, protrusi corrumpuntur, claviculae, maxime versus sternum, inflantur et intor-

quentur, humerus, vlna et radius versus interiora flectuntur, manus et pedis digitorum ossa crassa et tuberosa apparent, collum femoris transversalem directionem consequitur, genua ad se accedunt, tibiae fibulaeque curvantur, pelvis a sua forma varie aberrat, dum apertura superior angustatur, inferior nimis ampliatur et ad dorsi spinam flexuram alienam adsumit, capitis moles denique deformitatem patitur. Quarum deformitatum non nullae ad totam saepe vitam, superata etiam passione, perdurant.

i. TEREDO, SIDERATIO, GANGRAENA, CANCER OSSIS, SPINA VENTOSA: intumescencia ossis spongiosa, inaequabilis, et mire tuberosa, acerbos dolores creans, cum carie, et partium incumbentium inflatione et exulceratione fistulosa, ab intima compaginis osseae corruptione. Interdum parte ossis emortua, reliqua viua et luxurians illam obtegit, vt os in osse inueniatur.

k. CARIES. Texturae organicae ossis destructio.

α. Occulta: Tumor, dolor partis plus minus intensus, continuus, aut per interualla recurrens, cutis superincumbentis alienatio in rubellum, violaceum, plumbeum, integumentorum inflatio, dolor, sensus mollitiei et fluctuationis.

β. Aperta, *ulcere stipata*: caro flaccida, albicans, luxurians, specillo facile penetrante, labia vlcis incuruata, pus tenue, ichorosum, acre, copiosum, nigricans, foetoris rancidi, ossis denudati, digito aut specillo agnoscenda, inaequalitas, colore nativo in album, flauum, gryseum, cineritium, nigricantem mutato: periosteum solutum:

a. *Superficialis*: symptomata leuiora, absentia tumoris notabilis ossis, et post leuem partis perforationem haemorrhagia.

b. *Profunda*: symptomata grauiora, et serius accedens ossis tumor.

1. *Humida*, copiosior ichoris effluxus, saepe caro luxurians.

2. *Sicca*, defectus ichoris.

l. OSTEORPYR, caries anonyma. NOEL x) ACREL y). Summus dolor ad partem ossi propinquam, pungens, vrens, chronicus; sine aut cum exostosi, hyperostosi, rel. cum aut sine phlegmasiae, apostematis, topicorum signis, a mutatione osseae substantiae in adiposam massam, aut diaphan-

nam

x) Journ. de med. T. 51. HELD
Aufz. I. p. 73. sq.

y) Chir. V. T. 2. p. 208 sq.

nam, densam gelatinam, aut cartilaginofam, vt etiam adiacentes partes, muscoli, tendines, tela cellulosa et integumenta, in vnam fere massam coëant: pars adfecta in mortuis notabilem caloris gradum ad thermometron ostendit. Salus ab ossis amputatione. Quare grauis adfectus, si pectus obsidet, nihil salutis admittet.

ELCOSIS. Cachexia ob solutionem continui partium mollium, cum ichoris, tabi, saniei, apocenosi.

CANCER. Cachexia singularis, telae cellulosaë lentae corruptioni forte tribuenda.

Variat:

(a) Natura,

a. *Ad acidam vergenti* z).

Acidum explicitum docet materia calcarea, cancro adspersa, sal communis.

b. *Alcalina, putrida* a).

Docet acidum vitriolicum, cancro adproximatum.

c. *Ammoniacali* b).

Docet materia calcarea.

d. *Syphilitica aut scrophulosa* c).

e. *Plethorica, ex amenorrhoea* d).

f. *Atrabilaria* e). Itaque patet, cancerum omnino esse passionem, nequaquam morbum, quum eius natura omnino adeo varia sit, ac morbi sunt. Quare in eo, quod plerique naturam canceri perperam eandem fecerunt, ratio forte quaerenda est, quod eius descriptiones adeo adhuc vagae et repugnantes existant, vt et nos procul dubio parum frugis prolaturi simus, et quod medendi me-

z) C. A. BOEHMER d. de cancro occ. & ap. §. 11. N. BAYMEACH d. de cancro, aqua calcis sanato. Goett. 1769. LE FEBUERE v. e. Mittel w. d. Krebs, Erf. 1776. 8. etiam in d. A. A. f. pr. Aerzte. T. II. f. 4. p. 174. LERCHE d. de cancro mamm. Goett. 1774. §. 19.

a) PEYRILLE d. de cancro. LE

FEBUERE l. c. BOEHMER l. c. LERCHE l. c. §. 14.

b) BOEHMER l. c.

c) BIERCHEN Abh. v. Krebs, LERCHE l. c. §. 16. SAUVAGES nos. T. I. p. 149.

d) LE DRAN. Mem. de l'acad. de chir. T. 3. p. 37. sq.

e) GALEN. m. med. l. 2. c. 12.

LERCHE §. 17.

methodus huc usque fere nullus sit certus, quum solum adhibeantur, quae creduntur esse specifica, citra respectum ad morbum. Vtinam haec Cl. Viros incitarent, ut naturam canceri, passionis adeo dirae, felicius perscrutarentur.

(b) Ambitu.

a. *Topicus*: qui variat iterum *gradu*:

α. *Occultus. CANCER.* Dicitur, quamdiu cutis integra affectam partem tegit: (phyma scirrhusum, lancinans, venis varicosis, profundo rubris, nigris, lividis, oblitum, e quo facile sanguis profluit). Si e scirrho oritur, rubere incipit et prurire tumor scirrhusus, huc usque naturali colore praeditus, et sensus expers, ut adfecti non absque damno fricent et scalpant. Subito crescit scirrhus, immobilis fit, asper et inaequalis. Rubore tandem purpureo lividoque perfunditur tumor, et venae circumdantes intumescunt. Cutis, cancerum tegens, profunde rubet, et flaccida simul et rugosa est. Dolor ingens accelerat pulsus, sed simul deprimit, constringit, tenuem debilemque reddit. Dolor ille primum plerumque per intervalla aegrum excruciat, subito oriens, subitoque recedens, sensim frequentius, tandem continuo, aegrum torquet et vrit, a viuo quasi igne natus, vel pungit, quasi aciculis excitatus. Tandem venae plurimae, lividae, atro sanguine turgidae, circumdant cancerum, qui in apicem tandem eleuatur, rupturam minantem citra fluctuationem.

β. *Apertus. CARCINOMA.* Ex occulto oritur carcinoma, seu cancer apertus et exulceratus, qui dicitur simul, atque cutis disrupta et exesa est. Oritur scilicet in eminentiori plerumque tumoris loco excoariatio et tenuioris saniei stillicidium: tandem vero rimae adparet, ex qua plerumque prodit fungosa canceri substantia. Quo facto omnia subito in peius ruunt,
ichot

ichor effluit, male olens et acerrimus, carnem omnem vicinam non depascens solum, sed ipsa etiam lintheamina erodens; tamque horrenda ulceris dysodia est, ut aegri omnem appetitum, sensum vero gustum et olfactum perdant. Labia ulceris tumida, dura, callosa, retorta, coloris nunc pallidi, cineritii, nunc, liuidi, nigri, lucidi, viridis, variegati sunt. Dolor vrens, pungens, intolerabilis, quietem et somnum fugans, exhaustiens vires, ut aegri lipothymiis et convulsionibus corripiantur. Frequenter haemorrhagia e vasis erosio eo plus periculi adfert, quo magis exhaustos debilitat, et quo difficilius sanguis sisti potest, dissolutus enim sanguis e locis corrosis erumpit, quibus medelam non feras. His tandem febris accedit summa, macies summa et lenta plerumque mors ^f).

b. *Vniuersalis.*

Tumores, aut ulcera, plura, in varia parte corporis enata, refractaria lippitudo: aut solitaria enata post sublationem prioris.

GANGRAENA. (Post phlegmasiae topicae signa, et denegatam resolutionem benignam, aut suppurationem) passione laborantis, partis functio perit, pars adfecta frigescit, mollescit, flaccescit, et digiti impressi vestigium, phlegmatiae instar, retinet, anodynia, paralysis, color e natiuo, vel phlogistico, vel hydropico, in atrorubrum vel pallidum, dein liuidum, griseum, nigricantem tandem, transit, epidermis a cute secedit, squammas, vel vesiculas formans, prodeunte ichore subrubicundo, pallide flauo, ac tandem atro, aut liuido, carnes pastaceae, putrida, foetidissima, cadauerosa dissolutio. Simul in vniuerso corpore: horror frequens, summa debilitas, in motibus vitalibus et voluntariis conspicua, putor cadauerosus, sudorem, urinam, et deiectiones inficiens, subsultus tendinum, convulsiones, extrema frigida, latice glutinoso perfusa.

N. SPHA.

^f) Species et varietates a varia sede v. sub. m. anon.

N. SPHACELVS dicitur, quum in tali parte omnis sensus et motus periit, foetorque cadauerosus adest.

Gangraena et *humida* illa vocatur.

NECROSIS. *Gangraena sicca*. QUESNAY. Post partis dolorem, stupor, sensus et motus amissus in parte, citra causam externam, vel gangraenam alias arcessentem internam, color nativus in lividum, plumbeum, nigricantem mutatur, torosa corrugatur, mollis, calida, inodora, siccescit, frigescit, et plerumque foetet, dein supervenit suppuratio gangraenosa, laudabilis, quae emortuum a viuo separet, salvo aegro. Potissimum extrema occupat.

VVLNVS. Continui solutio recens, hians, a causa mechanica, plerumque cruentata, phlegmasia.

MACIES. MARCOR. MARASMVS. Corporis totius consumptio, debilitas, gryposis, oculi pellucidiores, urina tenuis, sedimentosa, furfuracea, musculorum evanescencia.

a. TABES. Marasmus cum pyrexia, febris, lenta, habituali.

b. ATROPHIA. Marasmus apyretos.

c. ARIDVRA. Macies topica g).

MORTIS mentio iniicienda, quae est sublatum virium, homini propriarum, commercium. Pulsus nullus, apnoea, vasculis pectori adpositis agnita, oculorum obscuratio, tunica cornea, pituita alba suffusa, maculae cutis sublividae in ea parte, qua iacet corpus, omnium, stimulorum, feramentorum, cauteriorum, ignis, frictionum, irrita applicatio, foetor mephiticus, rel. h).

Et sic quidem propositae sunt passionēs, quibus adiacere mentionem de earum symptomatibus praecurrentibus atque exitu ideo fere dubitavi, quod in uniuersum vix liceat in

patho-

g) a, coxae. Atrophia ischiadica COTUNNI §. 7.

h) Differunt signa secundum mortis genera, ut alia sint mortis senilis, alia morbosae, dicta, se-

cundum varios morbos praegressos, alia violentae, subitaneae, lentae, quare cf. GRUNERI Sem. §. 925. sq. — Secundum causas est paralyticis, cerebri, cordis, pulmonum.

pathologia, tam generali, quam speciali, certa de illis proferre, quoniam illa tum a morbo, tum ab impetu, aliisque passionibus adiunctis vere pendent. Pari quoque de causa aetiologiam pathologicam sperni, siquidem absque noua, sollicita, diuturna, et demum forte irrita, obseruatione non licet causas passionum veras inuenire, vulgo enim venditae respectum ad morbos habent, male neglectum, vt mirari nequeas, tantam, eamque vagam, apud auctores multos celebrari causarum farraginem.

Atque in eo quoque ratio continetur, quod pathologiae methodum anatomicam seruarem. Scilicet absque aetiologia pathologica genuina affinitas passionum dari nequit, vnde fit, vt ob affinitatem causarum aliis aliam visam, aut ob affinitatem passionum ipsarum, secundum phaenomena, aliis aliam adparentem, systemata pathologica (nosologica) varia eruerent auctores. Quare, si tua interesse putes, ad SAUVAGESIUM, VOGELIUM, LINNEUM, MACBRIDIUM, Cl. CVLLENVM, SAGAR, confugas, aut ipse affinitatem aestimes et nouam condas doctrinam.

N O S O L O G I A.

Omnes morbos sic considerare oportet, vnde cuique natura sit. Et, si sic consideraues ac deprehenderis principium morborum, minime aberraueris.

HIPPOCR. *de adfect.* n. 27.

Medici est, ad vnumquemque morbum inuenire remedia. Quale autem est principium viae, quae illuc ducit? Morbi cognitio.

GALEN. *meth. med.* L. 2, C. 7.



NEVROSIS.

NEVROSIS, *morbis sine materie Auēt.*, morbus est, solidis praecipue infestus, hinc labe potissimum systematis nervosi et irritabilis conspicuus, stipatus epigenematibus, saepe nec causis manifestis, nec rationi inter se mutuae, respondentibus, auctus ab euacuantibus, maxime validis et corrigentibus, qui per se ad pepasmon proclivis non sit, neruinis, roborantibus, vario titulo insignitis, alleviatus, superandus.

Insignis itaque potissimum est debilitate motuum voluntariorum, eorumque ortu inordinato, debilitate sensuum et intellectus, aut iisdem citra rationem adauctis, pulsibus et respiratione debilibus, propensione ad eclipsin, signis spasmi, atoniae, euacuationibus varie abnormibus ^a). 2

CAVSSAE.

Formalis est debilitas systematis nervosi et irritabilis particularis.

Remotae sunt multiplices, vita, a parentibus debilioribus adeptas, aetas infantilis, senilis, sexus sequior, vita iners, otiosa, sedentaria, abusus pathematum, exercitii defatigantis, victus, veneris, vigiliarum; morbi praegressi, maxime sepsis, saburra, lithiasis, praesertim excitantes passionibus, nervoso vigori, irritabilitati, directe, indirecteue infestas, nimiaeque euacuationes, contagium.

ENERGIA.

Rara per pepsin, et lenta, lysis, adiuta tamen frequentior, quam pepasmos, qui maxime fit per diaphoresin.

CVRA-

a) Cf. GLASS. Comm. de Febr. VII. p. 107.

NEVROSIS.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Vigor neruofus excitandus , restaurandus per fugam cauffarum et neruina congrua.
2. Respiciendum ad morbum praegreffum , aut comitatum , non raro laruaturn , cui occurrendum.
3. Energia adiuuanda , excretiones moderandae.

SPECIES.

I. ERETHISMVS. SENSIBILITAS b).

Magna et praeternaturalis fenfilitas et irritabilitas, definita per characterem neurosis, epigenemata mox dicenda, paſſiones potiſſimum neruoſas, cauſſas, mox ſtabilien- das, et leuamen a curatione, modo propoſita, cum aegroti animi abiectiōe, periculo autem facile plerisque diſſimula- to. Decurſus contra coctiōis leges eueniens, vt praeter rationem ſigna coctiōis apparentis mox, euanitura, con- tingant.

EPIGENEMATA.

Paſſiones neruoſae iam ab ortu conſpicuae, eclipſis, propenſio in ſyncopen a ſitu erecto, motu leuiſſimo, deli- rium mite, taciturnum, gelafinus, lingua albida, ſitis et calor mediocres, propenſio in euacuationes largas, facile citra conſcientiam emiſſas, atque exanthemata. Vrina, pulſus, reſpiratio, fere naturales , vt tamen de- biliores pulſus exiſtant.

CAVSSAE.

Contagium , conſtitutio epidemica, ſeminium aëreum, ſep- ſis, etiam bilioſa, ſaburra, aut praegreſſae, aut co- mitatae, accidentes corpori debili, molli, vel diutius perſiſtentes, vel male tractati, vel deſignati, vel lar- uati ſint morbi dicti.

ENER-

b) Morbi maligni auct. Febres atactae SELLE. Gen. 2.

NEVROSIS.

ENERGIA.

Rara, nisi adiuuetur communi, supra stabilita,

CVRATIONE.

N. Neutiquam in me suscipiam, componere clar. Vir. in definienda malignitate dissensum. Forte autem duplex statui potest. *Actiua*, dicta, et *passiua* mox dicenda, sub torporis aut eclipsis nomine. Vtraque vere plus minus alteri morbo debetur, vel praegresso, vel comitato, interdum laruatis, vt malignitas omnino ambigua vox sit, quum gradu tantum differat a reliquis morbis, alienatum potissimum systema neruofum et irritabile supponens.

II. ECLIPSIS. TORPOR ^c).

Neurosis, lenta dicta, sensilitate et irritabilitate, imminutis, conspicua. Stupiditas, stupor, animi, ingenii, eclipsis, calor mediocris, sitis nulla, lingua arida, aspera, tremula, pulsatio circa praecordia, vel vmbilicum, alysinus, respiratio tarda, laboriosa, signa spasmi, dysphagia sine obice in gutture, vomituritiones, vomitus, aeruginosi, non leuantes, saepe cum syncope, oculi fixi, fulgentes, illacrimantes, tinnitus, cophosis, dolores artuum, pyrexia passiua, erronea, paraphrenitis, energia otiosa: nulla aegroti de suo statu desperatio. Pulsus debiliores, saepe parum abnormes.

CAVSSAE.

Communes, cum priori.

ENERGIA.

Otiosa, raro facile adiuuanda, quum nec morbus comitatus facile detegatur, nec tuto sibi satis fieri per torporem liceat.

CVRATIO.

Communis, dicta.

M 2

N. Vide-

c) Febres atactae SELLE. Gen. 1. & 3. huc.

NEVROSIS.

N. Videtur tum erethismus, tum torpor, esse progenies sympathiae potissimum externae, licet interna, vt necesse fere est, simul agat. Internae autem potissimum debentur species 4. et 5., mox dicendae: sequens languor utrique, tum externae, tum internae, communis esse videtur.

III. LANGVOR. ANAEMIA.

Neurosis, plerumque secundaria, vel per morbum varium, vel eius passiones, inopiam humorum inducentes.

EPIGENEMATA.

Communia: praeterea habitus strigosus, cutis arida, macilenta, imo marcida, facies lurida, epithelio tecta pallidissima, genae pendulae, oculi excauati, amblytes, syrigismus pertinax, lingua albicans, pallida, diarrhoea, diabetes, ephidrosis, non raro alternantes, morbum augentes, phlegmatia pedum, subinde hydrothorax, agrypnia, suspiria, athymia, moeror, timor mortis, quam venientem non expectant, vrina pallida, venae abditae, pulsus exiles, vacui, debiles, tamen subduri aliquando. Leuamen ab eupeptis, grate et leniter roborantibus, motu mediocri, si licet, frictionibus.

CAVSSAE.

Morbi, eorumque passiones, humorum inopiam, euacuatione larga, inducentes, aut (in illis) abusus phlebotomiae, drasticonum, diureticorum, diaphoreticorum, veneris, rel., maxime in debilibus, hanc inducunt.

ENERGIA.

Rara, adiuuanda per

CVRATIONEM,

Potissimum communem, moderando maxime passiones, humores ultra exhaustientes, victuque eupepto, reficiente, non commouente, diaeta lactea, gelatinis, ovis forbilibus,

NEVROSIS.

libus, offis, ex carnibus iuniorum animalium, leniter roborantibus, motu congruo, frictionibus, energiam excitando.

III. IRRITABILITAS. CONTRACTILITAS.

Neurosis, plerumque chronica, seu longa et tarda et periculi plerumque expers.

Epigenemata communia, maxime frequentes hysteria et hypochondriasis, vt ab his fere nomen accipiant passiones pleraeque.

CAVSSAE.

Communes, potissimum temperamentum debile, tenerum, irritabile, hystericum, dictum, vita casta puberum, in sequiori aetas potissimum vltra annos 40.

ENERGIA.

In aetate iuuenili per haemorrhagias, diarrhoeam.

CVRATIO.

Communis.

V. PERIODVS. *Morbi periodici, febricofi Auct.*

Neurosis periodica, typica, accessio, febrili intermittenti perquam similis, insidiosa, saepe alium morbum, saburram, sepsin, simulans, coctionem sponte non subiens, sed adiuuanda roborantibus, anodynis, larga saepe manu offendendis, neglectis indicationibus morbi simulati.

ENERGIA.

Otiosa; non raro inopinato mors ad 2. 3. insultam.

CVRATIO.

Dicta communis.

N. Fateor, characterem morbi periodici aegre definiri. Sed proprie videtur esse neurosis sp. 1. 2. 3. 4. periodica. Sed quomodo discerni potest passio neruosa periodica, a pe-
rio-

NEVROSIS.

riodica alius morbi? Num sufficit has passiones febricofas, intermittentes dixisse, alius morbi passiones similes, periodicas, aut contra? Num sufficit statuere, vel morbum vere abesse, vel tantum cessare? Cephalalgia periodica haemorrhoidalis vult haemorrhoidis prouocationem, haemorrhoids periodica est; num morbus cessat, an abest, dum illa non comparet? Passiones neruofas periodicas dicunt facere insultus, intermittentibus perquam similes. At abest saepe hic character, v. c. vrina lateritia in apyrexia, aut extra paroxysmum.

Igitur si quid video, num passio, quae periodica est, ad neurosin, an ad alium morbum pertineat, debet colligi ex praesentia, aut absentia, signorum morborum reliquorum, aut neurosis.

Fateor quoque, ob auctorum in his negligentiam, me vix euitare potuisse, quominus exempla passionis periodicae neruofae enarrarem, quae ad alium forte morbum pertinuissent, quod condones, velim.

SEPSIS.

SEPSIS est morbus aduentitiuus, insidiosus, periculosus, labeilis ea, vt facile corporis destructio fiat, potissimum conspicuus, vt plurimum breuis, et celer, sporadicus, facile epidemicus et contagiosus, omnis aetatis, sexus, et vitae generis, homines adoriens.

EPIGENEMATA.

Virium prostratio iam ab initio magna, oculorum splendor imminutus, oculi, dentes, labia, sordibus tecta; anima ante passum foetida, lingua mane sordida, dein alba, postea fusca, liuida, nigra, tumida, arida, sapor aduersus, quasi a rebus putridis, fauces squalidae: dolores vagi; spasmus species in cardia, vel anxietates praecordiorum, nisi vomitus,

SEPSIS.

vomitibus, vel diarrhoea, sufficientes, ceterum symptomaticae, comparuerint; animi abiectio notabilis, dolores capitis, et lumborum frigus; pulsus, initio et vigore, celeres, parui, subduri, postea obscuri, inaequales: decubitus in dorsum, interdum abdomen, ut aegri e mutato in hunc facile reuertant: albi oculorum rubor, et quasi inflammatio, genae rosaeae, constantes in facie tristi, inflata, deiectiones et excretiones acres, foetidae, cito admodum putrescentes: vrina rubra, crassa, lurida, vappida, subnigra, et olida, aut nullum sedimentum, aut furfurosa, inaequaliter sparsa, continens; aluus nigra, foetidissima; ephidrosis oleosa, foetida, colliquatiua, non leuans; sitis magna et intolerabilis; haemorrhagiae, sine impetu humorum aucto, contingentes; exanthemata symptomatica, raro critica: sanguis missus floridus, interdum foetidus et saniosus, laxiori et molliori contextu, corium cum crassamento minus cohaerens, serum magis flauum, aut rubicundum, interdum cuticula viridescente, aut coloribus arquatis micanti, obiectus.

CAVSSAE.

Formalis est dyscrasia bilis.

Remotae sunt, quae vires nervosas infringunt, solidorum laxitas, debilitas nervosi systematis, et quae polycholiam et bilis dyscrasiam efficiunt, ut omnia ea, quae bilem excernendam retinent, aut omnino augent; hinc animi affectus, maxime ira, tristitia, timor, terror, transpiratio, excretio bilis, eiusque secretio, cohibitae, metus, tristitia; haustus effluuiorum, aëris mephitici, putridis effluuiis repleti, praetereaue forte non renouati, calidi, humidi, potus subputridorum, facile putrescentium, aut liquorum spirituosorum, aut frigidorum, aestuante corpore epotorum; abusus ciborum ex regno potissimum animali, imprimis subputridorum, oleosorum, ex fructibus horaeis, melones,

SEPSIS.

lones, brassicae, aliaque vegetabilia corrupta; euacuanti-
tia, vesicatoria, alexipharinaca, morbo saepe aduersa, sca-
bies repulsa, contagium, rel.

ENERGIA.

Post coctionem ephidrosis, diarrhoea. Coctionem adiuuant
emesis, catharsis.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Dyscrasiae succi bilarii, eiusque abundantiae, obuiam
eundum.
2. Cauendum, ne transeat in neurosin.
3. Excretiones symptomaticae ante coctionem impedian-
t.
4. Energia et pepasmos adiuuentur.

SPECIES ET VARIETATES.

I. SEPSIS SIMPLEX ^{d)}.

EPIGENEMATA

Sepseos, calor tactui mordax (non tantus, vt de eo con-
querantur aegri, digitis autem diutius tangentibus mole-
stus, quibus videatur sensim acrior et viuidior e profundo
veluti exfurgere, vt digiti quasi aciculis pungantur) leua-
men ab emesi, catharsi, minus tamen, quam in biliosa:
iuuamen ab acidis, alumine, cortice, camphora, vino,
epispasticis ex armoracia, sinapismis.

CAVSSAE.

Communes. *Formalis* est dyscrasia bilis, laedens potissimum
per sympathiam externam: causae, inflammatione simplici
maiores, BOERHAAVII ^{e)}, vbi inflammatio vera neglecta, et
regimine exaestuante ad maiorem vehementiam euecta est.

ENERGIA.

Pepsis. *Pepasmos* per diaphoresin post coctionem.

CVRA-

d) Febres continentes SELLE. Gen. 2. e) §. 84. 190. 689.

SEPSIS.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Plethorae concurrentis, aut excitandae energiae causa, in homine sanguine non paucò repleto, phlebotomia instituitur.
 2. Emeticum propinetur, ut abundantia succi bilarii imminuatur et praeuertatur catharsis spontanea symptomatice.
 3. Imò et catharticum succedat, et alius per totum morbum seruetur aperta, eluatur putridum, enemate calido.
 4. Fugiantur causae, hisque contraria fiant, hinc victus e carnibus per totum morbum fugiatur, fructus horaei maturi et acida propinentur: potus frigidus praebetur, aegerque ante coctionem interdum sedeat erectus in sella.
 5. Ephidrosis et diarrhoea, ante coctionem malae, acidis mineralibus caueantur.
 6. Spontanea et mediocris sudatio nocturna post coctionem comparens, leuans, sustineatur.
 7. Energia, si opus est, excitetur epispasticis, ubi pulsus languet, nec fauces admodum siccae sunt, post coctionem, cortice Peruv., vino, diaphoreticis, moscho, phosphoro, rel.
 8. Recidiva caueatur.
- II. SEPSIS BILIOSA ^{f)}).

EPIGENEMATA

Sepseos et saburrae, calor acrior, quam in simplici, leuamen ab emesi, catharsi, maius. Crassamentum tenue, resolutum.

CAVSSAE.

Communes. *Formalis* est dyscrasia bilis, in primis laedens per sympathiam internam.

ENER.

f) Febres remittentes gastricae SELLE. Gen. 2.

SEPSIS BILIOSA.

ENERGIA.

Pepasmos per emesin et catharsin praecipue.

CVRATIO.

Indicationes.

Communes: maxime vero emesis et catharsis, repetitae conducunt: ut tamen emeticis praemittas inuoluentia et lenientia, ubi acrimonia summa est, et in spasmodicis abdominalibus grauioribus, omne emeticum in purgans conuertentibus cum malo euentu g), regioni epigastricae prius vesicatorium adplices, quod et locum habet in inflammationibus occultis iam natis, cum discutientibus aliis.

A. SEPSIS BILIOSA PITUITOSA h).

EPIGENEMATA

Sepseos biliosae: lingua, glutinosa alba substantia, quasi lardo, obducta, quae et os et fauces non raro obducit; pulsus debilis, intermittens; febris lenta; urina tenuis, limpida; cruor dissolutus, glutinosa crusta obiectus, ex lamellis, ferum continentibus, constans, nec flammam facile concipiens.

CAVSSAE.

Communes.

Remotae: constitutio aëris frigida et humida, alimentorum nopia, atque inedia, mala atque insana diaeta, et sordidum vitae regimen.

ENERGIA.

Communis.

CVRATIO.

Indicationes communes cum iis in sepsi biliosa.

B. SEPSIS BILIOSA VERMINOSA i).

EPIGENEMATA

Sepseos biliosae et saburrae verminosae. Pulsus arteriarum nunc duri et celeres, nunc irregulares, inter-

g) WIENHOLT. d. de inflammat. occ. p. 27. n. i.

h) Febres remittentes gastricae

SELLE. Gen. 3. Epidemia, a SARCONE, v. Cel., descripta.

i) Febris verminosa SELLE. Gen. 2.

SEPSIS BILIOSA VERMINOSA.

mittentes, vacillantes, vel debiles. Lingua, primis diebus sanae similis, versum apicem ut plurimum contracta, iisque breui arida, fissa, crusta fusca obuelata, nigrescens paulatim, tandem in rimas fulcata, sudores circa collum. Vrina, initio naturalis et sanae similis, citrei coloris, in plerisque manet tenuis, aut cum enaeoremate suspenso, paucis vrina saturata prodit, quae tarde sedimentum deponit, expulsiis vero lumbricis et magmate putrido, quibusdam hypostatica, indolis mucosae, sensim albescente sedimento, et ex crudo in coctum mutato. Ut plurimum vermes prodeunt, nisi febris subsit, ubi putridum magna eiicitur potius, quam plures numero vermes ^{k)}, nisi vero sub criseos actu prodeant, recidiua pessima ^{l)}.

CAVSSAE.

Communes septeos et saburrae verminosae, maxime tempestas perhumida et pluuiosa: constitutio epidemica.

ENERGIA.

Per excretionem vermium sub actu criseos.

CURATIO.

Indicationes communes.

SABVRRRA.

SABVRRRA (*primarium viarum auct.* ^{m)}) est morbus, congenitus, aduentitius, ut plurimum brevis et celer, raro periculofus, digestionem laesa potissimum conspicuus.

EPIGENEMATA.

Lingua squalida, plus minus flaua; flauo virescente humore obducta, prominentibus quasi villis, flaua viridique materia tinctis, hirsuta; os amarum, sapor putridus, pituitosus, iners, acidus,

k) v. d. BOSCH p. 56.

l) Idem l. c. p. 66.

m) Cf. Introd. p. 14.

SABURRA.

acidus, acidissimus, austero-acidus, fauces exurens, acidum quasi vitriolicum spirans, dentes stupefaciens, quin et nauseose dulcis: dentes sordidi: vomitus biliosi, iique materiae viridis, aeruginosae, vitellinae, porraceae, cruentae et nigrae, pituitosi; anorexia, cardialgia; facies praerubra, quasi minio picta, tamen ad oris labiorum commissuram, et narium pinnas ruborem excipit pallor, ex flauo virescens; simul splendor oculorum, quasi lacrimis innatantium; vrina iumentorum; sanguis, crusta phlogistica, ex flauo leuiter virescenti, tectus; serum magis flauescens. Aliquando, et potissimum in pyrexiiis, nullum fere horum signorum adest, sola diarrhoea, facies praerubra et oculi scintillantes, tremor labii inferioris, pulsus celeriores, molles, — aut tantum vrinae parca copia frequenter missae, profunde flauae, principio statim deponentes; leuamen vero ab emeto - catharticis, augmentum a phlebotomiis, rel. morbum produnt ⁿ⁾).

DIFFERENTIAE.

A. *Materiae supra*, seu circa ventriculum, turgentis, signa sunt: corporis totius lassitudo, impotentia subita, horrores, lingua sordibus obfusa, os amarum, cibi fastidium, oris ventriculi morfus, praecordiorum molestiae et tumores, facile digitis cedentes, seu hypochondria turgida, pectoris angustiae et oppressio, dolor ventriculi et lateris sub septo transuerso et infra costas haerens, sed absque praecordiorum inflammatione, extremorum frigus, capitis totius grauitates et dolores, vertigo, oculorum caligines, mentis marcor, animi abiectio, inquietudo, anxietas, iactationes.

B. *Materiae, infra* (praecordia,) seu intra intestina turgentis, signa sunt: genuum grauitas, lumbago, ventris distentiones, murmura, tormina, alui egestionem liquidam, sinceram, corruptam et acres ^{o)}.

N. Huc

ⁿ⁾ Cf. STOLL I. 35. 47.

^{o)} Cf. GLASS. Comm. VII. p. 75.

SABURRA.

N. Huc morbus et passiones *biliosi auctorum*: morbus ab acido, nidoroso, rel. Saburra enim, collecta in viis primis, varia statuitur, et potissimum ob amaritiam, vomitus materiae flavae, bili tribuitur, tanta vero non raro copia adest, ut bili tribui nequeat, quae praeterea potius sepsin biliosam efficit p).

CAVSSAE.

Formalis, irritabilitas et debilitas humorem gastricum, entericum, fecernentium, eiusdemque largior secretio et mora.

Remotae: dyspepsia, masticatio neglecta, euacuatio meconii, faecum aluinarum, tarda, constitutio epidemica, ver et aestas, ira, potissimum aestate, moeror, metus, nimia ciborum, potissimum e regno animali, sub digestionem tardiori, ingurgitatio, rel.

N. „Aestate bilis dominatur, feruidiore meraca, mobilissima, frigidior humidiorque pituitosa et inertior. — Id discriminis inter morbos biliosos veris et adultae aestatis observatur, quod illi saepe phlogistici quid sibi iunctum habeant, aut excussis licet sordibus in inflammatorios migrent, rarius in malignos, hi vero, quos aestas et autumnus gignit, septici quid malignique ferant, aut in malignos facillime mutantur. Maior etiam est materiae mobilitas fluiditasque vere, quam autumno q).

2. „Difficile saepe est, iudicare, num ex ventriculo, aut cerebro nausea, dum plethora cerebri sordes ventriculi saepe mentiatur r).

ENERGIA.

Plerumque per pepasum, per emesin, catharsin.

CVRA.

p) Cf. Cel. STOLL. R. M. T. I. p. 30. et de HAEN. pr. p. T. II. p. 256.

q) STOLL. R. M. I. 33.
r) TISSOT, ep. de var. apopl. p. 118.

SABURRA.

CURATIO.

Indicationes.

1. Plethorae, si adest, primum satisfiat.
2. Materia mobilis, turgens in ventriculo, emetico-cathartico educatur, quousque saburra vera latet, nisi quid contraindicet.
3. Succedat, aut eius n. 2. vices subeat catharsis, vbi turgēt in intestinis, aut emesis vetatur.
4. Fugiantur causae, et euacuatione sufficienti instituta, ventriculus et intestina roborentur.
5. Materia tenax, non mobilis, moueatur potu multo, diluente, resolvente, salinis, aliisque resoluentibus.
6. Saburra acida, praeter dicta admittit praeterea acidum absorbentia, terrea, carnes animalium, maxime auium rapacium, vegetabilia non facile acescentia, roborantia, amara, martialia.

N. Non semper linguam foetidam esse, licet ventriculus saburra abundet, nec tamdiu emetica exhibenda esse, quamdiu adhuc eadem foetida est, aliaque signa saburrae adsunt, quae a succis gastricis, largius confluentibus, ceterum sanis, essent, egregie docet STOLL^{s)}.

SPECIES ET VARIETATES.

- I. CATARRHEVMA BILIOSVM. Morbus mucosus WAGLERI. Signa saburrae et catarrheumatis.

CAVSSAE.

Communes. *Remotae*, quae transpirationem supprimunt, et humores ad abdomen inuitant; praeterea habitus valedudinarius, praesertim abdominis debilitas, constitutio epidemica, tempestas humida, victus asper, obstruens, panis defectus, carnes corruptae, defectus victus vegetabilis, aqua impura, potus spirituosus, exhalationes mephiticae, animi adfectus, rel.

ENER-

s) L. c. l. p. 343. et 348.

SABURRA. CAT. BIL.

ENERGIA.

Crisis per emesin, diarrhoeam, icterum.

CVRATIO.

Indicationes. Communes euacuantia.N. In catarrheumate inquiras, an proprie huc? ^{t)}.

- II. SABURRA VERMINOSA ^{u)} est morbus, designatus per signa saburrae et vermium intestinalium: quorsum corpus debile, oculi concaui, lacrimosi, renitentes cum pupillae maiori dilatatione et nigredine, hypophthalmia, et albi liuor, vertigo; rhinocresinus, haemorrhagia; alterutrius genae phlogosis; odor oris proprius, acido-putridus, vappidus; prisis, ad frontem, circa oculos, supra orbitas, ad nasi radicem, ad tempora, dolor; sensus titillationis quasi vermis ad oesophagum, thymos, anorexia, bulimia; respiratio varie laesa, mutitas; cordis motus inordinatus, febris, cum pulsu non raro inaequali, paruo, intermittente; dolor vagus nunc lateris, nunc ventris, spasticus, acerbus; aluus, praecipue noctu, sed inconstanter, laxa, mucida, frustillatim missa, ramentosa, leuans, grisea, dysenteriodes, tenesinodes; urinae limpidae, turbidae, iumentaceae; sudores subfrigidi, subacidi, mucosi, rigores incompositi, vagi: aliaque pathemata varia; et vermium excretio, in febris vero potius deiectiones mucosae, cum physconia, atrophia.

Vermes intestinorum sunt *lumbricus*, *taenia* seu *lumbricus latus*, *ascaris lumbricoides*, eiusque species, *vermicularis*, *lumbricoides*, *trichuria*, *sesquipedalis* L., *gordius*, *trichuris*.

Ex his *taenia* maxime se prodit: cardialgia, bulimia, vacuo stomacho, frequentiori et maiori: *excretionem cœcumbiti-*

^{t)} Cf. RAHN d. de cons. §. 19.
LORRY tr. de m. cut. p. 197.

^{u)} MORG. XXXIV. 26. 37. AG.
Succ. vol. 21. p. 150. Co. Li. XI. 203.

SABYRRA. VERM.

bitinorum cum pruritu podicis, ptyalifmo, lingua arida, crusta fusca obuelata, saepe aphthosa, anxietate; in abdomine dicunt aegroti se sentire fuctum, et peristalticum motum auctum (aut taeniae ipsius motus) in latere ponderis sensus; adfectibus, in primis exeunte luna et initio nouilunii, M. Septembri et Octobri accedentibus, praefertim in locis, ubi pisces abundant: esu carnis salitae, vel fumigatae, pernae, brassicae, armoracei, allii, sacchari, assa foetida, sem. cinae, fl. sulphuris, vino acido, auctis x).

Ascaris vero *lumbricoides* infert maxime tormina, praecipue circa umbilicum, et subinde subsultus intra abdomen.

Ascaris vulgaris, colon et rectum potissimum, sed et alia intestina, imo ventriculum occupans, praecipue proctalgiam, aut dysuriam, imo leucorrhoeam, languorem, stuporem, producit.

Lumbricus infert tormina, ad umbilicum, praecipue luna crescente et cessante.

Gordius infert rhinocresmon, maxime vesperi, ptyalifmum, vomitum inopinatum, noctu somnum inquietum, sudores, conuulsiones, hepatalgiam, splenalgiam, borborygmos, cardialgiam, phlogosin faciei, inprimis. in latere sinistro: anxietatem, morositatem, animi abiectionem, lassitudinem, ventriculi tumorem, tensionem, *vomitum phlegmaticum*, plerumque post alui depositionem y).

CAVSSAE.

Communes, praetereaue debilitas, maxime abdominis, tempestas humida, frigida, vnde et epidemica constitutio, vitus obstruens, abundantiam muci generans, praefertim inprimis viis, abusus piscium, vermibus abundantium, rel.

ENERGIA.

Per pepasimum, emesi, catharsi, diuresi.

CV-

x) Taenia non semper solitaria, sed cum lumbricis etiam. Journ. de med. m. Juill. 1769. p. 222. y) TRICHVRIS (WAGLER p. 41.) in coeco reperitur, semper in crassis.

SAEVERRA. VERM.

Indicationes. Communes, imprimis:

1. Vermium nidus destruat.
2. Vermes necentur.
3. Euacuentur congruo loco, emesi, vel catharsi.
4. Passionibus grauioribus occurratur.

N. „Vermes in h. c. frequentiore esse morborum cum acutorum, tum lentorum, causam, quam vulgo creditur: ita, vt per saepe contingat, in cura morborum medicum tamdiu inutilem, damnosumque aegrotantibus esse, donec vel ipse, vel qui ipsi suffectus fuerit, infortunio prioris sapiens, anthelminticam curam admoueat, aegrumque sanet. „ de HAEN ^z).

PLETHORA.

PLETHORA est morbus, raro congenitus, plerumque aduentitius, designatus per temperamentum sublaxum, sanguineum, faciem turgidam, rubram, aliasque partes, epithelio testas, ruberrimas, aestum et grauitatem totius corporis, lassitudinem spontaneam, stuporem artuum, respirandi difficultatem; pulsus fortes, plenos, aut suppressos, subduros, somnum turbatum, linguam albam cum papillis emicantibus, ophthalmiam crebram, vertiginem, tinnitum, cephalalgiam, carebariam, irritabilitatem maiorem, facile conquiescentem, vrinam flammeam, nec ante coctionem post refrigerium turbidam: comparentia praecipue sub praegressis, copiosa esculentorum eupeptorum, vi digestiua fortiore auxiliatrice, ingurgitatione, catameniorum, haemorrhoidum, epistaxeos, consuetae sanguinis euacuationis artificialis, perspirationis, rel. suppressione, et tempore his consueto, adiuuante praeterea tempestate et regione sicca, serena, frigida, aëreque leui: augmentum praeterea ab epulis, somnolentia, ignauia, pastu,

z) R. M. XIV. 173.

N

PLETHORA.

stu, commouentibus, roborantibus, antisepticis, maxime acidis mineralibus; leuamen e contrario a haemorrhagiis, naturali et artificiali, et pulsuum obscurorum, depressorum, rarorum, intermittentium, per phlebotomiam, vel paruam modo, vel repetitam, mutationem in elatos, magnos, frequentiores, velociores, fortiores, succedentibus, ephidrosi alleuiante, aliisque, huc usque plus minus suppressis, excretionibus, et conditionibus, liberiores secretiones designantibus.

CAVSSAE.

Formalis, humorum, praecipue cruoris, abundantia.

Remotae: plurimae supra iam dictae, praetereaque in nuper nato sanguis copiose aduectus, tardiusque ad matrem, maxime sub tardo partu, ductus, nec per haemorrhagiam umbilicalem imminutus; in adulto vita sedentaria, somnus multus, cet.

ENERGIA.

Soluitur per pepsin sub congrua diaeta, causis contraria, vel per pepasmon idque vel perfecte, dum criticae euacuationes, maxime haemorrhagiae, contingunt, vel imperfecte, dum singularis dispositio ad haemorrhagias remanet, ut non raro periodicae fiant.

Atque in hoc praecipue morbo crises veterum attendendae, ubi horrores, cum subsequente calore, pepasmon denunciant, supra dicta ratione.

Critice quoque morbus transit in pyogeniam, morbum mox dicendum, ita, ut non raro alterum quasi stadium sit pyogenia, quasi coctionis, saepe non vituperandae.

CURATIO.

Indicationes.

1. Fugiendae causae.
2. Pepsis adiuvanda per haemorrhagiam artificialem, pro conditionibus repetendam, et diaetam congruam.

3. Quod

PLETHORA.

3. Quod nisi licet, pepasmos adiuuandus, vel perfectus, praegressa non raro feliciter haemorrhagia artificiali, per haemorrhagiae spontaneae congruum moderamen, vel imperfectus tolerandus, nisi perfectus obtineri potest, et congrue moderandus.
4. Transitus in pyogeniam, nisi cum bonis aegroti rebus caueri potest, sic dirigendus, ut morbus iubet nouus.

SPECIES ET VARIETATES.

I. VERA. Sanguinis abundantia absoluta. Leuamen certum ab eius imminutione.

A. Polyaimia. Constitutio robusta, abundantia laudabilem humorum, morbi signa suppeditans.

1. *Lactea* ^{a)}. A partu, et prope partum, abundat lacteus humor, nisi per suctionem imminuatur, ut signa humoris lactei in corpore euanescent. Paucae passiones excitat, in pathol. spec. dictas. Lacteas enim metastases ad catarrheuma relego, quorum verius pertinent.

B. *Caelibatus*.

a. *Viri*. Signa morbi, polyaimiae, magisque obesae plethorae, hypochondriasis, febricula nocturna, intertrigo, haemorrhoids, oscheoceles spermatica, exoneurosis, gonorrhoea benigna, pustulae caelibatus dictae.

b. *In feminis* ^{b)}. Tumor glandularum, dolor vrens, titillatione digiti exploratoris humor foetidus excernitur (in mare concumbente excitat gonorrhoeam benignam, effluxum humoris viridescens, acris, phimosis), pustulae caelibatus, intertrigo.

B. Obesa. HEWSON. ^{c)}.

Constitutio robusta, viscerum chylopoetorum vigor, ciborum eupeptorum usus largus: polyaimia, colliquationem pinguedinis modicam, designatam per serum al-

N 2

bescens,

^{a)} LORRY. m. c. 281.

^{b)} HELD. Auszüge, L 251.

^{c)} Abh. f. pract. Aerzte IV. 2. p. 325 sq.

PLETHORA.

bescens, lacteum, inducens, vnde plethorae signa augentur, habitus corporis tumidus, et quasi spongiosus, facie florida, nitidula, elegante, pulsus parui, debiles, et vix detegendi, respiratio sublaboriosa, post motum anghela, animo valde irritabili et facile sedando, frigoris calorisque impatientia magna, excretiones mutabiles, anorexia, vomitus, haemorrhagiae constantiores.

II. SPURIA.

Humorum abundantia relatiua; leuamen ab euacuationibus sanguinis adparens, verum a remotione causarum, spuriam determinantium. Abusus calidorum potuum, sanguinis missionis, et aliarum excretionum, corporis vires, maxime solidorum, prostermentium.

A. Ad vires.

Signa debilitatis solidorum; sanguis missus serofus, vulnera, paralyxis signa.

II. VNIVERSALIS.

Laxitas, teneritudo, morbi signa a leui exercitatione. Leuamen, salus, a roborantibus.

B. PARTICVLARIS. *Congestiones auct.*

Signa roboris partis imminuti, sanguinis detentio in illa parte, vnde signa morbi topici, rubor, tumor, dolor, haemorrhagia in parte adfecta, aut proxima. Leuamen ab adplicatione ad partes alias eorum, quae maiorem in his sanguinis copiam inuitant, reuellentium, et roborantium, morbo conuenientium.

B. Rarefacta. *Incalescens, febrilis, a calore, victu, rel. auct.*

Admissa antea, aut actu praesentia, calorem et impetum circuitus adaugentia. Leuamen a temperantibus, refrigerantibus, sopientibus.

C. Ad vasa.

Amputatio membri maioris facta; rigiditas, collapsus vasorum ex senio.

N. Spu-

PLETHORA.

N. Spuria proprie pertinet tum ad hanc veram, tum ad alios morbos, et hic tantummodo species referuntur, quod soleant; sed in aegrotis morbus quaerendus est verus.

PYOGENIA.

PYOGENIA est morbus, designatus per genesis materiae purulentae, enatae ex lymphâ coagulabili, plerumque mucum, aliquando et adipem, et humorem serosum, biliarium, imo soluta solida, recipiente, et mutatae in humorem, maxime albicantis aut subflavi coloris, proprie inertem, mora vero sponte enata, aut aliunde admixta, acrimonia plus minus acrem et foetidum factum d).

N. Partes tendineae, aponeuroticae, ligamentosae, membranaceae, glandulosae, pus fundunt tenue, gryseum, saepe foetens; in genitalibus materies purulenta singularem foetorem et viridescens quid habet, ex testiculo vicerato pus interdum prodit filamentosum.

I. PRIMARIA.

A. Spontanea (putrida Cl. FABRE.). HEWSON. CVLLEN. SCHMUCKER. PLATNER. QUESNAI. de HAEN. SCHROEDER. BOEHMER. BERLINGHIER. SARCONE. de SAUVAGES. LIEVTAUD. ACREL. Morbus, vbi purulenta materia nascitur in toto corpore. Materia purulenta, pus nutritium BERLINGHIERII, est lymphâ, parum

d) Cf. QUESNAI, in mem. de l'ac. de chir. T. I. p. I. p. 193. sq. de HAEN. R. M. T. 2. c. 2. p. 18. sq. de GORTER. syst. pr. med. I. p. 104. §. 131. HALLERI el. phys. T. I. SCHROEDERI d. de pur. absque praegr. inflamm. gen. Goett. 1766. et d. de febrium putrid. differ. 1768. P. A. BOEHMER d. de gen. mat. pur. absque praeuia infl. H. 1768. PLATNERI suppl. chir. I. p. 36 sq.

RICHTERI bibl. chir. T. I - V. SARCONE l. c. §. 197. CVLLEN pr. med. I. §. 341. F. V. BERLINGHIERI pens. int. a vari Soggetti di Medic. Fisica et chirurg. Lucc. 1778. HEWSON in auserl. Abh. f. pr. Aerzte T. I & IV. de SAUVAGES nosol. I. 167. ACREL chir. Vorf. ed. 2. p. 364. SCHMUCKER, chir. Schr. T. I. p. 309. sq.

PYOGENIA.

rum mutata per inflammabile. Pus spissum, glutinosum, aqua grauius, ostendens strias, quasi albuminis oui coagulati.

II. Occulta. *Apostasis* ^{c)}.

Morbus, vbi pus nascitur citra praegressam passionem topican: exemplum sistunt epiphora spontanea, et abscessus spontanei, a scriptoribus commemorati. Aliquando est sepsis simulata.

B. Designata. Abscessus.

Vbi puris genesis praecedit passio, plerumque phlegmasia, aut vulnus (destructionis partis expers).

a. Idiopathica.

Vbi pus ad eandem partem aduehitur, ad quam referri debet et solet passio praecedens.

a. Sicca.

Vbi nihil humoris in parte, quam occupat passio, depositum est, quod prius resorberi debeat, quam suscipiat materiam purulentam: exemplum sistit peripneumonia.

b. Humida.

Vbi humor, depositus in parte adfecta, immutandus est.

α. Crassa.

Vbi humor, pure crassior, in parte soluendus est prius. Exemplum sistunt pulmonum tubercula, mutata in vomicas.

β. Tenuis.

Vbi humor, pure tenuior, in parte adfecta resorbendus est ante puris depositionem. Exemplum dat variola.

b. Sympathica.

Quando pus haud ad partem adfectam, sed ad aliam allicitur.

I. Me-

c) LIEVTAUD. pr. I. p. 252.

PYOGENIA.

1. *Metastasis* f).

Quando pus, prius ad partem adfectam allatum, cum signis, iter puris a parte adfecta ad eam, in qua deponitur, indicantibus, per cellulofam, ad aliam partem fertur. Exemplum sistunt pneumonia, hepatitis, suppuratoria, natae ex vulnere thoracis, capitis, cum doloribus colli, pectoris, sensu subitanei quasi aquae frigidae descensus.

2. *Metapostasis*.

Quando pus non ad partem adfectam, sed ad aliam, absque signis metastaseos, fertur g).

B. Topica. Apostema (suppuratio purulenta Cl. FABRE).

Vbi pus nascitur in parte adfecta.

A. Simplex. C. MAGATVS. L. SEPTALIVS. BELLOSTIVS. PLATNER h). de HAEN i). LIEVTAUD k).

Vbi pus nascitur coctione lymphae simplici, dum in parte adfecta lymphae ope inflammabilis, non raro pinguedinis, vel largius secretae, vel fusae, mutatur in pus; aut serum ope inflammabilis mutatur in lympham, et haec coquitur in pus nutritium BERLINGHIERI.

a. Collectum in interiori parte, vt in apostemate, vomica.

b. Circa peripheriam partis fusa, vt inter pulmones et pleuram. Exsudatio inflammatoria HUNTERI.

B. Corrosiua l).

Vbi pus natum simplex, nutritium, mora, acrimonia nata, stimulo externo adhibito, erodit solida, cellulofam, vasa, neruos, rel., BERLINGHIERI pus corrosium, *ichor auct.* Pus minus spissum, minus glutinosum, aqua leuius, foetidum, acre,

II. SE-

f) Comm. Lips. XVIII. 460.

g) Cf. pyogen. hepatic. mon.

BERTRANDI.

h) P. d. §. 13.

i) Pr. p. I. 147.

k) Sp. 3. p. 254.

l) LIEVTAUD. Sp. 4.

PYOGENIA.

II. SECUNDARIA.

Pyogenia primaria varia, redolens morbum, cuius vel comes est, vel pedisequa.

α. Inflammatoria, plethorica.

β. Traumatica, varia.

γ. Septica, vires frangens.

δ. Scorbutica.

ε. Syphilitica, rel.

Huc et passiones ab ulceribus, fonticulis, suppressis, quae sunt progenies morbi occulti.

N. Qui indolem vere huc pertinentis humoris sistit, purulentus mihi dicitur, qui hunc modo simulat, alius morbi humor, *puriformis* vocatur.

2. Characteres pyogeniae male definiuntur, tum quod natura purulentae et puriformis materiae, puris, ichorisque tam per se aegre definiri potest, quam rei difficultas occurrit, quod tum species et varietates aut perperam a multis auctoribus negligantur, ut multi topicam solam agnoscant, aut dubitent, vtrum spontanea admittenda sit: tum denique, quod vere huc usque signa deficient. A passionibus enim, morbo praecipue sollemnibus characterem repetendum vix esse, arbitror, quoniam, qui naturam morborum sufficienter perscrutatus est, concedat, oportebit, omni morbo easdem competere, hinc saepe saltim de morbo praesenti dubitandum esset. Alia vero signa vix dantur: hinc primaria hic lex erit, quod phlegmasia huius illiusue morbi saepe soleat praecedere. Hinc si phlegmasia, febris, dolores *adsunt*, alius etiam morbi, pyogenia erit expectanda, quum phlegmasia nec benigne resolvitur, nec tanta est, ut in gangraenam transeat, febris vero permanet, eademque forte decresciente nihil in vrina desidet (interdum enim, quum in vrina purulentum, albumque subsidet, abscessus soluitur) quumque tumor, qui

PYOGENIA.

qui iam erat rotundus profundusque ab initio cum duritie et rubore adolescit, aegerque ipsius grauitatem sentit, et simul fitis et vigiliae crescunt: porro si aeger inhorret incerto tempore, et tumor mollescit, rubor pallescit, albescit, humorque, qui iam tumori inest, digito cedit, atque circumfluens id, quod non premitur, attollit, dolor remittit, grauitas augetur: quodsi altius seu profundius pus latet, vt in cute nil dictorum adpareat, aegrotus forte cum febris punctiones, locique pruritum sentit, et locus, visui patens, subliuidus et subalbidus fit: pulsusque fiunt pleni et molles: quae omnia, si adsunt, maxime pyogeniam topicam designant.

CAVSSAE.

Formalis est lymphae sepsis.

Remotae fere innumerae: proxime, quae aut putredini lymphae fauent, aut solida irritant, torpida reddunt, rel. inflammationes, vulnera, rel.

ENERGIA.

Saluti est pyogenia corpori, remouendo vel morbos alios, vel sui ipsius passiones soluendo per pus bene coctum, quod est, nisi corpus sit cachecticum, hydropicum, (vbi est tenue nimis, aut pallidum) aut senile vel languidum (vbi est crassum, glutinosum, muco simile), nec ficcum nimis (vbi est crassum), nec vasa, ex quibus pus effluit, sunt vel compressa, aut adstricta, vel relaxata, aut resoluta, et iusta loci, in quo pus colligitur, temperies (aestate enim et calore topico crassescit, frigore tenuatur).

CVRATIO.

Indicationes.

1. Tantum modo puris paretur, quantum requiritur.
2. Pus bonae indolis coquatur.
3. Pus, quantum licet, ducatur ad partes ignobiliores.
4. Nobiliores partes ab eius iniuria defendantur.

5. Si

PYOGENIA.

5. Si sponte e corpore exire studet, eius exitus facilitate-
tur, si confert.
 6. Abscessus iam natus, continens pus coctum, aperia-
tur, si metastasis, abscessu magis salubris, exspectari
non potest.
 7. Metastasis exspectetur, promoueatur, quum abscessus
est in loco nobiliori.
 8. Abscessus ita moderetur, vt morbus primarius, aut pas-
sio grauior, superetur, et nimia carnis iactura caueatur.
 9. Abscessus, aut vlcus, purgentur, et restituantur partes
in integrum, aut remanente fistula caueatur, ne mor-
bus ab adfluentibus, aut transeuntibus maxime, humori-
bus reuocetur.
- N. Indicationes pro rei dignitate, vltius euolui hic non
possunt, aliqua tamen addam.
1. In spontanea occulta si abundat materia purulenta, vide-
tur requiri, vt lymphæ reducatur ad cruditatem, quæ ob-
tineri posse videtur acidis et vsu cucumerum crudorum.
 2. In reliquis, febris et phlegmasia, praesentes ita moderari
debent, ne sequatur gangraena, vtque nascatur absces-
sus, facile sanabilis, citra maiorem carnis iacturam.
 3. In partibus glandulosis instans abscessus promouendus
est mollientibus et leniter digerentibus, vt caueatur
scirrhus.
 4. In gangraena, sphacelo, vlcerebus, et vulneribus colli-
sis vexatisque, pyogenia promoueatur.
 5. Phlegmasiae, quæ discuti non possunt, ne tractentur
nimium discutientibus, et reprimentibus, ne pars ni-
mium indurescat, et tantum malum vlcus succedat.
 6. Pus in apostemate, vulnere, caue, reprimas irritantibus,
vt acribus, alcohole, aëre gelido, linamentis frigidis.
Fugias et calorem nimium, puris copiam adaugentem,
et pus facile in ichorem mutantem, partisque exercita-
tionem, maxime in sensibilibus subiectis, partibusque.

CATAR-

CATARRHEVMA.

CATARRHEVMA est morbus, designatus per subiecta debilia, laxa, sensibilia, phlegmatica, senilia, solida mollia, minus elastica: habitum albidiorum, tumidulum, frigidum, submollem, duriusculum, faciem pallidam et tumentem, linguam albam et mollem, salivam insipidam, ducem, dyspepsiam, torporem, circulationem tardiorum, pulsus languidos, raros, paruos, debiles, molles, et respirationem difficiliorem, excretiones aquosas, pituitosas, urinam pallidam, aluum non raro laxam, liquidam, sanguinem serosum, et quum phlogistico analogus est, laxiorem, crustae et cruoris cohaesionem. Leuamen a serum euacuantibus, imminuentibus.

CAVSSAE.

Formalis est abundantia feri, lymphae.

Remotae: suppressio euacuationum solitarum, maxime urinae, diaphoresis, diarrhoeae, vlceris, fonticuli; hinc et nocent mora in locis humidis, frigidis, paludosis, recenter exstructis, balneorum abusus, intempestius aquarum mineralium potus, frigus, transitus subitaneus frigoris in calorem, et contra, ros vespertinum, fumus, ventus, maxime humidus, ingesta mucosa, glutinosa, farinosa, non subacta, et fructus horaei, aquis abundantes, corporis quies, animi, tristitia, cura, studia, aetas puerilis et senilis, quae chylicationem et sanguificationem labefactant.

ENERGIA.

Aliquando per pepsin, saepius per pepasinon, dum vel excretiones serosae supplentes oriuntur, vel labefactatae redintegrantur, aut excitantur congruae, hinc critica maxime, emesis, catharsis, enuresis, diaphoresis, anacatharsis, ptyalismus, excretio per nares, rel.;

CURATIO.

Indicationes.

1. Fugiendae causae, et causae contrariae admittendae: hinc

CATARRHEVMA.

- hinc conducunt habitatio in locis ficcis, alimenta fermentata, aromatibus condita, corporis exercitium, ambulatio, vectio, frictio, suffitus aromatici, electrificatio.
2. Pepasmos congruus promouendus, hinc laudanda emetica, cathartica, diuretica, diaphoretica, vesicatoria.
 3. Nisi pepasmos sufficit, eductio feri artificialis per fongiculos, vlcera.
 4. Superato morbo, solida roboranda, et morbus praecauendus.
 5. Phlebotomia, aliaeque excretiones sanguineae, iuuant maxime excitando et promouendo energiam.

SPECIES ET VARIETATES.

I. Verum. *Morbi serosi, catarrhales, rheumatici, lactei, Auct.*

Signa morbi: decubitus humoris serosi ad partem, quare ludit in primis sub forma catarrhi aut agalactiae, seu metastasis lacteae, serum magis densum, lympham, aut lac, simulans, excretionem, retentionem.

Causae, energia et curatio, communes.

II. Hydrocatarrhema: *morbi hydropici, aquosi, Auct.*

Signa morbi; decubitus humoris serosi, lymphatici, in vasis minoribus, aut cellulis partium, seu tela cellulosa, saepe faccatus, seu membranis inclusus. Serum vel ex adiposis ductibus, vel ex abdomine detractum, medicamentis catharticis, diureticis, diaphoreticis, vel per ventriculum et intestina, vel per renes et cutim, abduci potest, atque in quadam membranae adiposae parte tam fluidum est, vt cutis leui pressioni cedat, vtque tumor tenui frictione sensim sensimque aut omnis, aut maximam partem, euanescat, colore cutis sano et calore naturali, consistentibus. Serum dilutum, saepe resolutum et putredinis lentae indicia sistens, a calore parum concrefcens.

Causae, energia, curatio, communes, euacuatio per aluum, vrinam, cutim.

III. Pitui.

CATARRHEVMA.

III. Pituita: partim etiam *morbi hydropici Auct.*

Signa catarrheumatis inueterati. Serum nec per ventriculum atque intestina, nec renes cutimue, ope purgantium, diureticorum, diaphoreticorum, sed sola detractiōe, educitur, et quaedam durities in membranae adiposae parte obseruatur, cum colore cutis liuido et lurido; collectio feri in abdomine lenta, sine praeuia membranae adiposae generali, aut speciali pedum tumore, sine mutatione vrinae, sine siti, et coloris in facie mutatione. Serum extractum, igni aut aquae bullienti admotum, in gelatinosum concrementum abit, coloris liuidi, cinerei, aut fusci, spumans, viscosum et saponaceo paullo tenacius, maxime ad finem detractiōis: ex cellulosae parte adfecta, pressione et medicamentis, in vicinas partes abduci quidem potest, sed minus a sanguine separari.

— β. Pituita vitrea, gypsea *auct.*

Serum spissius, ad concrescendum admodum proclive, non raro acrimonia stipatum: secretiones, egestionēs viscidae et glutinosae, faeces siccae cum pituita copiosa et tenaci coniunctae, anacatharsis viscida.

N. Morbum a lymphā et sero aegro diuellere poteris, quum vtriusque humoris notae ne secundum naturam quidem a cl. V. ita expositae sint, vt possis signa cuiusque essentialia enunciare. Igitur num sero, an lymphae, tribuas, huc vsque idem erit.

2. Metastases lacteas *auct.* iure huc retulisse mihi videor. Cf. catarrh. agalactiam.

CACHEXIA. DYSCRASIA.

CACHEXIA est morbus haereditarius, aut aduentitius, omni aetati sub admissione caussarum familiaris, designatus per epigenemata, putredinem lentam lymphae, indeque inductum languorem, designantia, pro speciebus diuersa,
ut

CACHEXIA. DYSCRASIA.

vt hae redundant ex diuersa medendi methodo, quam admittunt.

CAVSSAE, ENERGIA et CVRATIO

Pro speciebus differunt.

Indicationes communes.

1. Impedimenta curationis, tum alii morbi, tum concurrentes species, remoueantur, pro sua dignitate.
 2. Causae fugiendae, et sensim contraria admittantur.
 3. Exhibeantur acrimoniam obuoluentia.
 4. Speciebus satisfiat.
- N. Nonne omnis cachexia ab oleo corrupto, lentam putredinem inito? Certe in syphilide oleum, quod ad semen, smegma cutis, pinguedinem, osium medullam, redit, corruptum est. Similiter in trichomate, vbi pilorum potissimum nutriens oleum corruptum. Ita quoque in lepra et scabie, vbi smegma cutis, medulla osium, laesa. Neque de scorbuto dubitaueris.

Igitur procul dubio haec est formalis causa in vniuersum. Species autem oriri videntur ab irritabilitate, aucta in variis partibus a varia specie corrupti olei. Certe mercurius, specificus in syphilide, non videtur delere putredinem illam, sed potius tollere irritabilitatem, euolutioni illius putredinis fauentem. Hinc intelligi potest, cur tam parua mercurii dosis sufficiat medendae syphilidi, cur celebretur mercurius sublimatus, qui externe adplicatus, aut adsumtus, in sanis etiam, irritabilitatem corporis certe plus minus delet: et qui delendae irritabilitati venereae potissimum aptus est, quoniam haec est irritabilitas, directa ad euolutionem putredinis, et hic per mercurium irritabilitati noceat in vniuersum, per acidum salis putredini resistat, vt possit ita compositus eam irritabilitatem omnino tollere ^m). Quod verum si est: non-

ne

m) Hinc et ab usu mercurii sublimati non raro abortus, aut partus mortuus et pilorum pubis re-

sectio utilis in gonorrhoea et bubonibus. Comm. Lips. XI, 711.

CACHEXIA. DYSCRASIA.

ne diathesis venerea post mercurii vsum omnino superest, dum formalis causa ex parte tantum tollitur: nonne igitur facile poterit iterum syphilis redire?

SPECIES ET VARIETATES.

I. SCORBVTVS.

Morbus nec haereditarius, nec contagiosus, omni aetati sub admissione causarum familiaris, putredine lenta sanguinis nititur, et declaratur tum admissis causis, tum epigenematibus, variantibus pro speciebus.

CAVSSAE.

Formalis est putredo humorum lenta (inducens languorem totius corporis).

Remotae: imbecillitas, vel connata, vel acquisita per animi pathemata, maxime tristitiam, timorem, moerorem, vulnere, exercitationem raram, vitae genus sedentarium, somnum nimium; impedita transpiratio, ad quam confert aer humidus, et frigidus, hinc sordities, vestimenta humida, non renouata, hiems, regio septentrionalis (licet calidus non repugnet, qui faueat sequentibus) aer, non renouatus, effluuiis paludosis, putridis, repletus; defectus varietatis ciborum, maxime vegetabilium recentium, unde abusus carnum salitorum, subputridorum, humidorum, glutinosorum, in ciborum coctione usus vasorum cupreorum, in primis stanno non obduktorum, nec perfecte purorum; abusus potus spirituosus, vel ad putredinem proclivis; hinc ob varias rationes locis maritimis, paludosis, fluminum inundationibus, sylvis, nauibus, ciuitatibus obsidione occlusis, commorantibus familiaris est morbus, praesertim militibus non exercitatis, futoribus, sartoribus, textoribus, aut viscera labefactata gerentibus.

ENERGIA.

Vix obtinet.

CVRA.

SCORBUTVS.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Putredini lentae resistendum per congruam diaetam, caussis aduersam, et euacuationes per vrinam, sudorem, aluum.
2. Languori opponenda, quae firmant corpus.

Hinc patet, cur laudentur decocta ex radicibus sudorificis, eccoprotica, et maxime tamarindi, cassia, diuretica, vt scilla, exercitatio, vitae genus laboriosum, laetitia, somnus modicus, aër ferenus, siccus, calidus, vegetabilium recentium vsus, maxime acidorum, austeriusculorum, amarorum, adstringentium, hinc panis, bene acidulatus, ex triticea farina, bene coctus, cortices aurantium atque extractum, aliaque, potus vini modicus, acetum, cereuisia, lupulata, abietina, maltum, lupulus, lac, serum lactis, semen sinapis, herbae, vermicularis, britannica, chelidonium minus, eupatorium cannabinum, nasturtium aquaticum, cochlearia, armoracea, sedum acre, marum verum, nicotiana, cortex Peruvianus, dulcamara, L. et G. guaiacum, aqua marina, acidum vitrioli, camphora: balnea ex herbis rorismarini, thymi, rel.? cur vituperentur et noceant mercurialia, opium, imo antimonium et mars?

SPECIES ET VARIETATES.

A. Genuinus. LIND. v. Scorbut.

a. *Incipiens.*

Pallor, levis intumescencia faciei, labia, carunculae lacrimales, viridescencia, pallor successiue obscurus et liuidus. Animi moeror et abiectio, pigritia, *lassitudo*, genuum stupor, debilitas, adpetitus ciborum et potus integer. A quouis motu *dyspnoea* et *lassitudo crescens*, gingivarum pruritus, dein tumor et facilis cruentatio, anhelitus

SCORBUTVS.

helitus foetens, *gingivae atrorubrae, molles, spongiosae, dein putres et fungosae*; haemorrhagia gingivarum et aliarum partium. Cutis haecenus ficca, vel lucens et glabra, vel aspera et serpentina: iam maculae subrubrae, subcaeruleae, liuidae, vel nigrae, aliae lenticulares, aliae palmares, frequentes in tibiis, non raras in trunco, brachiis, cruribus, nusquam fere in facie: initio sunt margine flauo, dein liuescente, imo atro, irregularis figurae. Tibiae sunt oedematosae maxime vesperi, atque oedema digiti vestigium diutius seruat, quam genuinum. — Variat descriptus epigenematum ordo secundum praegressa.

Sanguis missus sistit pelliculam subnigram, spissam, ferro limpidio innatantem: atque in vniuersum est crassus et spissus, nigerrimus, atramento similis, pellicula viridescenti praeditus.

b. *Crescens.*

Dolores rheumatici vagi, osteocopi, ischias, *pleurodyne*, dyspnoea, *tendines* flexorum tibiae, scil. femineruosi et semimembranosi potius, quam gracilis et bicipitis, retrahunt tibiam versus femur, *rigescunt*, genua tument, dolent, perit motus, seu adest *gonorheuma*. Accedunt *asthenia*, diuque a motu abstemii ex minimo in syncopen incidunt, libero aëri expositi non raro statim moriuntur: color faciei plumbeus, ecchymoses tibiæ tumidarum, dolentium aut citra tumorem (cum cruribus) rigescentium, pleurodyne: Haemorrhagiae narium, gingivarum, haemoptysis, hepatirrhoea cruenta, vlcærum cruentatio. Vigor sensuum et appetitus ciborum, corpore et animo prostratis, nec, nisi a motu, dolor. Vacillatio, lapsus dentium, raro caries maxillarum.

c. *Inueteratus.*

Aperiuntur, si quae sint, vlcærum cicatrices, cutis in tibiis crepat, ibi tumor mollis, liuidus, dolens, vlcera

SCORBVTVS.

fungosa, cruenta. Synochus cum petechiis, ephidrosi frigida, metrorrhagia, letales, aurigo, ascites, hypochondriasis, contractura, pleurodyne, pectus constringens, obstipatio pertinax, dyspnoea, subito enecans, urinae paucae, foetidae, rubrae, animi deliquia, mors, saepe a leui motu.

B. Spurii ^{a)}.21. *Frigidi.*a. *Liuidus.*

Vibices maiores nigrescentes circa tibias et articulos, non raro circa palpebras, et in ipso oculorum albo: oculi tument, rubent, chemosi laborant, gingivae tument, decolorantur, mollescent, expressae ichorem flavum, foetidum, fundunt, tument parotides, urina intense rubra, febris, dolores acuti. Viguit Wiburgi et Petropoli 1732 et 33.

b. *Petechialis.*

Maculae atrorubrae, brunneae et subflavae, exiguas lentes vel petechias referunt, hinc dolor cutis partis tibiarum anticae et circa malleolos, genua a vibicibus subrubris obsidentur, harum partium tumor et dolor, pulsus frequentia crescit pari passu, quo macularum rubedo intenditur, gingivae minus spongiosae, quam in liuido, at superius excoariate, urinae rubrae, genas intus obsident verrucosa tubercula, interdum fungosa, alia ad fauces. Sputa frequentiora, anhelitus foetidus, crotaphites infra zygoma interdum tument, numquam parotides. Viguit in castris Vst-Samarae 1737.

c. *Pallidus.*α. *Tophaceus.*

Maculae nullae. Phlegmatia pallida, sensim auriginis instar flavescent, vigente lymphae ranciditate, adeps
sebi

n) A. NITSCH tr. de scorb. exerc. Russici 1747.

SCORBVTVS.

sebi instar induratur, tuncque brachia et tibiae mire tumunt et indurantur. Supra manus et tibias concretiones tophaceae, genae magis inflantur, genua magis contracta, gingivae minus molles et putridae, maxillae inuicem apprimuntur: parotides, crotaphites et masseteres simul nonnumquam indurantur. Viguit Borgi in Finland. 1742.

β. *Muriaticus*.

A fero vappido, in tela cellulosa accumulato, anasarca, asthma, hydrothorax, ascites, diarrhoea, ab acriori dolores erodentes, sparsim dirissimi, dira pleurodyne, a carie secessus costarum a cartilaginibus, strepitus inter respirandum, asthma spasmodicum, suffocans, diarrhoea colliquativa et torminosa, vel ascites letalis. Observabatur Aboae 1743.

Vterque α. et β. aliis est diuturnior, per totam aetatem ad auctumni finem detinens.

d. *Ruber*.

Debilitas summa, cutis admodum rubra, genae tumidae et pendulae, cachexia profunda, gingivae maxime fungosae, putres, foetidae, purulentae, genua contracta. Lenta haec in castris Vst-samarae observata.

δ. *Calidus*.

Nulla intumescencia, corpus potius macilentum, gingivae nec fungosae, nec foetidae, calent admodum, dolent, turgent, dolores non adeo fixi: febris exacerbans anomala, dolores vagi, nunc dorsum et caput dimidium dimittunt, nunc integrum, et collum et dentes excruciant; vel pleurodyne et orthopnoea detinet, aut fixi colicam, nephralgiam, ischuriam, extremorum spasmus excitant; genua admodum rigida et contracta, minus tumida et inflammata, maculae nullae, urinae sedimentum crassum et arenulosum, et pelliculam albam, tenuem, adiposam, supernatantem exhibent. Observata est Wiburgi.

SCORBUTVS.

C. Infantum o).

Dolores musculorum, aeger nec pedibus insistere, nec progredi potest, et semper sedet, cubat, eiulat, si stare cogatur, aut eius surae comprimantur, tubercula dura, gangliorum instar, hinc inde obseruantur. Sensim maxillas adficit, exedit, ossaque carie corrumpit. Et vel absque pyrexia vuluam in puellis, genas et gingiuas in utroque sexu, liuore et mollitie, gangraena et sphacelo, absque dolore corrumpit, maxime conualescentibus a rubeola, vel phlegmasiam insanabilem inducit, diarrhoea, hectica, marasmo, terminandam. Nisi ad vltimum gradum peruenierit, aegre agnoscitur, parentum tamen aut nutricis diathesis scorbutica, regio et tempestas, lucem dare possunt.

II. SCABIES P).

Morbus spontaneus, vel attactu proximo, concubitu, communione vestium, rel. contagiosus, raro cum impetu adoritur, sed sensim ad manuum supremam partem, inter digitorum interualla (si a contagio), pruritu sensim, maxime vespere adaucto, atque erumpentibus papulis, quae postea multiplicantur, nec brachia solum, sed et dorsum, lumbos, axillas, demum crura et femora inuadunt, designatur. *Papulae asperae, durae*, seu scabrae, nunc solitariae, nunc confertim agglomeratae, gaudent *basi dura et aspera*, vel rubeo viuidoque colore distincta (non nullis *sanguinea* dicta) vel albescente (pituitosa, lymphatica); atque in his ipsis sedes est pruritus, varia symptomata, pro morbi duratione inferentis, vt in vehementi gradu pruritus fere conuulsius maciem, vigiliasque truces, cibi fastidium, febrim lentam et hecticam inducat. Alius plerumque tarda, scybala dura, nigricantia exeunt: urinae sunt tenues, aquosae, color cutis flauus ut plurimum, aut pallidus.

CAVS.

o) SAUV. Sp. 15. astheniae.

p) Scabies est morbus, LORRY m. c. p. 231.

SCABIES.

CAVSSAE.

Formalis est putredo lenta mucii cutanei (inducens languorem, cutis potissimum).

Remotae: aëris humiditas frigida, victus crudus, inordinatus, aquarum crudarum seleniticarum vsus; sordities, (constitutio epidemica,) contagium.

ENERGIA.

Morbus ipse soluitur per criticam papularum eruptionem, quae non morbum ipsum solum, sed et graues alios morbos sequitur et passiones, quae sanat. Sic post sepsin, et melancholiam, maniam comparens, aut excitata, illis remedio est. Hinc et non rite tractata, sed repulsa materia, papulas constituyente, grauissimas passiones excitat, eruptione papularum restituta soluendas.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Morbis, concurrentibus aut praegressis, satisfiat, hinc v. g. plethora, saburra, remoueantur.
2. Putredo lenta emendetur acidis, vt spiritu vitrioli, solutione Swietenia (quae iuuat tam ob acidum salis, quam ob mercurium, mucum adamantem) et si sorditie aut contagio nata est, sensim ope sulphuris, externe adplicati, forma vnguenti, aut ope mercurii, superetur.
3. Diaeta sit caussis contraria, et exhibeantur lympham demulcentia, interpositis euacuantibus.

III. LEPRO 9).

Morbus, inter Arabes, Aegyptios, Abyssiniam et Americam meridionalem frequens, haereditarius, et per vbera, coitum, halitus et ephidrosin subiecti morbofi, hinc et domicilia infecta aliis contagiosus, *colore cutis mutato et anæsthesia* maxime agnoscendus, sic incedere solet.

Simul

9) SCHILLING de lepra. L. B. 1778.

LEPRA.

Simul ac *maculae*, vel plenam et integram cutim, vel vulnera, vlcera, tumores, abscessus, papulas, citra discrimen obsidentes, atque vel *rubrae*, vel in pallidum vergentes, vel *albae*, ad flauum, liuidum, aut rubrum colorem tendentes, principio paruae, et figurae rotundae comparent, pili in parte adfecta mutantur, vt in rubris subflauo, aut subrubri, in albis albi conspiciantur. Eaedem sine vlla phlegmasia et notabili eleuatione, potius cum aliqua depressione, paulatim dilatantur et crescunt: atque quum prodeunt, raro superant ambitu acus puncturam, plerumque initio singularis est, rarissime plures prodeunt. Dum ad lentis magnitudinem increuit, aegre distinguitur macula a naeuo aut lentigine, quod tamen ope acus adhibiti, et animaduersione, an incre scat, licet. Simul cum maculis auricularum lobi intumescunt, et obturantur, atque in toto ambitu subinde tuberculis cinguntur. Deinde nares, labia oris, et vniuersa facies turgescunt, et rubore quodam inficiuntur, qui a sano multum discrepat, scil. quasi cinnabarino, progressu temporis ad caeruleum vergente, et quo vetustior morbus est, liuidiorem euadente. Cutis praeterea adest insensibilitas, seu anaesthesia, et cutis sensim magis magisque contrahitur et in plicas obdurescentes corrugatur. Excreta sana sunt, vrina tamen pallidula, muriam haeccum olet, citoque putrescit.

Sic morbus aliquando per X. XX. annos subsistit, notabile incrementum non capiens, quorsum diaeta confert. Quodsi morbus vel dissimulatur, vel non agnoscitur, nec diaeta seruatur congrua, dirissima sequuntur symptomata. Maculae enim leprosae a facie per vniuersum corpus ad plantas pedum vsque erumpunt, atque in tubercula et nodos surgentes habitum mirifice deformant. Maxime sub vnguibus nascuntur vesiculae, apices digitorum crassescunt et sensum amittunt, serpit e prima phalange malum in alteram citra dolorem, atque ossicula absque dolore vel sponte,

LEPRA.

sponte, vel leui opera, delabuntur, eximuntur. Aliquando vero tarde malum serpit. Interdum vniuersum corporis tegumentum turgescit et induratur, et transpiratio penitus sistitur, vnde leucophlegmatia, hydrops, melancholia. Accedunt vlcera, quae densis crustis, breui labentibus et renascentibus obteguntur, anodyna, interne etiam periosteum citra dolorem depascentia. Caro horum vlcerum similis est recenter mactatae et sanguine adhuc commaculatae: differt tamen a luxuriante, quod omnia maculae latera deorsum, ac sursum et lateraliter, depascitur, donec tota pars consumpta sit, cathaereticisque inhiberi non potest, pili partis adfectae manent albi, et paruulum punctum in vlcere ceteris paribus candidius conspicitur, et sensus absque vehementissimis causticis vix excitatur. Haec vlcerosa interdum, quum cutis in toto maculae ambitu consumpta esset, sine vlla medela consolidatur, cum spe sanationis simulata, dum paullo post aliae maculae prodeunt, quae pariter exulcerantur. Quidquid e corpore humoris transpirat, est intolerabili foetore; adest obstipatio pertinax, excrementa sunt nigra, sicca et quasi combusta, vrina rufa, vroscopiis tenaciter adhaerens. Sitis perpetua: lingua semper sicca, interdum nigris crustis tecta, et hinc inde quasi rimosa. Sanguis, admodum tenuis (serum sanguinis semicocto carnis iusculo simile) ad ignem aegre cogitur, mora tamen et frigore leuiter cogitur, exiguaeque feri copiam dimittit, et ex vena missus putridum olet, cruoris globuli sunt albi. Stimulus ad venerem assiduus est, vt genitalium pruritus, qui non solum ante macularum eruptionem vrget, sed morbo etiam iam declarato perseverat, quin ad mortem manet non coërcibilis.

Latet aliquando morbus *sub adustionis specie*, dum inopinato et subito, intra vnius noctis spatium, exiles et indolentes vesiculae in variis partibus, praecipue in facie et
digitis

LEPRA.

digitis extremorum oriuntur, excoriatiōi ab aduſtione ſimiles.

Lepa occupat quidem totum corpus, ſeu vbique obtinet. Vbi vero pedes potiffimum adſcit, dicitur *Elephantiaſis*, *Elephantia*, atque ibi in pede adfecto phalanges officulorum paulatim intumeſcunt, cutimque et carnes mirum in modum expandunt, craſſeſcunt digiti, tandemque colliqueſcunt cerae ad inſtar, vnde a leuiſſima cauſſa haemorrhagia, ſponte et cito etiam iterum fiſtenda. Serpit malum ad femur uſque, contracturam efficiens, tum ob coagulū ſinegmatis, tum ob concretionem muſculorum et tendinum. Simul panniculus adipoſus et cutis in plicas et rugas ita ſenſim ſe componunt, vt pedis elephantini formam omnino exprimant. Quo facto et manuum digiti circa articulos tument; et ſucceſſiue ſoluti cadunt, inde abſque dolore vlcera primo faciem et dein carnoſas partes depaſcuntur cum foetore intolerabili. Satyriaſis et hic magna. (In amputato cuiuſmodi oſſe nulla perioſtei veſtigia neque externi, neque interni, conſpicua, nullae in oſſibus cauitates, nec quidquam medullae eſt. Nulla ferme vaſa vel ſanguifera, vel lymphatica in partibus internis obſeruantur, eaque in corrugata cute ſunt varicoſa, et fere inania, ambo cruris oſſa et oſſa pedum, quaſi in vnum confluxerunt et arteria interoſſea deleta).

CAVSSAE.

Formalis eſt putredo lenta (inducens languorem cutis et extremorum).

Remotae, vita a parentibus, morbo adſictis adepta, contagium, uſus carniū ſemiputridorum, potus aquae, multis piſcibus putreſcentibus repletae, tempeſtas conſans, calida, ſicca, aut in ſummo gradu humida, veneris abuſus, refrigeratio.

ENER-

LEPRA.

ENERGIA.

Vniuersalis, lepra, vera crisis est, toleranda ^{r)}).

CURATIO.

Indicationes.

1. Fugiendae causae, et morbum adaugentia, vt acida et mercurialia.
 2. Remoueantur curationis impedimenta, vt plethora, saburra.
 3. Crisis per cutim molienda ope balneorum tepidorum, bis in septimana ad 15 horae min. vsurpatorum, dein quotidie bis adhibitorum, cum emollientibus et leniter detergentibus, exercitatione, sudoriferis et vino quoque per trimestre adhibitis.
 4. Si morbus fugatus, corpus roborandum internis et externe per suffimigia.
 5. Vlceri admittunt tinct. aloes, myrrhae, succini.
 6. Cutis calli resoluendi, emolliendi vngv. de alth. enul. cet.
- N. In sanatis maculae, non incrementales, distinctae, a lepra remanent. — Facilius sanatur, quae corpus totum, quam quae solum partem occupat.

III. SYPHILIS.

SYPHILIS, morbus, ex insulis Antillis, seu Hispaniola, vbi endemius, ab anno 1492. in Europam introductus, indeque fracta sensim malitia, sub varia forma conspicuus, genuinam naturam suam adeo dissimulat, vt, si *a coitu suspecto, aut contagio cum suspecta persona vario, et mercurii viribus*, egregiis in superando morbo, ambiguo certe charactere, recedis, vix morbum agnosci posse, fateri debeamus. A solis igitur morbi legibus lux, me quidem iudice, expectanda in tenebris: has igitur quaeramus.

Lex. I.

r) SCHILLING l. c. p. 159.

SYPHILIS.

Lex. I. Morbus est haereditarius.

II. Maxime vero est aduentitius, contagiosus contactu, concubitu cum aegrotis, hoc morbo laborantibus, lactatu, osculis, cubitu solo, contactu diuturno rerum, conspurcatarum excretis venereorum, contrectatione partium ulceratarum, et obstetricio labore, maxime neglecta partis contaminatae purgatione.

III. Ea corporis pars, quae contagio in primis exposita fuit, primum adhaerescit, ut hinc variae oriuntur passionibus, *ita*, ut, *ubi* epidermis integra est, a contagio oriatur inflammatio partis, *ubi* vero vel antea, vel successu temporis, durante morbo, pars laedenda, aut laesa, habet epidermidem solutam, ulcerosam, oriatur *LŪES*, *VENEREA* dicta.

III. In specie hae leges obtinent.

A. Haereditariam definiunt parentum confessio, se tempore coitus, aut matrem durante graviditate, non fuisse a morbo immunes, aut signa alia, idem testantia, infans ipse debilis, marcidus, noctu inquietus, plerumque intra primum vitae semestre efflorescentias, et quidem herpetem, *tineam*, aphthas, labia oris purulenta, ulcerosa, otorrhoeam externam, *epiphoram*, aut, si vis contagii debilius, rachitidem, *sypilitica*, sustinens, nutrici mastodyniam inferens.

N. Parentes, per annos 20. 30. sani, seu morbo expertes, eius tamen olim contagio expositi, postquam liberos sanos procrearunt, dicuntur tamen liberos, morbo adfectos, generare, tumque et coniugi nocere ^s).

2. Inquiras, an infantes usu cochlearis, cultri, forcipis, vasculi, aut ciborum, a subiecto sypilitico

^s) ROSENSTEIN v. d. Kk. p. 96. PRESSAVIN, tr. des mal. ven. 650. DARAN. mal. de l'vrehre p. p. 42.

SYPHILIS.

co manducatorum, linteorum conspurcatorum, morbum susceperint?

B. *Adquisitam*:

- a. *Lactatu* definiunt: labia oris purulenta, aphthae, epiphora, otorrhoea externa, tinea, herpes.
- b. *Mammas praebendo*: mastodynia varia.
- c. *Basiando*: labia oris purulenta, ulcerosa, aphthae.
- d. *Cubando in eodem lecto, usu rerum, excretis conspurcatarum, obstetricatione*: herpes, scabies, tumores, ulcera, in locis, contagio expositis.
- e. *Coitu*: aedoitis, seu phlegmasia genitalium, ulcera eorundem cancrofa.

V. Suscipitur maxime contagium a corpore laxo, scorbutico, ebrio, et a mercurialium usu vix recedente, a putrido convalescente.

VI. Non numquam impune morbum ferunt, vel contagio resistunt subiecta, vel viribus corporis, maxime humoribus venenum inuoluentibus, vel ablutione cita, aqua, lacte, vino, simil., adhibita ad partem contagio expositam.

VII. Morbus, coitu susceptus, sanatur aut sponte, aut arte, tum excitata, tum adiuta gonorrhoea, nec in corpus venenum facile suscipitur, nisi excoriatio urethrae vel adfuerit, vel durante gonorrhoea enata fuerit.

VIII. Morbus, per aedoitiū designatus, suscepto etiam veneno intra corpus, et mutatis passionibus, amat cum excitatis passionibus solui per gonorrhoeam.

IX. Morbus, per ulcera maxime conspicuus, aut in luem veneream mutatus, amat mercurialia, et nisi vni cedit, cedit alteri.

X. Morbus, nondum per genuinam passionem declaratus, sed per varia symptomata, cruditatem quamdam morbi, seu

venere-

SYPHILIS.

venenum vagum designantia, mercurialia non solum non requirit, verum inde increfcit.

- XI. Morbus, per inconstanter adhibita, saepe mutata, mercurialia tractatus, saepe ad eadem rebellis est.
- XII. Vbi per mercurialia peculiaris dyscrasia enata est, passiones, eius sequelae, non mercurialibus, sed dyscrasiae aduersis, v. g. cortice Peruviano, tolluntur, et si morbus adhuc latet, mercurialia optime fert.
- XIII. Contagium sensim, per generationem, rel. transit in scrophulas, trichoma, et neurosin, praecipue atrophiam et rachitidem.
- XIV. Morbus amat coniunctionem cum scorbuto, lepra, trichomate, scrophulis, plethora.
- XV. Morbus per epidemicam constitutionem (seu aëris potissimum vicissitudines) mutatur, vt tum simplex sit, et certo tempore potissimum gonorrhoeas, bubones, cancos, pustulas, rel. inducat^t); tum comitatus morbus, v. c. cum saburra, vbi hic maximam sibi vindicat attentionem^u).
- XVI. Morbus datur simulatus^x) v. catarrh. et plethor.

CAVSSAE.

Formalis est dyscrasia lymphæ peculiaris, et mediante hac, feminis, pinguedinis, muci, et reliquorum humorum, (inducens telæ cellulosaë vel contractilitatem, palpitationem auctam (*sypilis*) vel atoniam (*malum venereum*).)

Remotæ: contagium, praetereaue corpus laxum; scorbuticum, leprosum, trichomaticum, scrophulosum, ebrium, a mercurialibus debilitatum, a morbo putrido conualefcens.

t) Teste NOEL. Cf. HELD. Ausz. I, 324. sq.

u) Cf. STOLL. R. M. cet.

x) LORRY. m. c. p. 45. BRENDEL. op. II. 77.

SYPHILIS.

cens. — An forte morbus non fuit endemius in insula Hispaniola, sed morbus natus ex concursu caussarum? Scilicet semen putridum in nautis, diu abstemiis, scorbuticis, procul dubio, et insularis acria, ut videtur, et calidiora menstrua habentibus, praetereaque subiectis, aromaticis acris abutentibus? Mihi profecto verosimile est, praecipue quum ea meditor, quae de syphilide protulit HUNDERTMARK Y), ubi non raro vidit, passiones syphiliticas ortas esse in subiectis scorbuticis, et ex parte feminae, menstrua calidiora, aut fluorem album habentibus, concumbentibus. — Quum vero et lepra cum syphilide plurima habeat communia, et syphilis ipsa tum ab origine sua tantum a sua vehementia remittit, et in producendis passionibus genium suum mutauit, ut ab hodierna aequae distet vetus, ac syphilis a lepra, tum vero et syphilis non coitu solum propagetur, nec repugnet, passiones genitalium aliquando etiam ab aliunde suscepto contagio produci, non video, quid impediat, quo minus syphilis, mutata lepra, vocetur, quamuis nullam inde utilitatem redundare, facile concedam, eo magis, quum lepra ne admittat quidem mercurialia (quod vero supra dictis non repugnat, quum nec phlegmasia genitalium syphilitica, non raro in lucem deinde transiens, mercurialia admittat).

ENERGIA.

Si fides obseruatoribus, (non tam in dicendis visis veris, quam colligendis omnibus, quae ad rem extra dubitationem ponendam faciunt) aliquando peptis obtinet, ut citra contagium miasma coquatur a humoribus, non raro vero pepasmos obtinet, tum per gonorrhoeam, seu excretionem miasmatis per lympham et mucum, tum per serosas excretiones aluinas, diuresin, diaphoresin, non raro et per ptyalismum.

Ab

y) Pr. de ozaena vener. L. 1758. p. 4.

SYPHILIS.

Ab energia varia in praxeos vtilitatem, certe consentiente morbi natura, morbum distinguo in species II.

I. SYPHILIS DESIGNATA VERA. Huc *passiones syphiliticae*. Morbus dictus, facile soluendus per gonorrhoeam criticam.

Indicationes.

1. Omnes passiones enatae, per gonorrhoeam soluendae, reducantur ad aedoitim.
2. Quod fit adplicatione materiae gonorrhoeicae syphiliticae ad vaginam vel vrethram virorum, et in his quoque simplicem cerei in vrethram positione, vel aliquot mercurii dulcis dosibus, cum balneis calidis penis coniunctis.

Reliquas indicationes vide ad aedoitim.

II. LVES VENEREA. Huc *passiones venereae*.

Morbus dictus, soluendus per excretionem serofas, ope mercurialium excitatas, difficilius per gonorrhoeam ²⁾).

CURATIONEM

Nondum satis definitam esse, doleo; operae vero pretium vix erit, methodum medendi fusius hic tradere, quum quisque aut inunctiones amet, aut mercurium sublimatum, aut aliud mercuriale praeparatum, nullum tamen ubique morbo medeatur, nec ab omni opprobrio liberari possit.

N. Laruatam syphilidem non commemoro, quum ea tantummodo redundet ex difficultate morbum agnoscendi, aut ob neglectas leges supra dictas, aut mancā observationem, aut signa ambigua. Suadeo tamen, ut, qui morbi cognitionem cupit, ex habitu discat has illas passiones agnoscere, ut scabiem, tineam, venereas, et ubi suspicio morbi est, furtim mercurialia adhibeat.

V. TRI-

2) LORRY m. de cut. p. 62.

TRICHOMA.

V. TRICHOMA. *Plica Polonica auct.*

TRICHOMA est morbus designatus per criticam capillorum complicationem et agglutinationem, vt extricari nequeant.

CAVSSAE

OBSCVRAE.

Formalis dyscrasia lymphae, potissimum iudicanda per vberiore secessum olei, crines nutrientis, ope eruptae plicae.

Remotae: Contagium, concubitus cum plicosis, haereditaria diathesis, syphilis, sordities.

ENERGIA.

Plicae ortus.

CVRATIO.

Indicationes. Fugiendae causae, et eligenda, quae conducunt, quorsum ptisanæ fudorificae, aquae sulphureae, decoctum lycopodii.

SPECIES ET VARIETATES.

- a. *Latens.* Phaenomena, syphilidi facile adscribenda, dolores lancinantes capitis, et artuum, continuo per annum torquentes, narium et faucium vlcuscula sordida, nodi et tubercula dura, in manibus pedibusque dispersa. Augmentum ab hydrargyrosi, ossium narium caries, faucium exesio, fudor capitis foetidus, imaginationis vitium, adpetitus deprauatio, vnguium scabrities, lapsus, marasmus, cephalaea, amaurosis, syrigmus, apoplexia.
- b. *Designatum.* Ex India orientali circa ann. 1687. per Tartaros inuectum in Poloniam, Silesiam, Hungariam, et loca vicina.
- I. *Mas. Cirrosum.* Species vulgatissima, minus noxia. Capilli in funiculos longos coniuncti et agglutinati. Idem praenunciant pallor faciei, asthenia, cephalaea, arthritis; super.

TRICHOMA.

superueniunt syrigimus, conuulsio, contractura, rachitis, cum ossium fragilitate.

II. *Femina. Villosum.* Tophi villosi inexplicabili ratione complicati, vel dispersi, vel coaliti in mitram, totum caput tegentem. Resecto capillitio, passiones diriores, potissimum vnguium excrecentia mirabilis, cum scabritie et nigredine, vt vngues cornua hircina referant.

c. *Suppressum.*

A resecta plica passiones variae excitantur, (euanescentes a plica restituta) quas tollunt 1. plicae eruptio. 2. phthiriasis cum foetore, porrigine. 3. alopecia.

Critica plicae excretio per longum tempus absoluitur. Perfecta cognoscitur fuga symptomatum, suppressum indicantium, capillorum defluuium, dein refarcito. Ante perfectam crisin plicam refecare, periculosum, imo confert, eam per totam vitam gestare.

CONIVNCTIO.

CONIVNCTIO est morbus haereditarius, aut aduentitiis, congenitus, qui tum per causas communes, tum epigenemata, variantia pro speciebus et varietatibus declaratur.

CAVSSAE.

Formalis est abundantia phlogisti.

Remotae: adfectio haereditaria, congenita, debilitas solidorum haereditaria, adquisita; aetas virilis, sexus potior, sexus sequioris plethora perstans, abusus veneris, vigiliarum, mentis virium, animi pathemata, vita sedentaria, maxime commutata cum laboriosa, adiapneustia, bulimia, amaestesis, abusus carniū, spirituosorum, vini, maxime sulphurati, aromaticorum, amarorum, terreorum, narcoticorum, nicotianae fumo per os assumptae, nimius

CONIVNCTIO.

mius ptyalismus, haemorrhagiae sollemnes suppressae, et neglectae, adiapneustia, diarrhoeae, dysenteriae biliosae, suppressae, morbi biliosi, putridi, scorbutus, crises imperfecte absolutae, vita casta, rel.

ENERGIA.

Pepsis obtinet in morbo recenti, adquisito, raro in haereditario, sub congrua diaeta. Pepalinos obtinet in recenti, crescente, inueterato, sub congruo regimine, per diaphoresin, diuresin, catharsin, haemorrhagiam, rel.

CVRATIO.

Indicationes. v. species.

SPECIES ET VARIETATES.

- I. ATRA BILIS. Constitutio atrabilaria. *Auctor.* Morbus haereditarius, adquisitus, designatur per anxietatem, lassitudinem, dyspepsiam, tristitiam, agrypniam, aut somnum non reficientem, post pastum somnolentiam, magnam in melancholiam proeliuitatem, feruida animi pathemata, oculos facile inflammabiles, nares, praeter digestionis horas, siccas. Lingua, nisi in ieiunis, non sordida, flaua, pituitosa, arida, os siccum, saliuu tenax, viscida, tempore concoctionis sputatio multa, sitis, volae manuum et plantae pedum vrentes; vrina raro emissae, profunde colorata, rubra, iumentosa, imo atra, vel lateritia, non critica, horborygni, meteorismus, obstipatio, deiectiones crudae, non raro foetidae; pulsus tardi, pleni, regulares, dyspnoea, anacatharsis, exanthemata chronica, pruritus cutaneus, scalptu soluta cutis fundit brunneum ichorem, maxime ad pudenda et podicem, dyshaemorrhoids, dysmetrorrhoea, dysarthritus. Sanguis missus ater, plus minus florido mixtus: iuuamen ab acidis. Diutius fota producit ructum rancidum, foetidum, os et fauces erodentem, stuporemque dentibus inferentem, saporem detestabilem, infarctus abdominales, praetereaque melaenam, haem-

ATRA BILIS.

morrhoidem, metrorrhagiam, maciem, debilitatem summam, sub qua corpus et vrina virescunt, liuescunt.

CAVSSAE.

Formalis est debilitas systematis venae portarum, inducens phlogisti abundantiam, potissimum abdominalem.

Remotae: ea, quae debilitant corpus et praecipue portarum venam, atque abundantiae phlogisti occasionem praebent, hinc diathesis haereditaria, alimentorum crassorum usus, animi pathemata, curae, studia feueriora, vigiliae protractae, vita sedentaria, aetas consistens, spermatis et lymphae iactura nimia, polycholia, largior carniū, ciborum pinguium, butyri, potus coffeae saturati, ex admodum tostis fabis parati, aut spirituosorum, abusus, austeriorum, oleosis admixtorum, usus, haemorrhagiarum fuerarum suppressio.

ENERGIA.

Pepsis obtinet in morbo recenti, sub fuga caussarum et caussis contrariorum usu: pepasinos vero obtinet, dum haemorrhagiae excitantur tolerandae, moderandae, per haemorrhoides, metrorrhagiam, haematemesin, melaenam; raro contingit per diuresin, diaphoresin, catharsin.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Morbi incrementum impediendum, per congruam rerum sex non naturalium directionem, ut sint contrariae caussis.
2. Cauendae passiones admodum menti aut vitae insidiantes.
3. Impedimenta curationis tutae remouenda.
4. Energia, nisi obtent passiones, excitanda per exercitationem, balnea frigida, roborantia interna.
5. Materia, non acris, resoluenda saponaceis, salibus mediis, horaeis fructibus, decoctis rad. resoluentium, exercitatione.

ATRA BILIS.

6. Materia mobilis reddita, resoluta, euacuanda per eccoproptica, enemata emollientia, resoluentia, frequenter vsurpata, diuretica.

7. Victo morbo corpus, et praecipue vena portarum, roboranda internis, externis.

A. ENCEPHALEMPHRAXIS. Infarctus cerebri.

Signa atrae bilis, praetereaque agrypnia, aut somnolentia, tristitia, melancholia, non raro apoplexia.

B. PNEVMEMPHRAXIS. Infarctus pulmonum.

Signa bilis atrae, et praeterea anxietas summa, a leui motu dyspnoea, aut orthopnoea constans, saepe peripneumonia, atrabilaria dicta.

CAVSSAE,

Communes.

ENERGIA.

Per haemorrhoides, metrorrhagiam, (reuellentia).

C. HEPATEMPHRAXIS. Infarctus hepatis ^{a)}.

Signa hepatosclerysmatis remissiora, regio hypochondrii dextri minus firma, angustia praecordiorum, dyspnoea, dolor grauans, a tactu crescens in regione hepatis, aestus volaticus, faciei et volarum manuum, fitis vaga, os siccum et amarum, tussis sicca, intermittens, in interuallis nulla respirandi difficultas, nulla febris initio, saliu viscosa, inappetentia, cardialgia, splenalgia, paraphrenitis, lassitudo et grauitas artuum, obstipatio (deficiunt oedematia et hectica). Accedunt hypochondriasis, hysteria, agrypnia, rhinorrhagia, vomitus, haematemesis, melaena, haemorrhoids, ascites, anasarca, hysteralgia, metrorrhagia, coeliaca, aurigo, melasicterus, et si haec omnia deficient, melancholia atrabilaria.

P 2

Est

a) SENNERT l. 3. c. 5. IVNCKER t. 39. ALBERTI tr. de haemorrhoid. ROSENSTEIN d. de hypoch. BONETI Sep. T. I. S. II. obs. I. 4. 5. 6. 11. 13. 15. 30. app. 6. 36. FR. HOFFMANN de vom. §. 28. DODON. obs. 26. GALEN. de loc.

ad l. 5. c. 5. VOGEL §. 263. BIANCHI h. h. T. 2. p. 338. FOREST. obs. 20. AMATI LVSIT. c. 4. o. 83. LORRY de melanch. I. 270. SAUVAGES hepatalg. sp. 3. melaen. sp. 3. 4. 5.

ATRA BILIS.

Est vel cum physconia hepatis, vt tumor hypochondrii dextri adpareat, quod est in iunioribus, vel cum hepatis constrictione spasmodica, hepatosclerysmate, hepatophthoë.

CAVSSAE.

Communes: bilis adusta, viscida, retorrída, ob labores, sudores, calorem summum, rel.

ENERGIA.

Rara per haemorrhagias, nec semper satis tuta, intermittens.

CURATIO.

Indicationes communes.

Huc, nisi quid obstet, emetica repetita, et plantae amarae, eccoprotica, diuretica, martialia.

D. SPLENEMPHRAXIS. Infarctus lienis ^{b)}.

Initio grauitas in hypochondrio sinistro, dein dolor acutus, maxime sub ambulatione citatiore, lien tumidus, abdomine, genubus flexis, explorato, animus melancholicus, habitus macilentus, color faciei liuidus, flauo, sed obscuro colore deformis, maxime si color ille oculorum nitorem non inficiat, papulis vultus cutis deformatur, rubescit nasus, rhinorrhagia, praecipue ex laeua nare, lassitudo, dyspnoea a motu, interdum superueniunt tussis sicca, palpitatio, hypochondriasis, bulimia, haemorrhoids, melaena, haematuria, ascites, anasarca, physconia splenetica, melasicterus, scabies, tetartaea, tetartophya, coeliaca, pneumophthoë. Virescunt, imo nigrescunt aliquando vrinae, faeces alui duriores sunt, atrae, et, si malum augetur, dolores in diffitis partibus sentiuntur ferocissimi, liene ipso vix sentiente, in quo materia penitus corrupta, *pus lienis* SIMSONO dicta, reperitur.

CAVS.

b) SENNERT. l. 3. p. 4. c. 3. de Med. Mars et Juill. 1758. obs. BONETTI S p. obs. 3. de icter. VALSE. l. 2. 1756. 1757. Janv. HALLERI in HOLLERIVM. ZACVTI pr. l. 3. diff. path. T. 4. d. 119. LORRY de obs. 13. TVLP. l. 2. c. 30. Journ. mel. l. 272.

ATRA BILIS.

CAVSSAE.

Communes; catameniorum, haemorrhoidum, imo fonticuli, ulceris suppressio, quartana saepe recidiva (nisi haec morbi progenies).

ENERGIA.

Haemorrhagiae saepe cricicae.

CURATIO.

Indicationes. Communes.

E. GASTREMPHRAXIS. Vasorum ventriculi infarctus ^{c)}.

Signa atrae bilis, dolores ventriculi, locum aliquoties mutantes, renes plerumque, interdum totam dorſi spinam in consensum trahentes, post partum incrementum, mire in primis exacerbantes post alimenta, aut potulenta, calefacientia, appetitus ciborum inaequalis, remissio, exacerbatio sine manifesta causa, caloris interni sensus, incrementum dolorum post purgationes, macilentia, decoloratio, debilitas, frequens sensus deliquii minantis, hypochondria turgida, haematemesis, melaena, haemorrhoids, metrorrhagia, rel.

Causae communes. *Energia.* Haemorrhagiae. *Curatio* communis.

F. ENTEREMPHRAXIS. Intestinorum, mesenterii, infarctus.

Cum signis atrae bilis, dolores colici, lumbago, tympanitis, haemorrhoids, metrorrhagia, melaena, leuantes.

Causae, energia, curatio communes.

G. METREMPHRAXIS. Infarctus vteri ^{d)}.

Cum signis atrae bilis, hypogastrii tumor, pondus, gradiendi, truncum ad anteriora flectendi, difficultas, dys-

me

c) TISSOT ep. p. 62. KAEMPF d) ASTRYC de morb. mul. 1
d. de infarctu vasor. ventr. in BAL- 2. c. 8.
DING. coll. diss. pract. vol. 3.

ATRA BILIS.

metrorrhoea, haemorrhoids, sterilitas, hydrometra, ascites, hæctica.

CAVSSAE.

Communes, maxime dysmetrorrhoea ab ætate L. ann.

ENERGIA.

Metrorrhagia, haemorrhoids.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

H. COMPLICATA ABDOMINALIS.

Hepatis, lienis, pancreatis, ventriculi, reliq. infarctus coniuncti. Signa atrae bilis et huius, illius, infarctus coniuncta. Hysteria, hypochondriasis, paralyfis, febris, maxime tetartaea, tetartophya, anasarca, coeliaca, physconia, ascites, aurigo, melasicterus, rel.

II. DYSARTHRTIS, arthritis vaga *auct.* arthritis irregularis CVLLENI c. spec. *atonica*, *retrograda*, *aberrante* ^{e)}).

Morbus haereditarius, aduentitius, designatus per praegressam atram bilem, molimina, arthritidem, s. rheuma, excitandi, vt tamen energia minor sit, hinc aegritudo ingens, cum vomituritione et cardialgia, artuum improuisa anodynia et facilitas ad motum, praegressis obscuris, interdum vrentibus, sed fugacibus articulorum doloribus, lassitudine post somnum et motum insueta, sudore vrente, acidum olente, papulis miliaribus cutim obsidentibus, titillatione erronea in facie, maxime in fronte, vultus colore flauo, fusco, stranguria cum vrina vel tenui, et spiculis quasi salinis referta, vel albicante, sedimentum album laeue, pingue per floccos deponente, filis natantibus praedita, recenter emissa.

CAVS.

c) Prax. I. §. 482. sq.

DYSARTHRTIS.

CAVSSAE.

Iam dictae, aliquantum maiores, dispositio diu persistens, et occasio, arthritidi (verae) producendae non sufficientes.

ENERGIA.

Morbus vel reducitur ad atram bilem, vel transit in arthritidem, aut tollitur maxime haemorrhagiis criticis.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Si nil impedit, nec subest haereditaria diathesis, nec aduentitia diu iam persistit, nec energia expectanda, morbus reducendus ad atram bilem.
2. Aut saltem videndum, an haemorrhoidibus tolli possit?
3. Aut si nec hoc, arthritis vera admittenda.
4. Maxime quum subiectum antea arthritidem (veram) iam sustinuit, aut maius periculum timeri deberet a passionibus excitatis, arthritis excitanda, quod fit, praemissa, si opus est phlebotomia, vesicatoriis, sinapismis, loco adfecto applicatis, empl. oxycroc. cephal. et burgund. pice, vel balneis calidis, pediluviiis, manuluviiis, dein tumor panno molli vestiatur.

III. ARTHRITIS, vera, vaga, *auct.* f).

Morbus haereditarius, acquisitus, etiam per contagium, sapientibus, diuitibus, capite magno praeditis, aetati virili, sexui potiori, et sequioris aetati virili ad annos 40 seq. maxime plethoricis, mature baccho et veneri litanibus, ex vitae genere laborioso, animi pathematibus obnoxio, tranquillae se dantibus, voracibus, cibos non masticantibus, cibis dyspeptis, acidis et vinis acidis abundantibus, magis familiaris, quam aliis, derepente fere numquam adoritur, sed post speciosam secundae valitudinis formam, edacitatem, imo atram bilem, dysarthritidem,

f) PAVL. AEGIN. l. 3. c. 78.

ARTHRITIS.

dem, aut lithiasin, mox dicendam, nascitur cum languore, animi deiectione, non raro febris, seu horripilationibus, aut rigore, calore, siti, cephalalgia, carebaria, vigiliis, respiratione difficiliore, lingua muco subflavo, laxius adhaerente, per multos dies colorem suum non mutante, tecta, urina varie cruda, aluo adstricta, dyspepsia, anima foetente, excretionibus putridum olentibus, adiapneustia, stupore, dolore, (qui ope caloris et fotuum, et recursum mitigatur) gongrona pedis, praecipue vere et autumnino, si recens, pluries vero iam euanida omni fere mense. Cum frigore dolor calcanei aut primae phalangis pollicis pedis, deinde calor, dolorem comitans, partis adfectae rubor, tensio, phlegmone, per aliquot dies persistentes, verbo podagra, seu passio, huic morbo praecipue familiaris, oriuntur, ita, ut dolores noctu aut vesperi in primis molesti sint. Quum vero ad alias partes morbi impetus transit, primum remittit in parte adfecta, nec ad hanc redit, in inueterato autem morbo omnes saepe articuli impetum sustinent. Post finem passionis in morbo recenti partes adfectae motui suo peragendo sufficiunt, in inueterato vero contractura accidit, dum et deinde arthritis lithiasin sibi adiungit, qua fit, ut concretiones calculosae in superficie articulationum adfectarum externa, plerumque sub cute gignantur, accedente plerumque nephro aut cystolithiasi.

Morbus recens plerumque podagram unius, tum alterutrius pedis passionem, ubi recurrit, imo chiragram, coxendicem, rachialgram, rel. inducit: recurrit vero omni anno 3. 2. 1. vere et autumnino.

- A. Est vero *actiua*, *acuta*, *febrilis*, quae stipatur doloribus articuli, quorum vehementia pari passu cum exacerbatione febrili incedit, quae instar remittentis biliosae fit, corporis vero functiones internas, animique vires minus laedens, quam aliae continuae solent. Plerumque

ARTHRITIS.

que haec per aliquot hebdomades affligit, raro intra paucos dies terminatur. (Soluitur ephidrosi, urinae sedimento, suppuratione, abscessu vel enuresi purulenta.) Huic robustiores praecipue obnoxii sunt.

B. *Passiva, chronica, apyreta*, febris nulla, nec doloribus adeo atrocibus stipatur, licet artus ad motum omnem, citra doloris augmentum subeundum, aequae inepti sint atque in A. Huic languentes ob senium, aliamve causam, quibus serum abundat, et quorum corpora ad febres minus procliuia sunt, obnoxii sunt. Stipatur doloribus mitioribus in locis, arctis limitibus circumscriptis, nec facile rubore, tumore, calore, magnis, pars corripitur adfecta.

CAVSSAE.

Communes iam dictae coniunctionis, atrae bilis, dysarthritidis, et morbum et paroxysmum efficiunt, ut tamen languor in hoc morbo praecipue adesse videatur, quare etiam remote morbum arcessit usus vini acidi, tenuis.

ENERGIA.

Passiones, podagra, chiragra, gonagra, rel. fere criticae sunt in haereditario et recurrente morbo, et per decursum sollemnem peptis fit, aut pepasmos per urinam, *diaphoresin*, citius et perfectius, quam in dysarthritide, criticas, aut ptyalisinam arenulosam, aut lithiasin, maxime concretiones iuncturarum g).

CURATIO.

Indicationes.

a. In morbo praesenti, paroxysmo.

1. Phlebotomia, in plethoricis, instituenda.

2. Aluus,

g) Dyspepsia est non raro tanta, ut haec ipsa morbum reducat ad dysarthritidem, dum impetum omnino criticum ad artus et energiam impedit, quare vomitus acidus, huius rei testis, levans,

dyspepsiae et dysarthritidi medetur, ut tum energia succedat. Nec tamen ideo morbum acido tribuas. Languoris etiam testis est ephidrosi acida.

ARTHRITIS.

2. Alius, quamdiu putrida prodeunt, eccoproticis euacuanda.
3. Diaeta simplicissima adhibenda, vt decocta auen. hordeat., panis bis coctus, fruct. horaei, cerasa, pruna, pyra.
4. Phlegmone moderanda hirudinum adplicatione.
5. Adiapneustia partis fugienda, hinc pars, passione adfecta, pannis laneis calidis, cera viridi et terebinth. obductis (grün Wachstuch) fouendus.
6. Dolores maiores anodynis refraenandi.
7. Diaphoresis per decocta ex rad. sudorif., aut diuresis ex dict. rad., tum, milleped., alcalinis fixis, promouendae, indicante pepasmo.
8. Deinde vel acidum Halleri ad guttas v. ex aquae communis vnciiis tribus quotidie ter vel quater, vel spiritus vitrioli acidi guttae XX. ex vnciiis tribus aquae et salis tartari grana XV. ex vnciiis tribus aquae, quotidie ter fumantur.
9. Diaeta lactea, abstinentia ab vsu carniū, spirituosorum, exercitatio, admittenda.

b. Extra paroxysmos.

1. Res sex non naturales maxime sic dirigantur, vt sint contrariae causis.
2. Refrigeratio euitanda.
3. Corpus roborandum balneis, cortice, marte, rel.

III. LITHIASIS ^{h)}.

Morbus haereditarius, congenitus, aduentitius, primarius, secundarius, vniuersalis, topicus, stipatus scil. vel atra bile, vel dyfarthritide, vel arthritide, vera, aut ex causis, parti tandem familiaribus, vel speciebus etiam morborum dictorum, natus, variat sede, vbique tamen largi-

^{h)} Mem. de l'ac. de Berl. 1755. p. 24 sq. Comm. Lips. VI. 628. Hist. de l'ac. des Sc. 1758. p. 421 sq.

LITHIASIS.

largitur calces, colore, odore, sapore, compage, analysi chemica, seu principiis constitutivis, conuenientes inter se, epigenemata excitans varia pro differenti sede.

CAVSSAE.

Dictae communes: aetas omnis, sexus vterque: depositio materiae cretaeae, calcareae, ad ossa impedita, in sanguine detenta, solida, cauis corporis vel ex depositione corporis intrinseca, vel extrinsecus illata, maxime ad systema vropoeum, biliferum.

ENERGIA.

Soluuntur et eliminantur interdum e corpore; et quod huc ducere non dubito, corpus permittit, vt ars calculos ex cauis eximat, quod tamen aliquando senium aut infantia vetant.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Calculorum genesis prohibenda per caussis adversam dietam.
2. Calculi detecti soluendi, auferendi, quo lithontriptica atque operatio chirurgica.
3. Excernendorum iter facilitandum lubricantibus.
4. Passionibus grauioribus occurrendum.

SPECIES ET VARIETATES.

Enumerandae praecipuae.

I. ENCEPHALOLITHIASIS.

Calculi deprehenduntur in *sinibus frontalibus* (cephalaea, hemicrania) *in falciformi, plexu choroideo, glandula pineali* (amentia), *cerebro* (amentia), *iuxta nervum opticum* (amaurosis), *in auribus* (dyscocia, cophosis), *in naribus* (anosmia, psellismus, rhinodysochia), *in oculo* (amaurosis, cataracta) ⁱ).

Signa

i) Lacrimae petrescentes. Zod. M. Gall. I. p. 63. 79. 97.

LITHIASIS.

Signa non satis definita sunt ante cadaueris incisionem,
praeter eam in oculo.

CAVSSAE.

Vel generales, communes, vel praeterea passiones encephali,
apoplexia, paralyfis, rel.

ENERGIA.

Vix locum habet, nec

CVRATIO

Nisi in cataracta.

2. STOMAPHARYNGOLITHIASIS: Lithiasis oris, faucium, cet.
Reperiuntur etiam concrementa calculosa *ad dentes* ^{k)}
(stomadyfodia, stomacace), *sub lingua* (ptyalismus, angina), *in ductu salivali* (stenostegnosis), *in tonsillis* (tussis
gutturialis), *palato* (dysphagia), *oesophago* (dysphagia),
Cartilagin. laryngis (raucedo), *glandula thyreoidea*.

CAVSSAE.

Communes, praeterea tamen haustus puluerum lapidosorum,
frequens, hinc familiaris molitoribus.

ENERGIA.

Rara, ptyalismus puluerulentus.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

3. THORACOLITHIASIS.

Pertinet huc membranarum, vasorum, cartilaginum induratio in osseam seu calculosam substantiam, vt *pleurae* (dyspnoea), *cordis* (palpitatio, carditis, cardiognus, dyspnoea, peripneumonia), *valvularum eiusdem* (trachelophyma, palpitatio, dyspnoea, hydrothorax, peripneumonia), *aortae* (dysphagia, aneurysma, palpitatio, dyspnoea) *costarum cartilaginum* (pleurodyne, dyspnoea), *cartilaginis ensiformis* (dyspnoea), *bronchiorum* (dysphagia, dyspnoea) in os induratio ^{l)}.

a. PNEV-

k) STOELLERI obs. 3.

l) In mamma. HALLERI ep. pathol. obs. 42.

LITHIASIS.

2. PNEVMOLITHIASIS ^m).

Calculi, in pulmonibus nati, similes sunt materiae, in iuncturis concrefcenti, cretacei, tophacei, friabiles, instar pumicis leues, raro praeduri, aut filicea duritie, pondere vario, interdum ad scrupul. I., alias aequantes iuglandem, ouum columbinum, os mali perfici, aut pisi, ciceris, fabae, magnitudine, numero etiam vario, aliquando ad 40 vsque, alii laeues, alii asperi, aculeis instructi.

Quibus adfectos expertos esse passionibus, rarum est; plerumque enim inducunt asthma, orthopnoeam, tussim diuturnam siccam, pleurodynem, pleuritidem, haemophthoën, (dolorem pectoris, quasi a clauo infixo, pertinacem, immotum, grauitatem). Initio pneumophthoës cum haemoptysi contingens horrendus thoracis dolor, nosognomonicus est, ob varias historias editas MORTONO. Ab asperis transiectis mala tracheae varia.

CAVSSAE.

Communes, haustus puluerulentorum.

ENERGIA.

Aliquando reiectio calculorum.

CVRATIO.

Generalis.

4. ABDOMINALIS.

2. HE-

m) ALEX. TRALL. — PAVL. AEGIN. l. 3. c. 28. 31. I. RHODII obs. C. 2. o. 3. H. MEIBOM. ex med. de obs. rar. n. 20. 21. E. N. C. dec. 1. a. 2. obs. 181. sch. dec. 3. a. 3. obs. 71. 72. 248. 109. dec. 1. a. 6. obs. 221. A. N. C. T. 4. obs. 49. T. 5. o. 68. SCHENCK obs. med. l. 2. F. PLATERI obs. p. 180. WILLIS pharm. rat. T. 2 S. 1. c. 6. p. 87. CVRATIVS in MYNDINI

anat. c. 34. BENNET th. tab. p. 110. BORELL C. 1. obs. 67. LIEV-TAYD hist. an. med. L. 1. obs. 253-278. A. A. F. pr. A. T. 5. p. 516 sq. FABRIC. HILD. c. 2. o. 29. MORTON phthif. l. 3. c. 6. Comm. L. Nor. 1743. h. 13. n. 2 BOERH. prael. in inst. §. 635. MORGAGNI XV. 19. sq. Adv. med. pr. III. 751. SAUV. l. c. STOLL. III. 58.

LITHIASIS.

α. HEPATOLITHIASIS ⁿ).

Raro hepatis parenchyma occupant calculi, plerumque in ductibus hepaticis haerent. Signa complicatae plerumque cysthepatolithiasis: videntur tamen inferri: haemorrhoids, mariscae, metrorrhagia, haematemesis, dysenteria, aliquando ponderis sensus in hypochondrio dextro, aurigo; praegressa atra bilis, dysarthritidis forte lumen dabunt.

CAVSSAE.

Communes v. et *cysthepatolith.*

ENERGIA.

Vix vlla, nisi quod calculi interdum ex ductibus hepaticis resoluantur et eliminantur.

CVRATIO.

Indicationes communes.

β. CYSTHEPATOLITHIASIS ^o).

Calculi cystidis felleae constant materia biliosa, flavi, leues sunt, et facile ignem concipiunt: sunt tamen et graues, ignem non concipientes, compacti, nigri, calculi; *colore* sunt flauo, dilute croceo, albido, cinericeo, nigricante, atro, fusco, caeruleo, viridi, variegato, coloris expertes, pellucidi, instar crystalli, et splendescentes; in cauo cystidis reperti. *Numerus* variat,

n) BONETI sep. f. 17. obs. 13. §. 1. 2. 4. 6. 7. f. 18. obs. 4. rel. FOREST. L. 19. o. 14. COLVMBI anat. l. vlt.

o) DONAT. hist. med. mir. l. 4. c. 30. VESAL. de rad. chin. FALLOP. obs. anat. STEPHAN. in diss. part. c. h. l. 3. c. 42. COLVMBI anat. l. vlt. COITER obs. anat. HALLER. op. min. T. III. p. 323. v. SWIETEN §. 950. MORGAGNI XXXVII. 15. sq. LXV. II. Mem. de Pac. de chir. I. 177. BONETI sep. t. 2. f. 8. obs. 31. 32. 33. 4. 5. 6. 8. 9. 22. 23. 25. HALLER in

BOERH. III. 166. MORTON. phthis. l. 3. n. 13. Zod. Med. Gall. 2. 1. m. mai. obs. 6. MEAD. mon. p. 159. Journ. de Med. 1755 BIANCHI hist. hep. l. p. FR. HOFFMANN de spasmo a col. bil. §. 1. obs. 1. de MEYSERREY n. 419. TH. COE tr. on biliary concret. or stones in the Gall bladder and ducts. Lond. 1757. 8. Prodr. act. Hafn. p. 124. SABATIER d. de var. calcul. biliar. speciebus. Monsp. 1758. 8. Comm. Lips. VII. 26. 483. Rec per. T. 5. p. 346. T. 6. p. 216. Z. VOGEL obs. med. chir. p. 155.

LITHIASIS.

variat, dum aliquando fuit vnus, non raro plures, vt MENTZELIVS P) vltra mille numeraret, imo STORCHIVS q) vltra 2 millia et FASCHIVS r) 3646. granula reperirent. Variat et *pondus*, maxime secundum numerum, dum vnus, vel aliquot ouum columbinum, vel semiouum gallinaceum adaequant, alias cicerum, vel milii seminum magnitudine deprehenduntur. Variat et *figura*, quae est sphaerica, oualis, angulosa, maxime ob adfrictum obtusa, rarius acuta.

Frequentat haec magis, quam nephro- aut cystolithiasis, et frequentius in quibusdam regionibus, potissimum ad fluuies, maximeque in senescentibus occurrit. Non raro impune fertur, aut dissimulatur, alias infert passiones varias, prout varia est calculorum sedes et copia. Igitur

a. *Si calculi haerent in vesica fellea*, producuntur: hepatitis, cystica, icterus, melasicterus, praecipue periodicus, vomitus, colica, hepatalgia, f. grauitas vel dolor acutus, tensiuus, in regione hepatis, ad cartilaginem ensimormen extensus, atrox, a pastu auctus dolor, etiam in humero et brachio dextro, rheumatico similis, anxietas, tormina, a motis calculis aucta; linguae et cutis siccitas, virium prostratio, obstipatio, cystidis hydrops biliosus, (qui innotescit hypochondrii dextri tumore, digitis prementibus facile obedienti, mobili, et vel hepatis, et adiacentium partium inflammationem male inducit, aut calculis solutis diarrhoea biliosa soluitur, aut ruptura cystidis) ruptura, vlcera, excrescentiae, crassitudo eius membranarum, rel.

b. *Si calculi haerent in ductu cystico aut choledoch*, oriuntur: regionis vesiculae felleae *dolor*, acutus, fixus,

p) E. N. C. dec. 1. a. 9. obs. 181.

r) A. N. C. T. 5. obs. 68.

q) C. L. Nor. 1735. h. 59. n. 4.

LITHIASIS.

fixus, profundus, subitaneus, certis interuallis exacerbatus, ad cordis serobiculum extensus, sine febris et inflammationis signis, nausea, vomitus, syncope, anxietas vehemens, obstipatio cum faecibus albis argillaceis, colica, icterus, melasicterus, rel.

CAVSSAE.

Communes, maxime humorum, hepar transfluentium, visciditas, hepatis vitia varia, in primis robur infirmum, obstructio, sclerysina, imo thoracis vitia diuturna, tum atrabilis, dysarthritidis, arthritidis, aliaeque lithiasis species.

ENERGIA.

Interdum cum leuamine calculi per ductum choledochum et communem in intestina transeunt, vbi vero morati incrementa sumunt, euacuati autem morbum vltius declarant, si signa dicta praesto fuerunt, aut et iam sunt,

CURATIO.

Indicationes communes.

Ad 2. comm. Huc lithontriptica non irritantia, vt fucus gramin. rec. tarax. crem. tartari, rel. Imo lithotomia locum habet, quando vesicula fellea peritoneo arte adhaeret, cuius vero adhaesionis ambigua signa sunt, et nisi adhaeret, aut frustranea est, aut vlcus, vel fistula, remanent: aut vlcus sponte excitatum calculi extractionem permittit.

Ad 3. comm. Conueniunt diluentia, demulcentia, anodyna, imo sub grauiori dolore opiata, non neglectis externis inunctionibus, fotibus, balneis, enematibus similibus. Fuga emeticorum, cathartorum commendanda potius, quam suadendus est eorum vsus,

β. b. Simulata.

Aut dysarthritidis, aut arthritidis incipientis, aut alius morbi progenies, nititur spasmu cystidis et ductuum.

Diagnosis

LITHIASIS.

Diagnosis difficilis est, signa tamen morbi praesentis lumen dabunt.

β. c. *Lithiasis tunicarum et glandularum cystidis felleae* ^s).

Cadauerum solum incisione definitur: calculi deprehenduntur in cystidis cauo, membrana circumdati, connexa cum iis cystidis. Signa β. communia.

b. GASTROLITHIASIS ^t).

Genesis calculorum in ventriculo, gastrodyniam, vomitum, interdum concretionum lapidearum, strepitum in epigastrio, etiam palpando innotescentem, et cysthepatolithiasis symptomata inferre solet.

CAVSSAE.

Communes: deglutitio voluntaria lapidum, abusus absorbentium, nucleorum horaeorum fructuum deglutitio.

ENERGIA.

Vomitus.

CVRATIO.

Indicationes communes. An emetica? Ita videtur, nisi quid contraindicat.

β. *Callus membranarum ventriculi*: Ventriculus gypsea materia obductus.a. *Pylorus callosus* ^u).

Tribus circiter post pastum horis vomitus, anorexia, nausea, aluus tarda, obstipata, marasmus, durities quaedam in explorato ieiuno ventriculo, aegro supino et genibus flexis, in regione pylori, interdum in fine duodeni, aliisque locis.

CAVS.

s) Zodiac. med. Gall. l. 3. f. 21. obs. 4. §. 11. E. N. C. dec. 1. a. 3. obs. 45. Misc. Berol. vol. 4. ab ELERO. MORGAGNI l. 56. XXXVII. 21. 29. a. f.

t) DONATI h. m. m. l. 4. c. 30. SCHNEIDER de cat. l. 3. c. 7. RIVERO p. 566. Phil. Transact. 1741.

n. 459. 1678. n. 3. SCHENCK obs. Cl. ESCHENBACH obs. 9. p. 46.

u) FR. HOFFMANN §. 22. de vom. WILLIS. T. 2. p. 24. Zodiac. M. Gall. T. I. p. 46. BONETI sep. de vom. obs. 17. 18. 19. 20. Journ. de med. dec. 1756. nov. 1759. p. 409. BOEHMERI d. de vom. p. 117.

LITHIASIS.

CAVSSAE.

Communes, maxime abusus calidorum, vita sedentaria, situs, hypochondria comprimens, senium, gastritis male iudicata, rel.

ENERGIA.

Vix vlla.

CVRATIO.

Palliatiua, leuamen a lactis vsu.

c. ENTEROLITHIASIS *).

Diuerſae etiam a bilariis naturae, non inflammabiles, laminati, cretacei, asperi, bilariis maiores, anserini oui mole, in colo, coeco, recto inuenti, aut excreti sunt calculi. Lithiasis intestinorum infert colicam, ileum, rachialgiam, choleram, dysenteriam pertinacem, tenesinum, obstipationem, ischuriam, vrethralem; aliquando palpan-do deprehenditur durities notabilis in locis intestinorum, et suspicionem mouent causſae.

CAVSSAE.

Communes: praegressae cysthepatolithiasis, gastrolithiasis, abusus terreorum, nucleorum, lapidum deglutitio, faeces induratae.

ENERGIA.

Euacuatio calculorum per aluum.

CVRATIO.

Indicationes communes.

Enemata et hydrargyri deglutitio, praesertim in ileo, fa-
luti cedunt.

c. β. *Callus membranarum intestinorum γ*

Passiones similes praecedenti.

CAVS.

*) BALLON. conf. 1. 2. c. 24. BONETI sep. 1. c. obs. 14. 17. Journ. de Med. sep. 1758. p. 261. BENIV. de abd. c. 34. SAUV. ileus sp. 10. ei. colica sp. 15. N. A. N. C. T. 1. p. 241. Mem. de l'ac. de chir. T. 3. p. 55. 57. TH. COE 1. c. p. 130. Mem. de l'ac. des sc. de Berlin 1759. p. 35. HALLERI el. phys. VII. 1765. c. auct. cit. Ess. d'Edimb. II. 345. sq.
y) BENIV. 1. c. BONET. 1. c. A. N. C. T. 3. obs. 132. MORGAGNI XXXIV. 34.

LITHIASIS.

CAVSSAE.

Communes praetereaue enteritis, male iudicata.

CVRATIO.

Indicationes communes et scirrhi remedia.

d. SPLENOLITHIASIS ²⁾.

Lien calculosus, lapidosus, vel cartilagine obductus, experitur splenitidem, et ascitem infert, aut nullas passiones.

CAVSSAE.

Communes, lithiasae aliae praesentes, aut praegressae, maxime hepatis, praegressa splenitis male iudicata, tetartaea diuturna.

ENERGIA.

Vix vlla, nec plura spondet

CVRATIO.

e. PANCREALITHIASIS.

f. NEPHROLITHIASIS ^{a)}.

Calculi renales sunt *colore* vario, crocei, rubentes, albicantes, niuei, splendore nitido, pellucidi, nigri, rel. plerumque friabiles, sed et crystallina duritie. Cient aut nulla, aut pauca, tardeque comparentia symptomata, quod fit maxime, quum lente increfcunt, laeues sunt, renum vero substantia est dura, callosa, cartilaginea, aut nerui sensim hebetantur, lotioque superest transeundo via, rel. Saepius tamen excitantur dolor in lumbis fixus, stabilis, nisi per ilia ad peluim vel testes excurrat, saepe grauatiuus, interdum acerbissimus, infixi aculei more pungens, sub decubitu in partem adfectam minor, in oppositam, et post cibum adsumtum, et corporis exercitationem,

Q 2

au.

²⁾ BONETI sep. l. c. obs. 6. 7. MORGAGNI XXXVI. 14. sq. LXV. 11. Comm. Lips. VII. 112. Hist. de Pac. des sc 1758. p. 41.

^{a)} L. H. SCHVLZE d. de lithiasi

pr. ren fin. REICHEL d. de calc. ren MORGAGNI XL. 13 sq. LVII. 12. Journ. de Med. 1762. p. 247. HALLER op. path. obs. 34.

LITHIASIS.

augescens ^{b)}, ieiuno ventriculo et sub quiete remittens, verbo {nephralgia, febris nulla, utique initio, testis eiusdem lateris retractio, femoris stupor, trunci incurvatio, anorexia, flatulentia, nausea, vomitus, seu dyspepsia, hepatalgia, obstipatio, pulsus duri, parvi, depressi, pleurodyne, orthopnoea, dyspnoea, palpitatio, paroxysmi nephralgici recurrentes, dysuria, stranguria, frequenter affligens, excretio urinae, cruentae, muco, flocculis, membranis, sabulo, lapillis, refertae, post urinam tenuem, admodum acrem, paucam, dysuria, ischuria vera renalis, cystocele, cystobubonocoele, cystocolpocoele, parorchidium, abortus, physconia renalis, non raro nephropyogenia, aut vretero-cysto-vrethrolithiasis. Est vel morbus solitarius, vel comitatus cysthepato - aut cystolithiasis, arthritidisque verae ^{c)}.

CAVSSAE.

Communes, vulnera in regione renum, thrombi sanguinei, in renibus commorantes.

ENERGIA.

Calculi minores per diuresin non raro euacuantur, aut maior calculus dissolvitur, et sub arenae forma eliminatur.

CURATIO.

Indicationes, communes.

Calculi per nephrotomiam auferri possunt, dum abest nephropyogenia, ceterum lithontriptica laudantur, ubi euintentur diuretica acria. Iter per vretes, vesicam facilitate relaxantibus, anodynis, internis, externis, dictis ad cysthepatolith.

f. b. *Lithiasis substantiae renis* ^{d)}.

f. c. *Dis-*

^{b)} REGA tamen (de conf. p. p. 293.) „A postu colicus dolor augetur, secus vero in nephritide (calculosa), et in nephritide difficillime incumbunt in partem adfectam.

^{c)} Pars adfecta aliquando non vere lithiasi laborat, sed opposita, teste BAGLIV. op. p. 420.

^{d)} PROMT. HAMB. vol. XX. p. 1. p. 3.

LITHIASIS.

f. c. *Diffimulata* e).

Excitat signa cystolithiasis, vt tamen calculus in cysti-
de nec exploratione, nec catheterismo, reperiatur.

f. c. β. *Diffimulata* f).

Signa apostematis hepatis, a lithiasi purulenta renis.

f. d. *Simulata* g).

Dyarthriti hanc excitat, indeque, arbitror, explices,
cur multa dicantur esse lithontriptica, quae dyarthri-
tidi tantum medentur, quorsum procul dubio vna vrsi.
Calculus est tophaceus, cretaceus, friabilis, vt in dy-
arthriticis, vbi transit in f. a.

g. VRETEROLITHIASIS h).

Calculi renales, ad peluim et vretes delati, morati, vlt-
erius crescunt, et post nephrolithiasin inferunt dolores, con-
sentientes cum vretum itinere, aut sede calculorum, ischu-
riam vreticam, (vretum ampliationem nimiam).

CAVSSAE.

Dietae.

ENERGIA.

Aliquando calculi ad cystidem ablegantur, imo eliminantur.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

h. CYSTOLITHIASIS i).

Calculorum cystidis alii sunt murarii, gypsomurarii, gyp-
sei, ex lapillulis concreti, rufi, nucleo instructi, duris-
simi, rel. vel in vesica geniti ex materia, quae et
naturalis inest vrinae, adhaerenti materiae peregrinae,
glo-

e) BONET. sep. f. 25. obs. 10.
MORGAGNI XLII. 5. 3. 4.

f) SAUV. hepatalg. sp. 9. Journ.
de med. sept. 1762. p. 247.

g) FR. HOFFMANN T. 3. SY-
DENH I. 485. MUSGR. de arthr.

c. 9. et 17. p. 154. DE MEYSEREX
T. 3. n. 374.

h) MORGAGNI XL.

i) MORGAGNI XLII. v. SWIE-
TEN V. p. 1414 sq.

LITHIASIS.

globuli sanguineis, vel aliunde in vesicam pulsus, vel ex renibus, vteribus, delati ad vesicam et remorati, incrementa sumserunt in vesica. Passiones vel nullas interdum edunt, vel sequentes: dysuria frequens, vel periodica, vel continua, dolor acutissimus extremi glandis, a iniectione recrudescens, frequens, eaque iniucunda penis tentigo, in qua idem nec erigitur vere, nec crassescit, pondus assiduum in perinaeo et pube, cum titillatione vaga, incessus cruribus diuaticis, tenesmus frequens, exania, parorchidium, impotentia, sterilitas, stranguria, haematuria, maxime post equitationem vel unctionem in curru, subitanea, saepe inter mingendum accidens ischuria fugax, mutata corporis positione, in primis resupinato corpore, cruribus decussatis, cathetere, haud aegre reuocanda iniectione, vrina crassa, alba, turbida, tenuis, foetens, coloris obscuri, sanguine interdum et fibris innatantibus mixta citra vlcus, genitalium ab aegro saepe contrectatarum pruritus, catheterismo, exploratione, immisso in anum aut in vaginam in mulieribus, digito, detecta calculi existentia, cystitis, cystopyogenia ^{k)}).

CAVSSAE

Communes, nephrolithiasis, immissio rerum in cystidem rel.

ENERGIA.

Minor calculus aliquando expellitur, maior contractione vesicae interdum laeuigatur, vt, simul imminuta vesicae sensibilitate, minus molestus sit, et sic diu, insciis eodem laborantibus feratur. Facilius prodit in feminis.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

Lithotomia, maxime lateralis. In feminis natus in vesicae parte infima, ad vuulam, facile eximitur.

h. β. Si-

k) Calculus XXXIII. vnciar. Comm. Lip. I. 709.

LITHIASIS.

h. β . *Simulata*.a. *Arthritica* ^{l)}).

Est a dysarthritide.

b. *Nephrolithica* ^{m)}).h. γ . *Disimulata* ⁿ⁾).

Latet interdum calculus intra parietes membranae internae vesicae absconditus, quo fit, vt vel nec catheterismo, nec exploratione detegatur, vel hodie detegatur, cras abscondatur.

h. δ . *Vesicae internae incrustatio calculosa* ^{o)}).

Ischuria vesicalis.

e. *Vesica callosa* ^{p)}).

Haematuria, dysuria.

i. LITHIASIS COMPLICATA. *Nephro-cysto-cysthepatolithiasis* ^{q)}).

Syndrome epigenematum cysthepato- et vel nephro- vel cystolithiasis: et salus petenda a simplicibus.

Hanc complicationem BAGLIVVS inter consueta posuit, vt rationem quaereret, cur, existentibus calculis in vesica fellea, germinent quoque in vrina, et contra? et VATERVS, manifestum esse, dixit, causas vtrorumque magna ex parte esse communes.

k. VRE-

l) MORGAGNI XLII. 10.

m) Cf. nephrolith. dissimul.

n) PLATNER d. de calc. ad ves. adhaer. MORG. l. c.

o) SCHACHT instit. med. pr. l. 8. c. 2. et 8.

p) Aët. Helvet. Vol. I. p. 13.

q) MORGAGNI ep. an. I. 48. an med. XXXVII. 43. LVII. 12. BONETI Sep. l. 2. S. 4. o. 35. l. 3. S. 22. o. 1. S. 23. o. 4. §. 10. S. 24. o. 2. §. 12. o. 6. §. 4. o. 10. a. §. 4. S. 25. o. 9. §. 5. L. a FONTE conf. 134. HOECHSTETTER obs. dec.

10. c. 9. WEPFER hist. apopl. auct.

h. 13. Sch. n. 5. Aët. Havn. vol. 5.

o. 65. MORTON phthis. l. 3. c. 14.

h. 5. REVERHORST d. de mortu

bil. §. 56. BERGERI phys. l. I. c.

14. LANCIS. op. T. 2. d. 110. HOFF-

MANN obs. I. E. N. C. dec. 3. a.

9. & 10. o. 171. c. 3. o. 45. c. 9. o.

76. A. N. C. T. I. o. 20. T. 4. o.

49. T. 5. o. 129. Comm. Lips. Nor.

1734. h. 6. n. 6. 1735. h. 52. n. 4.

1743. h. 32. n. 3. BAGLIV. exp. c.

bil. opp. — A. VATER d. th. 8.

POHLII d. de proft. calc. adf. § 7.

LITHIASIS.

k. VRETHROLITHIASIS ^r).

In feminis, potissimum vero in viris, moratur interdum calculus in vrethra, per urinae accessum saepe ad plures libras auctus. Signa causarum, et palpo deprehenditur in viris corpus durum, vrethram distendens, in feminis digito aut cathetere, impotentia, sterilitas, ischuria, rel.

CAVSSAE.

Communes, praegressae nephro- cysto- lithiasis, vel res peregrina in vrethram immissa.

ENERGIA.

Minor non raro sensim per urinae vim expellitur.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

l. COLPOLITHIASIS ^s).

A dytlocia cytorhexis, inde urinae mora in vaginae fundo, dolores, tormina vaginae, incessus difficultas, sterilitas.

CAVSSAE.

Patent.

ENERGIA.

Ambigua.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

Non difficulter eximitur, sed facile renascitur.

m. HYSTEROLITHIASIS seu METROLITHIASIS ^t).

Vteri

^r) Phil. Transf. vol. LI. p. I. p. 304. BONETI Sept. med. L. 3. S. 26. c. 5. 12. 17. 18. 33. 34. 35. BENIV. obs. med. chir. c. 78. SCHENCK l. 3. o. 5. 7. MANGETI b. m. pr. T. I. p. 349. 351. A. N. C. T. I. o. 239. Mem. de l'ac. de chir. T. 4. p. I. T. 8. p. 334 sq. ACREL ch. V. T. 2. p. 56 sq. 77 sq. MORG. XLII. 42. HENCKELS Samml. v. Beob. II.

^s) De SAUVAGES II. 127.

^t) E. N. C. dec. I. a. 4. o. 65. Aët. Erudit. 1712. Aug. PVZOS tr. des acc. p. 139. Mem. de l'ac. de chir. T. 2. p. 130. Journ. de med. Juill.

LITHIASIS.

Vteri calculi sunt leues, albi, gypsei; designant sensus ponderis, dolorum grauatiuorum in regione vteri, lumborum, femorum, inter faecum deiectionem, claudicationem inferentium, pruritus ferinus vulvae et inguinum, iuxta femora, dysuria, ischuria vrethralis, grauiditas simulata perennis, sterilitas, dystocia simulata, leucorrhoea, etiam purulenta, hydrometra, metropyogenia, excretio calculi per vaginam.

CAVSSAE.

Communes, aetas, catameniis carens.

ENERGIA.

Aliquando sponte prodit calculus.

CVRATIO.

Indicationes, communes.

m. β. *Hysterolithus* u).

Superficieii aut magnae vteri partis induratio calculosa.

m. γ. *Grauiditas calculosa perennis* *).

Fetus, calculo obductus, per plures annos in vtero delitescens.

n. EPIPLOOLITHIASIS y).

A calculo omenti physconia, durities in loco, vbi latet.

CAVSSAE.

Communes.

CVRATIO.

Lithotomia.

o. MESENTERIOLITHIASIS z).

Calculi

Juill. 1759. p. 336. Comm. ac. Harlem. T. 3. p. 603. Phil. Transact. V. 9 p. 191.

u) DVNCAN pathol. 1. 2. C. L. N. 1731. p. 238.

*) F. PLATERI l. 3. p. 818. 1. G. WALTER obs.

y) PANAROLI pent. 3. obs. 10. Hist. de l'ac. R. des Sc. 1732. p. 34.

z) E. N. C. dec. 1. a. 1677. obs. 50.

LITHIASIS.

Calculi mesenterii, nigricantes, rel., excitant dolores vehementes ad latus lumborum, et ad femur, vel ad umbilicum, imo nephralgiam, progrediendi impotentiam, vomitum, nauseas frequentes, haemorrhoidem, obstipationem, extremorum frigus, rel.

CAVSSAE, CVRATIO.

Communes.

p. LITHIASIS VESICVLARVM SEMINALIVM ^{a)}.
Impotentia.

q. PROSTATAE ^{b)}.
Impotentia.

r. TESTICVLORVM ^{c)}.

s. IN PERINAEO ^{d)}.

t. OVARI ^{e)}.

u. ALIARVM CORPORIS PARTIVM, EXTREMORVM.

a. VASORVM MEMBRANARVM ^{f)}.

Non raro, etiam in iunioribus substantia calculosa vel in vasorum cauo, vel in eius membranis, *deponitur*; unde non aneurysma solum, si idem in arteriis, et alia mala ex abnormi circulatione oriuntur, quorum causa difficulter eruitur, nisi atra bilis, arthritis, aut aliae lithiasis species lumen dare possunt.

CAVSSAE, CVRATIO.

Communes.

b. TOPHI s. TOFI ARTICVLORVM ^{g)}.

Cal-

a) E. N. C. dec. 2. a. 6. o. 68.
MORGAGNI l. c.

b) MORGAGNI XLII. 37.

c) HALLERI diff. chir. t. 5. p. 558. DIONIS anat. p. A. A. f. pr. A. T. 5. p. 525. Zod. M. G. II. 74. Mem. de chir. T. 3. p. 332. *In scroto*, a fistula, Rec. Per. T. 9. p. 64. 65.

d) Mem. de chir. T. 3. l. c.

e) Coll. Franc. vol. V. p. 178 sq.

f) Act. Suec. vol. XI. p. 12 sq. Comm. Lips. III. 196. Comm. Litt. N. 173 l. 407 sq. 238.

g) Zod. M. G. I. 99. 173. Med. obl. and Inq. vol. I. p. 48 sq. Hist. de l'ac. des Sc. 1758. p. 430. AVICENNA Can. IV. fen. 7. tr. 3. c. 14.

LITHIASIS.

Calcareae concretiones ad iuncturas articulorum, tam superiorum, quam inferiorum extremitatum in arthritide confirmata, seu quae transiit in lithiasin.

Tentandi sales alcalini volatiles cum absorbentibus.

c. CORNVA h).

In melancholicis visa, certe huc pertinent, quod et indoles eorum testatur. Sunt concretiones calcareae, osseae, lamellatae.

DYSTROPHIA.

DYSTROPHIA est morbus haereditarius, congenitus, plerumque acquisitus, topicus, idiopathicus, designatus per partis oeconomiam, pro speciebus et sede diuersimode alienatam;

CAVSSAE.

Formalis est ex languore partis, humorem adductum, varia saepe qualitate peccantem, non sufficienter excludentis, mutantis, aut resorptione languida enata nutritio morbosa.

Remotae sunt, quae circuitum humorum debilitant, solidorum actiones imminuendo, obstructions producendo, hinc vita sedentaria, somnus protractus, tristitia, moeror, aer humidus, vita a parentibus exhaustis, syphiliticis, arthriticis, et morbo nostro laborantibus, adepta, vsus ciborum crassorum, dyspeptorum, rel.

ENERGIA.

Obtinet in morbo recenti, aduentitio, sub congrua diacta, per pepsin, imo pepasinon.

CVRA-

h) AVENZOAR l. 2. c. 5. FALLOP. epist. c. 7. INGRASSIAS de rum. pr. T. I. p. 336 SCHENCKII l. I. o. p. 12. DALECHAMP. ad PLIN. l. II. c. 37. SCALIGER ann. 199. n. 5. ad CARDAN. FABRIC. HILD. C. II. o. 26. 25. C. I. ep. 20. M. N. C. a. l. d. I. obs. 30. BARTHOL. C. I. h. 78. C. II. n. 26. OLAVS WORM. Mus. 3. c. 25. LORRY m. cut. p. 519.

DYSTROPHIA.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Fugiendae caussae, et his contraria sensim admittenda.
2. Humor, a nutritione congrua alienus, corrigendus sic, ne mutatione magis noceat.
3. Sub correctione, et hac absoluta, languori, vel vniuersali, vel particulari, aut vtrique, satisfiat.
4. Vbi licet et confert, operatio chirurgica conueniens instituitur. Cf. *Species*.

SPECIES ET VARIETATES.

I. SARCOMA.

Dystrophia, designata per nutritionem partis adauctam, seu excrescentiam.

A. GENVINVM. Tumor solitarius, cuti concolor, tarde increfcens, ad tactum aequabilis et duriusculus, indolens, a materia carnis aemula natus, variae figurae et magnitudinis, interdum stupendae molis. — Variat sede. Cf. pathol. spec.

B. FVNGVS. Tumor mollis, spongiosus, elasticus.

C. POLYPVS. Sarcoma lymphatico-membranaceum.

a. Narium ⁱ).

a. *Vulgaris*. Est ex substantia, glandulosam inter et carnosam media. — Num hic cariem supponit ^k)?

b. *Pituitosus*. Ex pituita concreta et inspissata. PALFYN.

c. *Proptomaticus*. MAYCHART. ^l). Ex prolapsu membranae pituitariae.

d. *Cysticus*. RVYSCH. Ex membrana vnica, seu capsula, humore viscido turgida.

e. *Ve-*

i) MORGAGNI XIV. 17. Journ. de med. Nov. 1763. RICH^t. chir. B. IV. 319. alii.

k) ACREL chir. V. p. 162.

l) ACREL l. c. p. 166 sq.

SARCOMA.

e. *Vesicularis*, ex vesiculis, sero plenis.

f. *Cartilagineus*. MEECKREN ^m).

b. Tubae Eustachianae ⁿ).

c. Cordis ^o).

Infert sensum ponderis et oppressionis in regione cordis, cardiogmum, habitualement palpitationem, anxietatem incredibilem, syncopem, lipothymiam, asphyxiam, dyspnoeam, orthopnoeam, asthma, peripneumoniam, haemoptysin, passiones capitis, apoplexiam, cachexiam, hydropem, phlegmatiam. Soluentia, saponacea, aqua calcis, solutio salis ammon. conducunt.

α. *Dextri* P).

Pulsatio venarum iugularium.

d. Faucium et oesophagi ^q).

Raucedo, dysphagia.

e. Arteriae asperae et bronchiorum ^r).

Dyspnoea, haemoptysis, tussis, pneumophthoë, reiectio polyporum, vasa pulmonalia mentientium, interdum ad annos durans.

f. Intestinorum ^s).

Concretiones lymphaticae, instar membranae villosae intestinorum, maxime sub dysenteria, obstipatio, enteritis.

g. Vte-

m) ACREL l. c. p. 166.

n) VALSALVA de aure p. 112.

o) BALLON. epid. l. 2. p. 144. TVLP. l. 17. RIVERII C. l. o. 82. C. PISO m. ser. p. 214. [SENAC de corde l. 4. c. 10. Hist. de l'ac. des Sc. 1704. p. 109. MORG. XXIV. 23. FELICE d. p. 128 sq. KLAUVNIG nosoc. obs. 22. BARRERE obs. an. ed. 2. p. 109 sq. Phil. Transf. n. 308. Aët. Helvet. vol. II. p. 123.

p) SAGAR cardiogm. sp. 1.

q) Aët. Helvet. l. 62. Hist. de l'ac. des Sc. de Par. 1754. p. 74. S. SCHMIEDER sch. de pol. oesoph.

Delit. 1717. et in HALLERI d. pr. T. VI. n. 258. Comm. Lips. l. 455.

r) GALEN. meth. med. l. 5. c. 15. TVLP. l. 2. c. 7. c. 3. BARTHOL. c. 3. h. 98. KAAW persp. H. p. 114. Phil. Transf. 1727. n. 398. 1731. n. 409. Journ. de med. Juill. 1759. p. 42. LIEVTAUD an. pr. T. 2. p. 297. Hist. de l'ac. des Sc. de Par. 1762. p. 53. Comm. Lips. XVII. 208.

s) Coll. acad. T. 3. p. 633. obs. 187. p. 588. MORGAGNI. XXI 20. XXXI. 18. sq. Mem. de l'ac. des Sc. de Berl. 1759. p. 39.

SARCOMA.

g. Vteri. CERCOSIS AETII ^{t)}.

Tumor carnosus in genitalibus mulierum, *non perforatus, undique liber, pyriformis, radice angustiore in utero nata*, plerumque *indolens, non reponibilis, nec compressibilis*, citra vesicae herniam comparens, leucorrhoea (a collo aut margini orificii adnato) et metrorrhagia (ab adnato interiori vteri faciei), dysmetrorrhoea, sterilitas, aut abortus, metrorrhagia a soluto. — Mulieres, viro vtentes, habent pro grauiditate; geritur citra incommodum sarcoma, vtero interno adnatum, et in lucem editum videtur corpus, vtero accommodatum, adiposum, solidum. Initio, dum totum vterum non replet, catamenia libere fluunt, dein vero supprimuntur, imo superueniunt phlegmatia, leucorrhoea, abortus, si cum vera grauiditate complicatur, tumque, et in partu tempestiuo, cauendum, ne auferatur pro placenta, et metrorrhagia inducatur. — Salus a sponte soluto, ligatura, sectione.

h. Vaginae. Ex rugis vaginae natus, symptomata similia.

i. Vrethrae. Non raro post gonorrhoeas, haemorrhoidem vrethrae: mictio bifurcata, dolores in vrethra sub mictione, resistentia ibi innotescens per candelulas, iniectiones, catheterisimum, dysuria, ischuria.

k. Vesicae ^{u)}.

Lumbago, ischias, haematuria, dysuria.

D. CYSTIDES. Tumores lenti, doloris expertes, ab humore, in folliculo proprio, vel alieno, praeter naturam collecto, oriundi.

a. Aneurysma. Cystis arteriosa.

a. Ve-

^{t)} A. N. C. vol IX. p. 59. Mem. 526. Comm. Lips. XIV. 88. 395.
de chir. T. 3. p. 518 sq. Journ. de ^{u)} Phil. Transf. vol. 47. p. 292.
med. Mars 1764. p. 246, dec. p. Comm. Lips. III. 35.

SARCOMA.

a. *Verum*, a dilatatione parietum vasorum ortum, tunicis integris.

α. *Externum*.

Tumor ad locum arteriae externae, figura ouatus, cylindraceus, lente increfcens, bafi plerumque lata, cuti concolor, par u u s cum ftrepitu preffioni cedit, ablata redit, et arteriae pulfus refert, maior autem, et coagulo repletus, fenfum formicationis creat, nec preffione imminuitur *).

β. *Internum*.

Aneurysma ad arteriam abfconditam aegre cognofcitur variis fymptomatibus, loco respondentibus, caufis praegreffis, infolita pulfatione, cordis motu turbato, et aucta fanguinis velocitate fere fuffocato v. c.

1. *Aneurysma cordis*, cor auctum, farcomaticum, cordis tremor, cardiogmus GALENI et EROTIANI γ).

Signa peripneumoniae, acutae, chronicae, refpiratio impedita, celeris, anxietas ingens aegrotorum, fub crebra membrorum iactatione, ftragulorum impatientia, magna palpitationum vis et frequentia, a leui cauffa cum lipothymiis aucta, leuamen a fitu horizontali, dysphagia, naufea, vomitio, cardialgia, tuffis, haemoptysis, oculorum nitor deperditus, genarum liuor, vngues manus, et pedes, plumbeo colore maculantur, ephidrosis frigida, pulfus celerrimi, aut pleni, viuidi, aut contracti, inaequales, thorax, in finiftra parte fupra cor percuffus, in magna circumferentia carnis percuffae fonitum edit:

fub

x) Eo validius pulfat, quo validius pulfat arteria, f. quo maior est et cordi proximior 2) quo minus et magis flexile est aneurysma. Inueteratum faepe turicas, et lamellas offeas adipifcitur, vbi minus valide pulfat, maxime fi eius cauitas concreto polypofo vel grumoso infarcta est.

γ) SCHENCK de verme cord. l. 2. o. p. 296. SENAC de corde. p. 414. Phil. Tranf. vol. LII. p. 1. p. 344. SAUV. Palpit. Sp. 1. 4. cardiogm. Sp. 6. MARCHETTIS obf. 49. AVENBRVG. l. c. § 49. p. 360. MECKEL in Mem. de l'ac. des Sc. de Berl. 1750. p. 163. fq. A. N. G. vol. X. p. 140. fq.

SARCOMA.

sub finem incidunt phlegmatia pedum, tibiæ, hydrothorax cum polydipsia, respiratio stertorosa sensim fatiscit, intermittit, cessat.

2. *Aneurysma auriculæ cordis* ^{z)}).

Respiratio difficilis, suffocatoria, ex decubitu, violenta pulsatio infra cartilaginem xiphoideam, pulsus imminuti, fere euanescentes, phlegmatia pedum.

3. *Aneurysma aortæ* ^{a)}).

Palpitatio, cardioginus, continua, a motu leuiori aucta, hæmatemesis, spasina, lumbago, dolor dorsi pulsatilis.

4. *Aneurysma coeliacæ, splenicæ* ^{b)}).

Lumbago.

Vtrumque factum est ambitu arteriæ æquabiliter distenso, aut vno solum latere quasi hernioso.

b. *Spurium*, a dilaceratione, vulnere, parietum ortum, sanguine aut in tunicas arteriæ, aut in adiacentem cellulosam, effuso.

α. *Diffusum*: emphysemati aut anasarcae non dissimile, quando sanguis ex arteria per contextum cellulosum in vicinarum partium interstitia excurrit, cito incref-cens et debili pulsatione conspicuum.

β. *Circumscriptum*: quando sanguis emissus in peculiari, a cellulari membrana, arteriam circumcingente, duriore facta, vel a superiacente aponeurosi, confecto sacco haeret, verum aneurysma facile simulans.

c. *Mixtum*: ab utroque α. et β. compositum.

d. *Simulatum* ^{c)}).

A ruptura venarum.

e. *Aneurysma varix* ^{d)}).

Ana-

z) SENAC l. 4. c. 4. n. 3. Journ. de med. Avr. 1760. p. 346. SAUV. card. Sp. 3.

a) SENAC tr. de cord. l. 4. c. 8. n. 6. BAGLIV. op. p. 403. BONET. Sep. T. 2. p. 573. obs. 35. SAUV. palp.

Sp. 8. hæmatem. Sp. 2. Hist. de l'ac. des Sc. 1760. p. 49.

b) Comm. Lips. XVI. 531.

c) Comm. Lips. XVI. 140.

d) G. HUNTER. Med. obs. and inq. vol. 1. p. 340 fq. vol. 2. p. 390. vol. 3. p. 110. vol. 4. p. 377.

SARCOMA.

Anastomosis, sectione arteriae et venae facta, inter arteriam et subiectam venam. In artu adfecto ad tractum arteriae tumor, arteriae pulsus naturali fortior, in loco laesionis, tremulus et inordinatus motus, sensum ebullientis aquae vel stridorem apis referens, ligatura supra tumorem iniecta evanescentes, non decrescens ligatura, infra eundem facta: ipsa arteria, in artu expansa, versus finem angusta.

- b. *Varix*. Cystis venosa, sensim oborta, coloris saepe liquidi, pressa, plerumque recedens, iterumque rediens.
 - a. *Solitarius*, ad nucis iuglandis magnitudinem saepe crescens.
 - b. *Nodosus*: in maioribus venis, earumque simul ramis obuius.

Sedes frequentissime in cruribus, potissimum feminarum.

- c. *Lupia*. Cystis, materiam spissam, vel solidescentem includens.
 - a. *Meliceris*: lupia, cui inest succus, mellis consistentiam referens.
 - b. *Atheroma*: lupia, cui inest concrementum pultaceum, grumosum.
 - c. *Steatoma*: lupia, cui inest sebi vel lardi similis succus.
 - d. *Ganglion*: cystis globosa, renitens, in cellulosa tendinum, materiem continens albuminosae similem ^{e)}.
 - d. *Hygroma*: cystis solitaria, a lymphâ sincera congesta, effusa, mollis.

E. *LIPOMA*: Tumor solitarius, mollis, inaequalis, indolens, immobilis, planus, ab aucta pinguedine.

F. *VERRUCA*: Excresecientia cutanea, vix sensibilis, interdum petiolata, modo gregalis, modo solitaria, varias partes obsidens, saepe solum topica, idiopathica.

G. *CLA-*

e) Meliceris matricem agnosce- restudinis, nomin venite; reliquae
retoter glandulam conglobatam, ca- e tela cellulosa in artubus occun-
pillitio maxime infesta, vbi talpae, rur, et maiori mole esse solent.

SARCOMA.

G. CLAVVS: excreſcentia calloſa, dura, pedum digitis po-
tiſſimum familiaris, in centro callum durifſimum gerens,
ex cuticula ad tendines, imo perioſteum, penetrans, fum-
mos dolores inducens, plerumque a compreſſione nata.

H. CONDYLOMA: excreſcentia cutanea oblonga, vel expan-
ſa, ſico aut criſtae gallinaee ſimilis, ad podicem et ge-
nitalia obuia, plerumque dolorifica, preſſione non muta-
bilis, e ſuperficie ſaepe ichorem fundens.

I. CARTILAGO. Excreſcentia (prolapſus) cartilaginis.

a. *Xiphoides* f).

Cartilago xiphoidea, ad umbilicum uſque continuata, ex-
citatur dolores, anhelitus interceptionem, metum deliquii,
ſub grauiori incuruatione dyſpnoeam.

K. CALLOSITAS. Tumor oſſium fractorum, ad commiſſu-
ras enaſcens.

II. SCROPHVLAE ff).

Morbus, endemius in Germania, Carinthia, Tyrol, Car-
niola, Thuringia, Hercynia, Weſtphalia, alpibus, Hel-
uetia, rel. neque in Hiſpaniae, Angliae, Italiae, cet. ter-
ris deſideratus, deſignatur per glandularum conglobata-
rum tumores, ſcirrho molliores.

A. CONSTANS.

a. RECENS.

In glandulis colli, axillarum, inguinum, ſubmaxilla-
rium, meſenterii, obtinent tumores, cuti concolores;
ſubiecta gaudent collo breui, temporibus preſſis, ma-
xillis largis, gingiuis contractis et induratis, ut dentes
elongati appareant, facies pallet, labium ſuperius et
colum-

f) P. CODRONCHI tr. de pro-
lapſu cartil. mucron. Bonon. 1603.

4. OL. BORRICHIVS in Aſt. Haſn.
vol. 5. H. 1680. L. SEPTAL. de m.
ex cart. mucr. prouen. Mediol. 1632.

4. TROSCHEL de al. ſitu viſc. abd.
§. 27.

ff) De HALLER el. phyſ. I. 193,
Comm. Lipſ. IX. 61 ſq.

SCROPHVLAE.

columna nasi tument, cutis laevis, nares rubent, atque emittunt acrem, labium superius erodentem humorem, ophthalmia, epiphora, mydriasis, otorrhoea, vřculcula oris summe prurientia, pneumophthoë.

b. VETVS.

Vlcera pertinacia, fordida, in variis partibus excitat, adgreditur ossa atque articulos, et cariem, exostoses, anchylofin, paedarthrocacen, inducit.

B. MESENTERICA.

In glandulis, praesertim mesenterii, intumescencia, physconia, aut ventris retractio, dein glandularum tumores, tactu distinguendi, lassitudo, pallor, morositas, inappetentia, pica, interdum anorexia, fitis nocturna, ieiuna aluus obstipata aut laxa, mucosa, chylosa, tormina, tenesmus alui et vrinae, faecum foetor insolitus, ascites, oedema, hydrothorax, macies reliquarum partium, tumor scroti.

CAVSSAE.

Communes, et formalis quidem reducitur ad acidi abundantiam, seu serosam cacochymiam, coniunctam cum visciditate, per solidorum laxitatem, inertiam; remotae, vřsus aquae, particulis metallicis, maxime vitriolicis impraegnae, aër stagnans, crassus, nebulosus, frigidus, fordities, vřsus ciborum crassorum, hinc pultis, solani esculenti.

ENERGIA.

Vti non raro per totam vitam impune tolerantur, praecipue mobiles, aequales, non valde durae, non inflammatae, nec suppurantes, ita pubertatis tempore non raro evanescent, quod et adultis contingit, aliquando tamen redeunt, imo solvuntur per diabetem, otorrhoeam, tineam, catarrhum, diarrhoeam, praesertim in iunioribus.

SCROPHYLAE.

CVRATIO.

Indicationes. Communes, praeterea,

1. Cauendae inflammatio et suppuratio, auertendo acrimoniam, ad scrophulas accedentem.
2. Causae formali, quae ad acidum redire videtur, opponantur, post emeticorum, resolv. vsum, antacida, vt absorbentia, cortex Peruv., limatura ferri: vsum aquae marinae, aut hanc imit. addit. magnes. et sal comm. ad aquam, adsumta simul omni altero die magnesiaesi dosi.
3. Specifica adhibeantur, vt cicuta, (belladonna) aqua marina in phlegmaticis, robustioribus.

III. SCIRRHVS.

Morbus, designatus per passiones, variantes per sedem infarctus, tumidi, (phymatis) duri, indolentis, grauantis, frigidi, partis, secretioni destinatae (infarctis potissimum vasculis fecernentibus).

Vbi pars adfecta, scirrhusa, angustioribus solito limitibus circumscribitur, et digito magis solito resistit, et grauat, et minus sentit, partis SCLERYSMA vocatur.

Malignum natum produnt augmentum molis, sensus pruriginosus, vel punctorius, imo asperitudo angulosa.

SPECIES ET VARIETATES.

1. DVRAE MATRIS SCIRRHVS g).

2. CEREBRI h).

Cephalaea, stupiditas, somnolentia, motus epileptici.

3. CEREBELLI i).

Cephalalgia, paraphrosyne, paralyfis artuum inferiorum, febricula.

4. PNEV-

g) Journ. de med. Avr. 1761. p. 315.

Comm. Lips. XV. 218. Mem. de l'ac. de Berl. 1761. p. 59 sq. 69 sq.

i) HARDERII apiar. obs. 58. BRIS-

h) WILLIS an. brut. p. 207. SEAV obs. 3. MORG. LXII. 15.

SCIRRHVS.

4. PNEVMOSCIIRRHVS.

Post alius morbi pneumoniam variam, nascitur, dum glandulae bronchiales et pneumonicae scirrhosae euadunt. Quiescente homine nec in pulsu, nec in respiratione, alieni quid conspicitur. Functiones naturales et animales legitimae, decubitus in vtrumque latus facilis. A motu parum fortiori anhelitus, a loquela productiori anguntur et languent, sicca asperitas in gutture, pulsus, ante moderate frequentes, iam celeres et inaequales: respiratio et sermo intercisa, suspiriosa: venae temporales, sublinguales et iugulares, lateris adfecti, solito magis inflatae. Latus adfectum sub respiratione minus mobile, sonus imminutus aut omnino suffocatus, tussis rarior, aut sine sputo, aut cum paucis, crudo, viscido.

Idem in pneumophthoën conuersus, seu resolutus, edit signa, quae vide sub pneumophthoë dystrophiae, sub pneumophthoë, vomica ichorosa, pyogeniae.

5. SCIRRHVS MAMMAE ^k).

Tumor minimus, pisiformis, admodum durus, initio mobilis, duritiæ et magnitudine crescens, contiguus, chordam etiam, seu filum tensum, referens, cuius superficies sensim durior et irregularis fit, initio facile tolerandus.

6. SCIRRHVS HEPATIS ^l).

Tumor, durities in hypochondrio dextro, dolor grauatiuus, obtusus, tensiuus, constans, decubitus in latus oppositum difficilis, dyspnoea, tussis sicca, inappetentia cum satietate a modico pastu, et pressionis sensus in stomacho: color faciei pallidus, cachecticus, auriginosus: vrina aurantii coloris, crassa, cum sedimento mucofo: successu temporis phlegmatia pedum, macies

k) BIERCHEN de c. p. 7 sq.

3. p. 165. SAUV. hepatalg. sp. 2.

l) HALLER Comm. in Boerh. T. et scirrhus, sclerysma sp. I.

SCIRRHVS.

macies partium superiorum, ascites, hæctica. Adfunt aliquando dolores atroces, vomitio, horum periodicus recursus, rel. Sequitur febres intermittentes, diuturnas, hæmorrhagarum suppressiones, contusiones topicas, vitam sedentariam, victum ex cibis crassis.

β. *Sclerysma*. Tumor nullus, durities in regione hepatis. In viuis distingui vix possunt ambo: quæ comitantur interdum aurigo, quartana, ascites.

7. SCIRRHVS LIENIS ^m).

Tumor durus, in hypochondrio sinistro, lienis figuram exprimens, sensus grauitatis, vel dolor acutus, maxime initio, color faciei plumbeus, macies, dyspnoea, sensus ponderis, iugulum deorsum trahentis ad sinistram, pressio stomachi a pastu, demum phlegmatia pedum, interdum vlcera tiliarum, epistaxis, quartana, cachexia, melaficterus, ascites. Sequitur quartanam.

β. *Sclerysma* ⁿ).

Tumor nullus, durities in regione lienis.

8. SCIRRHVS PANCREATIS ^o).

Dolor in superiori et media abdominis regione profundus, aut sensatio ponderis, ventriculo incumbentis, citra duritiem, aut tumorem hypochondriorum, inprimis corpore erecto et sub incessu, cardialgia, ileus, dyspnoea, tormina, obstipatio.

9. SCIRRHVS VTERI ^p).

Molesta sensatio ponderis in regione vteri, ibidem tumor

m) MANGETI bibl. pr. 1. 10. SAUV. splenalg. sp. 2. scirr. sp. 2.

n) Hist. de l'ac. R. des Sc. 1700.

o) EONETI sep. obs. 49. C. PISO de m. fer. p. 594. I. RHOD. C. 2. obs. 95. PANAR. ob. 14. KERK-RING obs. an. 43. JAMES dict. vniuers. T. V p. 328. Med. obs. and inq. vol. I. p. 107.

p) ASTRUC. de morb. mul. t. 3. c. 2. 5. PVZOS tr. des acc. N. CYRILLI C. 2. c. 37. SAUV. hysteralg. sp. 6. leucorrh. sp. 7. AETIVS T. IV. 5 VI. c. 84. PAUL. AEG. L. 3. C. 68. RHAZES ad mansor. L. I. c. 85. FABR. HILD. C. 2. obs. 66. MAVRIC. mal. des f. gr. T. I. l. 3. c. 12. T. II. o. 112. ROEDERERI d. de vteri sc. G. 1755.

SCIRRHVS.

mor durus, renitens, tactum tolerans, si digito vteri orificium tangatur, corpore refupinato et genibus flexis, et sursum propellatur, manu hypogastrio adposita, figura et durities vteri supra pubem percipitur, ceruix autem vteri crassior, breuior, aspera, in ambitu durior et aliquantum dolens obseruatur. Dolor grauatiuus circa podicem, et distensiuus circa vterum, inguina et lumbos, stante aegrota grauiore, dysuria, ischuria, obstipatio, accessus febrilis, inappetentia, leucorrhoea, catameniorum interualla occupans, metrorrhagia alternans cum dysmetrorrhoea, haemorrhoids, hydrometra, ascites, phlegmatia, physconia, grauiditatem simulans, hysteroptosis, inferiorum languor, paralysis, gangraena, aridura.

Oritur a dysmetrorrhoea circa ann. XL. seq. a lactis, lochiorum, gonorrhoeae suppressione, ictu vteri, catameniis subito suppressis: abortu, partu, inflammatione vteri. Salus a martialibus, mercurialibus.

IO. SCIRRHVS VESICULARVM SEMINALIVM q).

Ischuria vesicalis, impotentia ob semen serosum.

II. TESTICVLI r).

Obtinet magis in proprio testis corpore, quam in epididymide, et ad funiculum spermaticum non raro adscendit.

I2. SCIRRHVS OVARIi s).

Hydrops ouarii, demum enteritis.

I3. SCIRRHOSA INDVRATIO CELLVLOSAE SCROTI t).

CAVSSAE.

Communes: non raro alius morbi praegressa phlegmasia, non benigne soluta, compressio, constrictio, attritus validus, anthrax, vlcus praemature clausum, humor stagnans.

ENER-

q) GAVBII path. §. 77. MOR-
GAGNI XLVI. 5.

r) CALLISEN §. 380 sq.

s) Comm. Lips. XV. 39.

t) Comm. Lips. XV. 45.

SCIRRHVS.

ENERGIA.

Rara in recenti per resolutionem.

CVRATIO.

Indicationes communes.

1. Cauenda acrimonia, ne transcat, quod amat, in carcinoma.
2. Tentanda indicata, laudata ab auctor. clar.
3. Curatio palliativa instituenda, vbi per congrua resolutione morbus superari nequit, atque in congruis locis, vbi periculum nullum vetat, exstirpatio partis scirrhosae instituenda.
4. Specifica, vt cicuta, belladonna, externe et interne adhibenda.

Liceat, ob non incongruam similitudinem huc referatur:

III. STEGNOSIS. ANCHYLOMERISMA.

Morbus, designatus per sublatam aut imminutam actionem partium, concretarum vel ex vitio haereditario, aut congenito, aut aduentitio, ex errore lymphae, variam syndromen edentem pro vario loco, quem occupat. Morbus est plerumque secundarius.

CAVSSAE.

Lymphae, non assimilatae, maior copia, rel.

- a. SYMBLEPHAROSIS, *prophylsis* MAVCHARTI d.
Concretio palpebrae, potissimum superioris, cum oculi globo.
- b. ANCYLOBLEPHARON.
Coalitus palpebrarum.
- c. SYNISESIS. MAVCHART. WOOLHOVSEN.
Coalitus vuae labrorum, vt pupilla obturetur.
- d. SYNECHIA. MAVCHART.
Coalitus vuae cum limbo corneae.
Cf. Caliginem et ophthalm.

e. CON-

STEGNOSIS.

e. CONCRETIO CORDIS CVM PERICARDIO^{u)} ET DIAPHRAGMATE^{u)}.

(Cardiognus: palpitatio). Pulsus a motu inordinatus, auctus, interdum intermittens, initio saepe fortis, in fine debilis, respiratio anxiosa, vox saepe inopinato intercepta, carditis, palpitatio, haemoptysis, phlogosis faciei perpetua, anxietas insignis, ab abdominis expansione aucta, sensuum internorum turbatio, macies, seu nutritio deficiens.

f. CONCRETIO PVLMONVM ET PLEVRAE.

Pleurodyne, pneumonia, anhelatio varia: sed et nullum interdum symptomata.

g. ENTEROSTEGNOSIS^{x)}.

Post enteritidem, dysenteriam, vulnera: alui, inordinate succedentis, segnities, tormina ab vno loco consueo oriunda, colica, ileus.

h. ORRHOSTEGNOSIS. *Ani defectus, coalitus y)*.

Congenita. Abdomen moleste tenditur, intumescit, tormina acuta, nausea, vomitus, ileus, lipothymia interdum perpetua, inflammatio, febris, et intra 7. dies, nisi opem ferre possit chirurgus, mors. Variat, dum rectum

α. Adest seu contractum admodum.

β. Omnino clausum est membrana, et

1. *Patet in vaginam.* MAVRICEAV. STORCH.

2. *Patet in vesicam.* KALTSCHMIED, MANGETVS, MORAND, WRISBERG.

Faeces

u) b. MECKEL in mem. de l'ac. des Sc. de Berl. 1755. p. 58. Comm. Lips. VI. 630 Phil. Transf. vol. L. p. II. p. 550. III. p. I. p. 344.

adv. A. dec. 3. p. 17. HALLER disp. an. I. d. 15. Phil. Transf. vol. L. p. II. p. 550.

x) A. F. WALTHER d. de intest. ang. L. 1731. N. A. N. C. T. 5. obs. 2. DE HAEN R. M. RVYSCH

y) Vid. H. A. WRISBERG d. de coalitu intestini recti cum vesica Goetr. 1779. et auctores ibidem alleg. quibus et alii addi possent.

STEGNOSIS.

Faeces erumpunt per vomitum, vesicam; vaginam, in abdomen. Salus, si rectum integrum est, nec patet in vesicam, vaginam, aut penem, ab operatione, qua apertura efficitur in recto, aut in colo sinistro, vbi peritoneo accretum est ^z).

i. COLPOSTEGNOSIS. *Angustia seu concretio vaginae* ^a).

Coalitus vaginae parietum, vel labiorum vulvae, aut hymenis membrana aucta, aut caruncularum myrtiformium coalitus. Ischuriam, dysmetrorrhoeam, hydro-metram sanguineam s. peritoneorrhagiam (sanguinis ex vtero in abdomen effluxum) sterilitatem, aut dystociam infert.

k. PYELOSTEGNOSIS. *Angustia pelvis* ^b).l. PHIMOSIS. *Angustia praeputii* ^c).

Vel est congenita vel accidentalis: phimosis, impotentia, ob defectum eiaculationis congruae: ischuria vrethrica.

m. VRETHROSTEGNOSIS ^d).

In viris obtinet, non raro a praegressa syphilide, et enatis vscufculis, vrethrae angustia a tumore nimio glandularum adiacentium, varicibus, cicatricibus, eminentibus, seu carunculis duris, crispis, indolentibus, nimia intumescencia substantiae spongiosae: penis incuruatur sursum, aut ad latera, mictio bifurcata, ischuria

^z) Cf. OEHME diff. de morb. inf. chir. L. 1776.

^a) HORSTII obs. I. p. 508 sq. MORGAGNI LXVII. 9. HALLER el. phys. VIII. add. p. 212 SAUVAGES l. c. II. 393. ALBERTI I. M. III. 46. VALENTINI N. M. L. c. 3. p. 467. ZITTMANN C. 4. c. 39. VOGEL n. Bibl. II. 311. BOEHMER pr. de natur. fem. claus. Viteb. 1768. I. A. HEMMANNUS med. chir. Auff. II. rel. N. A. N. C. T. I. 343. 544. Comm. Harlem. T. V. p. 424. HIPPOCR. de nat. mul. §. 62. p. 401. II.

CELSVS VII. 28. Aët. Suec. XXVIII. 305 sq.

^b) V. art. obstetr. script.

^c) ARANT. de tumor. c. 54. SAUV. dyspermatismus sp. 3. et ischur. sp. 44.

^d) DE LA PEYRONIE mem. de l'ac. de chir. T. I. 415. PETIT. ib. p. 435. SHARP rech. crit. p. 205. ANDRE obs. p. 113. BERTRANDI RICHTERS B. I. 3. p. 53. SAUV. II. 405. Dyspermatis. sp. I & 2. LIEVTAUD c. m. pr. p. 533. ARANT. de tumor. c.

STEGNOSIS.

ria periodica, impotentia, ob erectionem et eiaculationem feminis incongruam. Cognoscitur catheterismo et candelulis.

ECTOPIAE.

ECTOPIA est partium solidarum e sede sua, continentibus vel relaxatis, vel ruptis, dimotio. Epigenemata pro speciebus varia ^e).

CAVSSAE.

Formalis est languor partium continentium.

Remotae plurimae, redeuntes ad dispositionem congenitam, haereditariam debilitatem topicam, structuram naturalem, aut praeternaturalem congenitam, vim externam, internam: relaxantium, vt olei, abusum, in coenobiis frequentem, animi pathemata, rel.

ENERGIA.

Aliquando restituitur pars herniosa, adiuuantibus viribus ipsius, et permittente situ congruo, aut a subitaneo animi pathemate, vt vteri prolapsus sanatus dicitur in anecd. de med. p. 72.

CVRATIO.

Indicationes.

1. Pars herniosa soluenda e loco nouo, et
2. Reducenda in locum debitum, denique
3. Firmanda in sede sua: nisi prioribus quid contraindicet, vt congenitum vitium; aut per indolem praesentem herniae fieri possit.

VARIAT INDOLE ET SEDE.

A. CAPITIS:

I. ENCEPHALOCLE ^f).

Cerebrum vel cerebellum, vel vtrumque, in infantibus ali-

^e) Est et periodica, vt hernia vteri, durante grauiditate sola. ^f) Comm. Lips. Nor, 1738. h. 52. n. 3. SAUV. sp. 1. Zod. med. Gall, a. 1681. obs. 2. p. 52.

CAPITIS.

aliquando ectopiam facit, vel congenitam, vel aduentitiam, seu protuberantiam mollem, fluctuationis tamen expertem, leuioribus stipatam symptomatibus, nisi occiput occupans, paralyfin, conuulsiones, carum, rel. inducat. Contingit sub ossificatione non absoluta, aut diachalasi.

2. DIACHALASIS g).

Non a vi admota externa solum, sed ab interna etiam, maxime in adultis et senibus, oritur, futurarum dimotio, alias, inflammationis cerebri, cephalalgiae, comes, inducit meningorrhoeam (externam), humorum, vt puris, iter ab externis ad meninges permittit, et sic, imo mortem inducendo, nocet.

3. BLEPHAROPTOSIS. MAVCHART. al. h).

Ectopia palpebrae vel vtriusque, vel alterutrius, elongatae, retractae, introuersae aut extrouersae.

a. PTOSIS. HEISTERI i).

Palpebra superior attolli nequit, hinc oculus vel nullo modo, vel non sufficienter denudatur, caligo.

Oritur 1° a vulnere. 2° a tumoribus palpebrae, pondere hanc deprimentibus. 3° a phlogosi aut 4° relaxatione palpebrae per serum abundans. 5° a paralyfi palpebrae, vel constanti, vel periodica k), vbi adfici simul solent eiusdem lateris maxilla, oculus, lingua.

Salus a remotione causae, et fotu roborante, spirituofo, operatione chirurgica.

b. LAGOPHTHALMVS l).

Palpebra alterutra abbreviata est, vel et vitium con-

g) PAVL. AEGIN. l. 3. c. 7. VOGELII n. 474. MORGAGNI III. 8. LI. 29. BONETI sep. l. I. S. 1. obs. 92. et Schol. et app. et STALPART v. d. WIEL C. I. obs. I. Sch. E. N. C. Cent. 10. obs. 31. ETTMVELLER pr. l. 2. S. 2. c. 3. a. 7. PLAT-

NERI d. de off. epiph. §. 37. HALLER ad Boerh. inst. §. 304. n. h.

h) SAUV. l. 166 sq.

i) MAITRE-IAN. S. YVES. DIONIS. PLATNERI. SAUV. sp. I.

k) Phil. Transact. 1738. n. 449.

l) SAUV. sp. 2. et ophthalm. sp. 17.

CAPITIS.

genitum vel causam retrahentem, quæ est musculi, palpebram referantis spasmus, vel cicatrix, vel exsiccatio, ab adstringentibus, et ophthalmiam non raro inducit, aut corneam exsiccatur, ut amittat pelluciditatem. Plerumque superiorem infestat.

Salus a remotione causæ, tractione in directionem contrariam ope emplastri, et operatione chirurgica.

c. ECTROPIVM ^m).

Palpebrarum, potissimum inferioris breuitas atque extrouersio, ut pars interior promineat, nec oculus sufficienter contegatur.

Oritur 1º a membranae internae laxitate, per diuturnum emollientium usum. 2º a protuberantia, intra palpebras enata. 3º a læsione per obstetricis digitos. 4º ab operatione ægilopis, si separantur tarsi in magno cantho. 5º a dialysi, dum per vulnus, vlcus, finditur palpebrarum margo, retractis et retortis fissurae angulis. 6º a cicatrice.

Salus a remotione causæ et operatione chirurgica.

d. TRICHIASIS. Dystichiasis. Phalangosis. Entropium. Ptoſis ⁿ).

Obuersio tarſorum cum suis pilis, ophthalmia.

Oritur 1º ab exterioris palpebrae phlegmatia. 2º a contractione internae palpebrae membranae ab humore acri.

Salus a remotione causæ, tum operatione chirurgica.

4. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi. v. pathol. special.

5. CERATOCELE.

Ectopia, seu tumor exiguus corneae, qui, recta inspectus, in medio pellucidus, sed subobscurus ac subrotundus, oblique vero inspectus, opacus est, annulum opacum refe-

^m) SAUV. sp. 3.

ⁿ) SAUV. sp. 4. et ophthalm. sp. 2. S. YVES c. 8. p. 98.

CAPITIS.

referens. Fit ab exesione tunicae interioris corneae, vt lamina externa ab humore aqueo prematur. Salus ab adstringentibus, lamina plumbea.

6. STAPHYLOMA o).

Ectopia vueae intra foramen corneae, subrotundus, rubro-liuidus huius tumor. Pro diuersa mole distinguitur.

a. *Melon*, quasi parua bucca.

b. *Myocephalum*, quasi caput muscae.

c. *Elos*, quasi clauus.

Infert caliginem, exophthalmiam.

7. ANONYMA P).

Ectopia crySTALLINAE lentis: pupilla immobilis, et magna mydriasis, albescit crySTALLINA et exsiccatur, vueam extrorsum trudens, vt aeger vmbram tantum corporum videat; strabismus. Oritur ab ictu ad oculum, cum cruoris effusione.

8. PARAGLOSSE.

Ectopia linguae.

a. *Retractio*.

Linguae reuolutio ad posteriora: a relaxato, nimium resecto fraenulo linguae, aut paralyfi musculorum.

b. *Exertio*.

Linguae prominentia morbofa a paralyfi musculorum.

9. HYPOSTAPHYLE.

Ectopia vuulae q).

B. COLLI.

1. ANONYMA r).

Ectopia ossis hyoidis, et cartilaginum laryngis: dysphagia, trachelophyma.

2. ANO-

o) SAUV. I. 165. calig. sp. II. et exophth. sp. II.

q) v. pr. pleth. et catarrh.

p) S. YVES. MAITRE-IAN, SAUV. catar. sp. I.

r) VALSALVA de aur. c. 2. n. 20.

ACT. HELV. vol. 8.

COLLI.

2. ANONYMA ^{s)}).

Ectopia vertebrarum colli: paraglosse exertio, dyspnoea, dysphagia, pulsus suppressus, ceruicis locus cauus a contactu dolet, singultus.

3. ECTOPIA NVCHAE ^{t)}).

A valida plerumque vi inducta mortem inducit. Signa, in cadaueribus obuia, vide apud auct. citt.

C. PECTORIS.

1. PNEVMOCELE ^{u)}).

Hernia pulmonis per costas, sub respiratione aucta et imminuta.

2. CARDIACELE. METZGER, alii.

Situs viscerum inuersus, cor latens in thorace dextro, cuius pulsatio in latere dextro est pathognomonicum.

3. GIBBOSITAS.

Ectopia thoracis compagem constituentium partium.

a. *Cyphosis*.

Ectopia spinae dorsi, vel antrorsum, vel retrorsum, aut sinistrorsum, dextrorsumue, facta.

Oritur a casu, ictu, thorace ferrea, nimia constrictione neophytorum, maxime rachiticorum, rel.

Inducit dyspnoeam, cardiogmum, palpitationem, singultum.

b. *Scoliosis*. ^{x)}).

Ectopia costarum, maxime ad interiora in feminis pinguibus, (mammis maioribus etiam tribuitur), dyspnoea, asthma, singultus.

c. *Scapularis* ^{y)}).

Ectopia scapulae.

d. *Ster-*

s) AETIVS. N. PISO l. 2. c. 3. p. 330. SCHMUCKER chir. Schr. l. 284.

t) MAYCHART d. de luxat. n. LVDWIG pr.

u) BRVNS ep. ad HENCKEL. 1774. RICHTER v. d. Br. I. 3.

x) RIOLANI ench. anat. l. 6. c. 14. MORGAGNI XLV. 24.

y) SAUV. sp. 2.

PECTORIS.

d. *Sternalis* ^{z)}).

Ectopia sterni: dyspnœa, palpitatio.

e. *Xiphoidea* ^{a)}).

Ectopia xiphoideae cartilaginis, introrsum facta; oriuntur dolor constans, anorexia, vomitus, singultus, atrophia. Salus ab applicata ad epigastrium cucurbitula.

D. ABDOMINIS.

HERNIA: ectopia partis mollis abdominalis e sua sede in cauum aliud.

A. PERITONAEOCÈLE.

Hernia, sub laxato peritoneao eueniens.

B. PERITONAEORIXIS.

Hernia sub peritonaei ruptura contingens.

C. PERITONAEOGELERIXIS ^{b)}).

Hernia ex specie A. et B. composita.

Diuiditur HERNIA

a. *Quoad partes deuolutas*, ina. *Simplicem*, dum vnum viscus abdominale solum prorumpit: haec iterum in1. *Incompletam*, vbi paries vnus visceris, vt plurimum membranacei, tantum prodit: quae iterum vel estα. *Appendicularis* et haec

aa. *Ramex*, *appendix*, *diuerticulum*, dum paries intestini, ventriculi, aut vesicae, in canalem, inferne clausum, *producitur*.

bb. *Littriana* (ab inuentore) hernia, dum paries partium dictarum prolabitur.

β. *Sacciformis*, *partialis*, *perstrictoria*. dum paries conuexus tantum in sinum herniae intrat, et reliquum in sede manet.

2. *Completam*, vbi in vtroque latere erumpit.b. *Compo-*

z) SAUV. sp. 3.

a) BALLON. epid. 2. p. 242. BAR-
BETTE ad. pr. l. 1. c. 4. BONET. sep.

HEISTER. SAUV. gastrod. sp. 20.
et vomit. sp. 22. Vidi.

b) RICHTER v. d. Br. I. p. 9.

HERNIAE.

b. *Compositam*, si simul duo, tria, aut plura viscera prurumpunt.

b. *Quoad locum*, in quem deuoluuntur, in

a. *Internam*, si pars herniosa in abdomine manet.

b. *Externam*, si extra abdomen fertur, et quidem

α. *Thoracicam*, vbi hernia in thoracem facta est, quod fit, dum

1. Diaphragma, a suo tono remittens, in thoracem pellitur instar sacci.

2. Diaphragmatis foramina transeunt partes herniosae.

3. Diaphragma perforatum est.

β. *Periphericam*, si hernia ad abdominis ambitum externum contingit.

c. *Quoad statum*, in

a. *Mobilem*, quae recens, libera, anodyna, est.

b. *Adhaerentem*, quae inueterata partes prolapsas vel inter se, vel cum vicinis, concretas habet.

c. *Incarceratam*, quae dolore et phlegmasia stipatur.

d. *Quoad causas*, in

a. *Haereditariam*.

b. *Congenitam*.

c. *Adquisitam*, ob

1. *Ingesta*, copiam maiorem ciborum et potus, qualitatem eorum oleosam, pinguem, flatulentam, fermentescentem.

2. *Gesta*, motus corporis violentiores, saliendo, currendo, equitando, onera gestando, eleuando, femora diuaricando, ex brachiis corpus suspendendo, in genua procumbendo, omnes nixus respirationis violentiores, vomitum, venerem immodicam, gestationem fetus, dystociam, animi pathemata.

3. *Excreta et retenta*, vt faeces nimis duras, flatulentiam, vrinam diu retentam, calculos, lumbricos.

HERNIAE.

4. *Adplicata externa*, vt per vulnus, ictum, lapsum, pressionem.
5. *Dispositionem*, tum naturalem, qua partes abdominis pressionem, tum internae, tum externae, minus resistunt, vti ad vmbilicum, ad annulos abdominis, cet., tum adquisitionem per praegressa; hydropem, grauiditatem, sectionem caesaream, vlcus, rel., tum et compositam, si praecessit Liparocoele, quam euanidam sequitur hernia vera.

Quibus propositis adiungamus tum exempla, tum characteres herniarum.

I. IN GENERE.

A. *Incompletae.*

1. Appendicularis ^{c)}.

2. Sacciformis ^{d)}.

B. *Completae.*C. *Compositae.* Huc

1. Duplex ^{e)}.

2. Triplex ^{f)}.

3. Quadruplex ^{g)}.

4. Multiplex ^{h)}.

D. *Ex-*

c) LITTRE Mem. de l'ac. des Sc 1700. MERY ib. 1714. RVYSCH cat. rar. p. 149. t. 3. thes. anat. VII. t. 4. f. 2. 3. E. N. C. c. 8. obs. 50. Eph. Vratisl. XVIII. p. A. phys. med. vol. I. p. 82. Acta Petropol. t. 4. p. 263. t. 24. Mem. de l'ac. des Sc. 1732. p. 40. MORGAGNI adv. anat. III p. 8. 9. 36. GVENZ de hern. p. 6. 94. TH. BARTHOL. anat. c. 40. BLASII obs. anat. p. E. N. C. dec. 2. a. 8 obs. 122. Phil. Transf. 1687. n. 188 et 1701. Act. Edimb. t. 7. HEISTERI inst. chir. tab. 32. f. 1. 2.

d) MORGAGNI l. c. FABRIC. HILD. c. 6. obs. 71. MERY mem. de l'ac. des Sc. 1701. LE DRAN

obs. T. 2. p. 6. 49. GARENGEOT oper. T. 1. obs. 15 & 21. HEISTER l. c. T. 2. c. 116. GVENZ p. 7.

e) GVENZ p. 72. LA CHAVSSE §. 12.

f) LA CHAVSSE §. 15.

g) LA CHAVSSE §. 15. LE MAIRÉ. HALLERI. diss. chir. sel. T. 3.

h) PAPEN HALLERI diss. cit.

t. 3. MEECKREN obs. med. chirurg. c. 5. DIVOVX de hern. vesic. §. 21.

TH BARTHOL. c. 2. h. 95. TEICH-

MEYER de exomph. §. 11. in HAL-

LERI diss. c. 1. FEL PLATERI obs.

l. 3. p. HEVSING in HALLERI d. c.

t. 1. E. N. C. vol. 2. obs. 94. t. 4.

Transf. Phil. 1731. n. 421. Journ.

de med. T. 2. p. 31. Mem. de l'ac.

de chir. 1701. BENEVOLI diss. obs. 33.

HERNIAE.

D. *Externae. Thoracicae.* Sub diaphragmate

A. In faccum mutato i).

B. Dilatato k).

C. Perforato l).

II. IN SPECIE.

A. HEPATOCELE.

a. Interna m).

a. *Congenita* n).b. *Adquisita* o).b. *Externa* p).

Plerumque umbilicalis; protuberantia firma, hepati respondens, in regione, hepati proprie non competente, defectus signorum herniae alius.

B. SPLENOCELE.

a. Interna q). Splenalgia, hæctica, obstipatio, tumor hypochondrii sinistri.

b. *Externa* r). Ventralis, inguinalis; protuberantia firma, lieni respondens, in latere sinistro: defectus signorum alius herniae.

S 2

C. HE-

i) Journ. de med. T. 7. p. 38. Aët. Berol. dec. 2. vol. 4. p. 64. GVENZ l. c. p. 89.

k) Aët. Berol. l. c. obs. 1. p. 69. et p. 11. TH. EARTHOL. c. 6. h. 54. Journ. de med. T. 2. p. 31. E. N. C. c. 3. & 4. p. 147. Hist. de l'ac. des Sc. 1729 p. 14. BECKER de submers. moite obs. adi. 1.

l) PARAELOP. l. 9. c. 30. BLANCARD an. p. c. 1. obs. 1. 2. Co. c. 2. obs. 9. SENNETT. — FABRIC. HILD. c. 2. obs. 33. RIVERII c. 4. obs. 67. Aët. Berol. dec. 2. vol. 4. obs. 1. p. 69. Ephem. Vratisl. T. 24. m. mai. cl. 4. art. 10. H. ab HEER obs. 25. KIRSCHBAUM d. de hern. ventr. in HALLERI d. chir. T. 3. STEHELIN thes. 3. in HALLERI diss. anat. vol. 6. Bemerk. e. Gef. v. Aerzten in London T. 1.

m) SAUV. sp. 1.

n) E. N. C. dec. 1. a. 2. obs. 83. an. 7. obs. 6. A. N. C. vol. 1.

obs. 226. N. A. N. C. T. 1. p. 303. VELSE in HALL. diss. anat. vol. 7. M. N. C. a. 1671. obs. 88. et dec. 2. a. 7. obs. 6. TROSCHEL d. p. 72 sq. o) BOHN. chir. rat. p. 230. RVYSCH. obs. 6.

p) GVENZ p. 4. E. N. C. dec. 1. a. 2. et dec. 2. a. 7. BOHNII chir. p. 230. ARNAVD tr. des hern. T. 1. A. phys. med. vol. 1. obs. 226. Journ. de med. T. 7. p. 38. SAUV. sp. 2.

q) DIEMERBROECK an. c. 15. BLASII obs. 14. p. 26. BLANCARDI coll. med. c. 4. o. 46. SCHRADERI obs. an. dec. 3. o. 4. STALP. v. d. WIEL c. 1. obs. 37. RVYSCH obs. an. 62. VELSE obs. 6. l. c. FABRIC. HILD. ep. 55. p. 999. HIPPOCR. epid. L. 6 S. 2. aph. 30. A. VATERI d. de lienis prol. Vjr. 1736. Journ. de med. T. 7. p. 38.

r) SPIEGEL an. l. 8. c. 14. RVYSCH adv. anat. dec. 2. p. 23. ARNAVD t. 1. p. 29. GVENZ p. 4. SAUV. sp. 1. 2.

HERNIAE.

C. HEPATOSPLENOCELE.

- a. Interna ^s). Hepatis sedem occupat lien, lienis, hepar.

D. RENIS.

- a. Interna ^t).

E. GASTROCELE.

- a. Interna ^u). Ventris lapidea durities, vomitus continuus post vim externam, etiam haematemesis.

- b. Externa ^x). Protuberantia flexilis, elastica, glabra, aequalis, post pastum aucta, ieiunio stomacho immixta (nisi stomachi parietes admodum laxati sint, aut cum peritoneo coaliti) magnitudine varia, in regione epigastrica, horizontali corporis situ, leuamen praesertim digestionis tempore, auctum situ erecto aut nisu edito, stomachi dolor, anorexia, bradypepsia, vomitus, habitualia.

1. *Sim, lex.*

2. *Composita* ^z). Complicata cum epiplocele, enterocele, hepatocele, rel.

F. ENTEROCELE.

- a. Interna ^a).

- b. Externa. Est intestinorum trans annulos inguinales, arcus crurales, foramina oualia, emarginaturas ischiaticas,

^s) ARISTOTELES. PLINIVS. **a** GEMMA, DIEMERBROECK **an. c.** 15. CATTIERI obs. 17. TH. BARTHOL. **c. 2. h. 29.** Exempla **a. 1771.** in theatro anat. Parisiensi, Argentoratensi, Berolinensi visa.

^t) RHODII mant. obs. **an. 32.**

^u) BONETI sep. anat. **l. 3. f. 7.** obs. **2. 7.** RIOLAN. ench. **an. l. 2. c. 23.** FANTON. op. obs. **5. 24.** VELSE obs. **6. l. c.** BLEGNY **Zod. med. gall. a. 1.** Febr. obs. **2.** Act. Helvet. phys. math. **vol. 3. p. 10.** Act. med. Berol. **dec. 2. vol. 4. p. 60 sq.** GVENZ **p. 89.** DE HAEN **T. 6. c. 1. §. 5.** MAC-NEVEN **d. de**

raro ventr. casu in KLINKOSCH coll. d. Prag. **vol. I. p. 159.**

^x) FABRIC. HILD. resp. ad DOERING **p. 915.** BLEGNY **l. c. a. I.** Febr. obs. **2. p. 44.** GVENZ **l. c. c. 20.** LA FAYE sur DIONIS **p. 121.** ARNAVD praef. **p. 81.** SHARP rech. crit. **c. 1. Mem. de l'ac. de chir. T. 1. p. 703.** SAUV. sp. **1. 2.**

^y) FABR. H. BLEGNY, GVENZ, ARNAVD **l. c.**

^z) Phil. Transf. **n. 422. & a. 1731. n. 421.** GVENZ **l. c.**

^a) VELSE **l. c. obs. 6 & 7.** KLINKOSCH **diff. sel. vol. 1. p. 194.** nota

HERNIAE.

ticas, annulum umbilicalem, vaginae parietes, vel abdominis musculos ectopia: protuberantia ad locorum dictorum quem obseruanda, initio saepius parua, sensim crescens, pressione aut commodo corporis situ facile regrediens, saltem initio, situ mutato, aut conatibus editis rediens, tensa, flexilis, elastica, glabra, aequalis, a contrectatione murmur edens, frigore aliquo modo contractilis, calore vero expansilis, mirum in modum saepe increscens, cum duritie sub spiritus retentione, aut tussiendo, vel alui deponendae conatibus, symptomatibus acutis, chronicisue, variis, ex compositione et complicatione oriundis, stipata.

G. EPIPLOCELE.

a. Interna ^{b)}.

b. Externa. Hernia omenti, protuberantia ad varia abdominis loca, lente saepius, ne animaduertente quidem aegro, oboriens, tardius crescens, per solum situm congruum numquam, per pressionem, sub congrua corporis positura factam, etiam initio, non penitus regrediens, nisi exigua sit, difficile aut partim tantum, si maior, conatibus, sub mutato corporis situ editis, ad pristinum statum reuocanda, aegre, quum repressa est, continenda, mollis, inaequalis, rugosa, membranas crassas, sub digitis volubiles, ad tactum referens, impressionis digito factae tenax, complanata, a pressione, contrectatione, restitutione non obmurmurans, a spiritu retento, et sub alui deponendae conatibus non multum intumescens, dolorem, renitentiam, inolestiam, enterocele minores prae se ferens, decubitus, corpore extenso, incessum, trunco erecto, difficilem, anxiosum, impossibilem, ita saepe inducens, ut ad sol-
landos

50. PAVLI pr. de Siph. anat. in TER de situ praetern. coli pr. Vi-
HALLERI diff. anat. sel. vol. 6. teb. 1737. N. A. N. C. T. 1. p. 289.
VOSSE de intest. caeco §. 9. ibid. b) DE BLEGNY l. c. a. 3. Febr.
HENRICI descr. omenti ib. A. VA. obs. 4.

HERNIAE.

landos dolores colicos, ad effugiendas molestas tractiones, singultum, vomitum, corpore incuruato incedere ac iacere non raro cogatur aeger, epiplocele in primis completa laborans, symptomatibus tum acutis, tum chronicis, variis, ex compositione, et complicatione oriundis, stipata.

H. CYSTOCELE. *Hernia vesicae Auct.*

a. Interna c).

b. Externa d). Trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos, perinaci, hypogastrii, vaginae, parietes contingit. Protuberantia in quodam locorum dictorum, initio parua, sensim crescens, pressione aut commodo corporis situ, vel nisu edito reuocanda, mollis, et membranas crassas, flaccidas, sub digitis volubiles, tactu referens, si vesica lotio vacua sit, fluctuans, si lotium adsit, maiori donata volumine, post seruatas diu vrinas decrescens, et fere euanescens iis emissis, qua validius compressa sequitur mictio plena, vel stillatitia, meiendi desiderium a leuiter pressa: ischuria, dysuria, saepe tantum mictio manu eleuata et compressa protuberantia perficiunda.

Oritur, vt mittam causas communes, etiam 1^o a vesicae parietum ampliatione per ischuriam, dysuriam, inducâ, quas sequitur, vrinâ euacuatâ, eorum flacciditas, atonia, contractionis sufficientis defectus. 2^o a grauiditate, dum sic ad ossa pubis pressa vesica lateraliter exporrigitur, figuram induens veluti brachiatam, vel deorsum expandi cogitur. 3^o ab aliis herniis, ob viscerum

c) Journ. de med. T. III. p. 11. hern. p. MERY Mem. de l'ac. des Sc. 1713. GARENGEOT op. chir. LEVRET obs. sur les polyp. SHARP rech. crit. VERDIER Mem. de l'ac. de chir. T. 2. et T. 4.
 d) PLATNERI inst. chir. 6. LA CHAUSSE l. c. SALZMANNI d. de hern. vesic. in HALLERI diss. chir. sel. T. 3. §. 72. GVENZ de

HERNIAE.

cerum tractionem. 4^o a vaginae perietum per partum multiplicem distensione. 5^o fibrarum musculosarum, tum circumpositarum vesicae recessu ab inuicem, distensione producto. Huc etiam

EXOCYSTE. *Prolapsus, inuersio vesicae urinae Auct. e).*

Procidentia membranae, corpus vesicae ipsiusque colum interne obuestientis, facta per meatum urinarium. Pars prolapsa inter magna vulvae labia, nunc forma vesicae, rotundae, diaphanae, clausae, lotio plenae cum ischuria, nunc forma botuli oblongi, penduli, inferne aperti, cum dysuria conspiciendum se praebet.

I. METROCELE: *hernia uteri auct.*

a. Interna, *hysteroloxia, uteri obliquitas Auct. f).*

1. Anterior. 2. Posterior. 3. Lateralis g).

Axis pelvis legitime constitutus, mutata vero est orificii uterini directio, quod exploratum nunc anteriora, nunc posteriora, nunc latus alterutrum respicere deprehenditur: symptomata varia.

β. RETROVERSIO UTERI, *uterus retroflexus auct. h).*

Tertio grauiditatis mense dolores abdominis, ad abortum, obstipatio, ischuriae summae, tumor abdominis densi, catheteris et clysteris applicatio irrita, digitus, in vaginam immissus, os uteri non attingit, adest tumor ab utero. Non raro infert abortum, vesicae rupturam, gangraenam uteri, mortem. Salus post urinam et aluum euacuatam a repositione, immis-
missis in vaginam et anum digitis, in aegrotis, genu-
bus

e) SALZMANNI d. c. SOLINGEN de mul. morb. chir. p. 741. NOEL obs. VERDIER tr. des hern. SAUV sp. I 2.

f) ROEDER el. art. obst. §. 449 507. LEVRET obs. f. l'ac. h. DEVENTER 46. 48. RYVSCHII obs. 96. Mem. de l'ac. de chir. T. 3.

g) v. script. obstetr. etiam. citt.

h) LYNNE et HUNTER Med. obs. and inq. vol. 4. HOOPER ib. vol. 5. SAXTORPH Collect. Havn. vol. 2. WILCZEK d. de utero retroflexo. RICHTER chir. B. I. 4. 47. IV 61. 70. 235. 555. v. DOE-VERN obs. acad. c. 7. Cel. MECKEL obs.

HERNIAE.

bus insistente, versus umbilicum vterum protrudentibus.

b. Externa. Prolapsus, procidentia, inuersio, vteri. *Auct. i*).

a. *Hysteroptosis*, vteri prolapsus *Auct. k*).

α. *Incompleta*.

Citra grauiditatem labitur vterus deorsum, vagina inclusus: protuberantia, inuerse pyriformis, apertura transversalis oblonga, in sui extremo perforata, circa cuius basin moueri potest digitus circulariter actus: dolores in situ erecto, incessu, alui depositione, in femoribus, inguinibus, tractio ad renes, obscurus molestiae sensus in toto pelvis ambitu, cum aliquali leucorrhoea, antea exulante: dolores horizontali decubitu sensim euanescent.

β. *Completa*.

Foras conspicitur vterus plus minus extrusus, vesicae partem cum vagina abripiens; protuberantia subcylindrica, superne latior, inferne angustior, ibique apertura transversali secta, vel oblonga, qua catamenia fluunt. Vterum tegit vagina inuersa, aëris contactu colorem cutis induens, nec spatium vacuum relinquit, per quod transeat digitus. Dolores incompletae similes, maiores tamen, et, si subito fiat prolapsus, urinae fundendae difficultas non rara, aut frequens desiderium, et tenesmus continuus aegram vexant. — Prolapsus, qui grauiditatis tempore fit, distinguitur protuberantiae volumine maiori, figura rotundiori, et fetu incluso.

b. *Metropotosis*. Vteri inuersio *Auct. l*).

Protuberantia in vagina, hypogastrii depressio.

α. *In-*

i) GVENZ l. c. HEISTERI inst. l'ac. de chir. T. 3.
chir. ARNAUD T. I. c. 24 PUZOS k) SAUV sp. 1.
sur les mal. de la matr. Mein. de l) SAUV. sp. 2.

HERNIAE.

α. Incompleta.

Perfentitur in vagina protuberantia fere semisphaerica, superficie subaequali, inferne non perforata, vteri collo, tamquam annulo, cincta, stipata dolore acuto in inguinibus ac renibus, pondere molesto in hypogastrio, haemorrhagia plus minus vberē, tenesmo eos conatus inducente, qui vterum magis magisque praecipitant, ac penitus tandem inuertunt.

β. Completa.

Depressioni hypogastrii adhuc maiori adiungitur protuberantia, extus conspiciunda, irregulariter rotunda, cruenta, levis, imperforata, molli pedunculo suspensa, quem annuli ad instar cingit orificium vteri; dolores viuidiores, metrorrhagia vberior, lipothymiae continuae, quas breui excipiunt ephidrosis frigida, convulsiones, delirium, mors intra 3. 4. horas saepe superveniens.

γ. Hysterocele. Hernia vteri *Auct. m).*

Vteri ectopia trans annulos inguinales, ad inguina et sub umbilico. Protuberantia renitens, dura, gradatim ad maximum usque volumen increfcent, e pelui pone ossa pubis emergens, vel ad ipsum gestationis tempus (si grauidus est) reductilem, motibus fetus, certo tempore intra protuberantiam percipiendis, in grauida, colli uterini directio mutata, exploratione *Puzosia*, immissa scil. in vaginam manu altera, altera protuberantiam comprimente, maior certitudo.

K. COLPOPTOSIS. Prolapsus vaginae *Auct. n).*

Variat procidentia magnitudine, vnde relaxatio, lapsus, inuersio, vocatur: atque interdum sola interior vaginae prorumpit. Conspicitur primo sub forma annuli crassi, irregu-

m) SENNERT l. 4. p. 2. f. 2. 2. p. 23. ARNAVD l. c. T. I. p. c. 17. DOERING ep. ad. FAERIC. 29 Mem. de l'ac. de chir. T. 3. SAUV. HILD. p. 893 h. op. GRAAF de l. 209. mul. org. c. 8. RVYSCH adv. dec. n) SAUV. hysteroptosis sp. 3.

HERNIAE.

regulariter plicati, intra quem immisso digito facile persentitur collum vteri tunc demissius crescit protuberantia situ erecto, diu protracto, imminuitur tenesmo frequentissimo et meiendi difficultate, quam efficit canalis vrethrae mutata directio: prolapsu senescente crescit, elongatur, indurefcit protuberantia, infernam adhuc aperturam gerens, quae catamenia fluunt. Signa vt in hysteroptosi, vt tamen prouectissima colpoptosis protuberantiam exhibeat vbique aequaliter duram, inferne plerumque latiore et aperturâ valde irregulari instructam.

L. OVARIORVM HERNIA 0).

Ovariorum ad annulum inguinalem hernia.

E. PARORCHIDIVM. Testiculorum serior descensus, aut retractio *Auct. P*). Testiculi vnus, vel vtriusque situs extra scrotum in nato homine. Absentia testiculi in scroto, eiusdemque plerumque praesentia ad annulos inguinales.

1. A sero descensu. (testicondi).

Retardati in itinere suo testiculi ad annulos haerent inguinales, vt vel eorum nihil appareat, (hinc monorchides) vel in annulis extuberent, vel eosdem paululum egressi haereant in iis.

N. Caue confundas cum bubonocoele.

2. A repressione.

Testiculi ad inguina pressi, tumor, dolor in inguine, scroti contractio summa, incessus impotentia.

F. Partium extremarum corporis. EXARTHROSIS 9).

II. EXARTHREMA. Huc ea auctorum, quae sunt a causa externa. Est separatio contigui in ossium articulis, diarthrosice combinatis.

B. DIA-

0) ARNAVD l. c. T. I. VERDIER l. c.

p) F. PLATERI mant. obs. A. PARAEI l. 7. c. TH. BARTHOL. hist. anat. MORGAGNI a. v. IV DIONIS op. de chir. mem. 4 QVELMALZ in HALLERI d. an. T. 5. d.

1. VERDIER l. c. Mem. de chir. T.

2. WRISBERG de descensu testic. SOLENANDRI conf. IV. 18. Vidi.

9) HEISTERI T. I. p. PLATERI chir. §. 1090 sq. PETIT mal.

les. 0. T. 2 DV VERNEY mal. des

os. T. 2. SAUV. l. 224.

B. DIASTASIS. *Graec.* ossium recessus *Latin.* ^{r)}. Est ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, aut per raphen, harmoniam, synosteocondrium, synchondrosin vnitorum, aut per syndesmosin sensibilibiter immobilem, connexorum separatio.

C. LOXARTHRVS ^{s)}. Est ossium, cum motu sensibili articulorum, relatiuus situs in alienum constanter mutatus.

D. ECTOPIA MUSCULORVM ^{t)}. Non tantum ex nimis violenta contractione vnus musculus inter congeneres, vel violenta pressione congenerum contra vnum, sed etiam in compositis musculis, sub contractione vehementi, musculi in alium locum peruerse diducuntur, contextus cellulosus dilaceratur, vasa sanguifera minima rumpuntur, et fibrae nerueae tenduntur, membranae, aponeuroses coërcentes dilacerantur, v. c. in dorso, aut his vulneratis prius sequitur musculorum ectopia, motus retardatur, aufertur, a constrictis membranis sequuntur conuulsiones, aliquando letales.

Si mauis, poteris ectopias distinguere, in

- I. *Deuiationes* ^{u)}, s. ectopias absque tumore sensibili externo, quorsum blepharoptosis, hysteroloxia, parorchidium.
- II. *Prolapsus, procidentias*, ectopias partium non tectarum, quorsum exophthalmus, paraglosse, hypostaphyle, exania, exocyste, hysteroptosis et elyptroptosis.
- III. *Hernias*, seu ectopias tectas.

Atqui

^{r)} PETIT l. c. T. 2. c. 8. & 13.
DV VERNEY l. c. c. 1 & 5. SAUV.
I. 230.

^{s)} DV VERNEY T. 2. c. 2. 3.
SAUV. I. 232.

^{t)} POUTEAU mel. de chir. p.
405. Comm. Lips. f. I. p. 155. POR-
TAL. in Hist. de l'ac. des Sc. de Par.
1778. p. 246. Comm. Lips. XXI.

p. 396.

^{u)} CALLISEN, p. 526 sq.

Atqui hi quidem morbi sunt, qui medicinam facturi, si in vniuersum res enuncianda, praecipuam merentur attentionem. Scilicet curaturus aegrotos potissimum morbo, respiciens ad eius causas, deinde passionibus et symptomatibus, attendens denuo ad morbum, et causas etiam peculiares, satisfacere debet. Quare ad aegrotorum lectulos accedentem primo inquirere in morbum oportet. Vellein equidem, sic possemus inquirere, ut per signa certa constaret, quis status sit systematis nervosi, contractilis, vigoris motus humorum, vtra sympathia, num interna, an externa, primario adfecta, quis et quorsum impetus? quae aegrotatio aut subsit, aut expectanda sit, quae idiosyncrasia, quae vel iuuent vel noceant subiecto? At pro! dolor signis huc usque destituimur, et quid? si vel haberemus signa, num materia medica et therapia, ut hodie sunt, sufficerent, responderent votis? Vtinam tamen signa desiderata medici, necessitatem, utilitatem rei agnoscentes, sensim eruant!

Oportet igitur, ut alia incedatur via. Videndum, quis morbus sit: qui, per usurpatos a me aliorum labores, docet, quae sit subiecti temperamentum, solidorum, maxime sensibilitatis, contractilitatis, et fluidorum ratio. Quis autem morbus sit, sic eruendum. Dum aegrotus, qui non raro in sui damnum passionem pro morbo habere solet, pathognomonica refert, plura simul enarrat, quae ad morbum referas, ac lumen dant, ut facilius inquirere in alia signa possis, dum aetatem et sexum, habitum aegroti, arteriarum pulsus, respirationem, linguam, excreta, aliaque, aestimas; et quae a prima aegritudinis inuasionem huc usque admissa aut leuabant aut laedebant. Morbos, iam scies, numero paucos esse, igitur negligendo eos, quorum nullo certe aeger laborat, facile, quo detineatur, inuenies, vel simplex sit, vel compositus. Iam aegroto etiam magis satisfacies, inquirendo, quae passio sit, colligendo pathognomonica. Videbis etiam non raro simul, quae vel subsit aegrotatio, vel expectanda sit,

me-

methodumque medendi iam ita diriges, ut causas rescindendo, morbum cum passione ad coctionem perducas.

Fateor equidem, difficulter saepe huic methodo satisfieri posse; non raro enim aegroti aut adstantes causas, morbum, dissimulant, aut inepte et citra rationem definiunt, volunt experiri, num medicus tanti sit, ut possit ex urina, aut pulsu, morbum forte rectius diuinari, quam agnoscere, signa, ad morbum spectantia, quae maximam attentionem desiderant, aut negligunt, aut adeo cum pathognomonicis miscent, ut larga omnino et ad haec adsueta memoria medici esse debeat, ut possit haec omnia ad suum caput referre, ab affinitate tum morborum inter se, tum passionum, et illa morborum et passionum, non abduci a vero, et simul interroganda eruere, ad ea, quae aegrotus adstantesque interrogauerant, respondere ita possit, ut probi, docti, et expertis medici nomen accipiat aut retineat, et prudentiae medicae ex omni parte satisfaciat.

At vna sola haec methodus est, qua tuto nitari et securam laudabilemque ineas curationem. Est, qua iam per annos uti soleo, nec difficulter admodum contigit, morbos et passiones agnoscere, adeo, ut non raro ea sola aegritudines agnoscerem, dum, inquirens simul communi fere methodo, a vero ne aberrarem, iure metuerem: imo aberrassem omnino, docente euentu, si in dispari aegritudinis definitione vulgarem methodum secutus essem. Tamen et sic nos, homines, humani quid pati posse, quis negabit?

Nosologiam et pathologiam igitur generalem sufficere, ut quis aegritudines vere agnoscat, et congruam instituat curationem, id, credo, palam est. Quae enim in aegroto deprehendis, vel ad morbum pertinent, vel ad passionem. Igitur doctrina, quae edoceat in specie passiones, cuilibet morbo respondentes, seu pathologia speciali, facile carere nos posse, arguere quis posset, potissimum quoniam huc usque destituimur ea congruarum observationum copia, ut characteres passionum in specie ita adumbrari possint, ut in votis est.

Liceat tamen addere quantumvis imperfectam pathologiam specialem, tum vt supra dicta de morborum et passionum natura confirmantur, tum vt tirones etiam in aegritudinum diagnosi quodammodo adiuuentur, tum denique, vt incitentur medici experti, vt et frequenter obseruent aegritudines congrua ratione, et obseruationes cum publico communicent, maximeque commemorent signa, quae pertinent ad passiones, quarum exempla, aut quorum testimonia pauca, aut nulla, huc vsque exstant. Iuuat praeterea pathologia specialis, vt de affinitate tum morborum, tum passionum, eo facilius possit statui, et de ea doctrina amplificari, augeri, quo perfectior ea ipsa redditur x).

De *affinitate morborum* differere iam nolo, ne adeo abrumpantur dicenda de aegritudinum affinitate, vnde et ea, quae de affinitate passionum dicenda fuissent, ad communem locum remitto. Vt tamen, quam seruaui et secutus sum affinitatem, quodammodo declaretur, conferas, si lubet, quoad morbos, biliosum, putridum, malignum y), periodicam neurosin et saburram, sepsin z), cachexiae species a), scorbutum et lepram b), elephantiasin et luem veneream c), scorbutum et syphilidem d), scorbutum et scabiem e), arthritidem et calculum f), dysarthritidem, arthritidem, lithiasin g), scrophulas et polypum h), infra indicata scripta.

x) Omisi de industria repetitiones symptomatum, quae tum ad morbum, tum ad passionem pertinebant, et methodum medendi erudientem, nisi ob varias rationes, eadem seruare, melius videretur. Quae posita sunt tamquam pathognomonica diagnostica agnoscas, licet vere et lubenter fatear, requiri adhuc magnum obseruationum thesaurum, vt pathognomonica sint absque exceptione. Interdum enim paucis tantum obseruationibus adiutus characterem posui, atque, vt evitare vix poteram, symptomata

accidentalia pro essentialibus tum forte posui. Igitur ne facile in me irascaris, potius lugeas medicinae nostrae tristem adhuc conditionem.

y) STOLL. II. 122.

z) WERLHOFF MEDICVS.

a) Comm. Lips. XVII. 88.

b) Comm. Lips. XVI. 459.

c) Comm. Lips. XVIII. 34.

d) Comm. Lips. XVIII. 238.

e) Comm. Lips. XVIII. 241.

f) ALBERTI. SCHROEDER.

g) Comm. Lips. XIII. 504.

h) Comm. Lips. XVII. 209.

P A T H O L O G I A

S P E C I A L I S.

Multa fiunt eadem, sed aliter.

QVINCTIL. inst. orat. L. II. C. 20.

Quam multa fieri non posse prius, quam sunt facta, indicantur.

PLINII H. N. L. VII. C. I.

NEVROSIS.

PASSIONES PRIMARIAE.

P ARALYSIS. PARESIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* ^{a)}. Sopor, virium prostratio, amnesia, paraphrosyne: periodus menstrua.

PARAPLEGIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* ^{b)}. Artus inferiores tantum motu et sensu orbantur, cum harum partium phlegmatia et frigidity, pyrexia, post aliquot horas haec euanescent, redeunt die sequenti, aut tertio.

HEMIPLEGIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida* ^{c)}. Arthritidi, rheumatismo, superuenit: tactus superest, artus extremi paralytici rigent, difficulter flectuntur, arescunt. Est frequentissima omnium, Augmentum a calidis, sudorificis, thermis salinis. *Salus* a lacte, sero lactis, balneis sulphureis, electrificationibus repetitis.
4. *Irritabilis* ^{d)}. Post dysenteriam malignam, adstringentibus et opiatis praemature suppressam, accidit hemiplegia,

a) Menstrua C. PISO. coll. ser. obs. 16.

b) TORRI de febr. c. 4. SAUV. sp. 5.

sp. 6.

c) MUSGRAVE de arthr. c. 16. De HAEN. l. c. 8. obs. 1. 7. SAUV.

d) SAUV. sp. 1.

HEMIPLEGIA.

gia, paralyſis brachii vnus et pedis alterutrius lateris. Conualeſcentes et orthoſtadii immobilitate brachii vnus et pedis oppoſiti ſimul laborant, adiunctis plerumque doloribus arthriticis, ſecus integram tactus facultatem amittunt. Priores facilius ſanantur poſterioribus. *Salus* ab eſſ. ſpir. alcalinis volatilibus, externe ſpir. camphor. et croc., ſalis ammon., vngv. neruino, regimine diapnoico, et ſudore in parte adfecta adiuto, per ſumum ex aromat. admiſſum, embrocat. ex therinis, et friſtum repetitum.

5. *Periodica* ^e). Ardor circa frontem, quo poſt horam recedente, dolor lancinans ſolius occipitis, immobilitas capitis, debilitas paralytica vnus lateris rel. per aliquot horas detinet, euanida, recurſura alio die.

SYNCOPE. LIPOTHYMIA. ASPHYXIA.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*.
 3. *Languida* ^f). In morbis poſt euacuationes magnas, vires exhaustas, anorexiam diuturnam, in cachecticis, ſubito ingruit.
 4. *Irritabilis* ^g). Irritabilia ſubiecta, hypochondriaca, hysterica, adoritur a leui animi adfectu, ab odore moſchi, ambræ, rel. ab iteratis catharticis, a ſpaſmis fugacibus.
 5. *Periodica* ^h). Vel eſt primaria et ſolitaria, vel cardialgiae ſuccedanea. Languor grauiffimus, frequens, animi deliquium a motu leuiſſimo. Pulſus depreſſi, frequentes, intermittentes. Sudores minuti circa colum et frontem, oculorum cauitas, caligatio, languor vniuerſalis.

β. Pe-

e) TORTI l. c. c. 4. p. 227. WERLHOFF de febr. p. — MOR- GAGNI XI. 19. SAUV. ſp. 8. et ternaia f. 20.

f) SENNERT. prax. med. SAUV. ſp. I.

g) SENAC de corde L. IV. c. 12. p. 544. SAUV. ſp. 6 & 21.

h) Tertiana, febris ſyncopalis TORTI p. 126. 192. amphimerina ſyncopalis R. FORTIS. SAUV. ſp. 17. MEDICVS p. 48. ſq.

SYNCOPE cet.

β. Periodus amphimerinaⁱ). Signa febris (credo morbi nostri) syncope, sopor continuus, pulsus rariores in paroxysmo, x. xii. horas durante, quam in sanitate, nulla post paroxysmum ephidrosis.

α. Cardiaca^k). Iuuenes, biliosos, fectos, cacochymicos, adoritur amphimerina, cum lipothymia, syncope, cardialgia, et vomitu bilis prasinae et aeruginosae; pulsus debiles, rari, pallor et liuor faciei, crescente debilitate fudores frigidi.

Ob vomitum laudant emetica, is tamen ab irritatione neruorum procedere videtur, seu epigenema esse, laudant PAVLVS et GALENVS assiduas frictiones, TORTI corticem, quod morbus iubet.

γ. Periodus tritaeophya^l). Post rigorem, cardialgia, vomitus enormis, summa virium prostratio, pulsus contracti, extremorum refrigeratio, in declinatione ephidrosis. Quotidie paroxysmus, sed alterni sibi respondentes, non raro iam tertius exitiosus.

ASTHENIA.

1. *Maligna*. morbi epigenema. 2. *Torpida*.

3. *Languida*^m) Morbis aliis, post passiones euacuatorias, haemorrhagias, profluvia, diarrhoeam, dysenteriam, superuenit: imo post abstinentiam diuturnam a victu, vel voluntariam, vel morbosam, ob maniam nymphomaniam. Cutis arida, flaua, rugosa, os aridum, lingua et dentes nigrescentes, vox rauca, macies magna; perspiratio, mictio, deiectio, nullae.

T 2

4. *Ir-*

i) SAUV amphimerina sp. 4. Syncopalis IONSTONI. SENNERTI. AVICENNA L. IV. f. 1. FORESTI obs. 61 L. I. TORTI p. 192.

k) TORTI p. 183. Syncopalis humorosa AVICENNAE L. 4. f. 1. c. 53. PAVL. AEGINETAEE L. 2. c. 37. FORESTI L. I. obs. 61. 29.

TORTI. p. 192. SAUV. amphim. sp. 5 & 6.

l) RIVERII c. 4. obs. 36. BVRLET d de var Hispan. morb. 1714. SAUV. tritaeophya sp. 1.

m) SAUV. sp. 11. & 14. Journ. de med May 1756. Hist. de l'ac. des Sc. 1712. 13. 19. 39.

ASTHENIA.

4. *Irritabilis* ⁿ). A moerore, ex iracundia, diu celatis: animi deiectione, agrypnia, anorexia, silentium stupidum, immobilitas, solitudinis amor. Salus ab eupeptis, polytrophis, vino, liquoribus fermentatis, narcoticis, auxiliis moralibus.

5. *Periodica*.

ANAESTHESIA. Epigenema.

ATONIA. Nulla rara.

SPASMVS.

CONVULSIO, ECLAMPSIA, EPILEPSIA.

1. *Maligna*. Maxime a phlebotomia, in febribus instituta, tum et aliunde.

2. *Torpidus*. 3. *Languida* ^o).

4. *Irritabilis* ^p). Salus a phosphoro, ad grana 3. aliquoties sumto.

5. *Periodica* ^q). Subiecta pallida, attonita, suspiriosa, anhelosa, subfrigida fiunt periodice.

N. Convulsio, maxime epilepsia, alius morbi passio, diuturna, sensim fit nervosa, vti est haereditaria: alii idiopathicam male dicunt.

TETANVS.

1. *Malignus*.

2. *Torpidus* ^r). In regione calidiori endemicus, post refrigerium ortus, cedit balneis calidis atque opio: inunct. spinæ dorsi bals. nerv.

3. *Languidus*.

4. *Irritabilis*.

n) SAUV. sp. 7.

o) Ab inanitione HIPPOCR. ab onanismo TISSOTI de inanitione. SAUV. sp. 1 & 13. et sp. 8.

p) SAUV. sp. 15. -- sp. 7.

q) MORTON pyret. C. IX. h. 14. 15. TORTI L. IV. c. 4. h. 3. BONETI sep. LAVTTER hist. med.

p. MEDICVS p. 8 sq. SAUV. conv. sp. 16. eclampsia sp. 17. Epil. sp. 9. tritaea sp. 16. quotid. sp. 4. N. A. N. C. T. I. p. 104

r) Opisthot. et Teran. Med. obs. and inq. vol. I. p. 87. sq. Comm. Lips. VIII. 304. Journ. de med. Dec. 1766. p. 509.

TETANVS.

4. *Irritabilis* ^s). Hysteria et opisthotonus. Salus a foliis aurant. camphora et moscho.
5. *Periodicus* ^t). Convulsio, dein tetanus, quotidie eadem hora recurrens, cum subsequente post 8. min. sudore profuso et tranquillitate.

CATOCHVS.

HYSTERIA. HYPOCHONDRIASIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*.
3. *Languida*. RAVLIN. SYDENHAM. ^u). Comes et pedisequa partus difficilis, haemorrhagiarum, repetitorum catharticorum, aut phlebotomiae, adfectuum acutorum, in languorem transeuntium.
4. *Irritabilis* ^x). Adeo familiaris irritabilitati passio est, ut pleraeque passiones morbi reliquas comitari soleat. Leuamen, salus, a catameniis ordinatis, aut haemorrhoidibus consuetis, balneis, pediluviis, aqua frigida, acidulis, emollientibus, lacte, paregoricis.
5. *Periodica* ^y).

DOLOR. ANODYNIA.

RHEVMATISMVS.

1. *Malignus*. 2. *Torpidus*.
3. *Languidus* ^z). Dorsalis, nimii veneris pedisequus.
4. *Irritabilis* ^a). Vagus, fixus, relinquit teneritudinem.
5. *Periodicus* ^b).

MYOSITIS.

PYREXIA.

PHLEGMASIA. INFARCTVS.

HAEMORRHAGIA, PROFLVVIVM. APOGENOSIS.

FEBRIS.

- s) Journ. de Med. 1761. p. 327. et tritaea sp. 8. Journ. de med. SAUV. sp. 12. 13. T. 42. p. 434.
- t) STOERCK A. M. I. p. 163. z) SAUV. sp. 11.
- u) SAUV. sp. 3. a) SAUV. sp. 7.
- x) SAUV. sp. 5. — sp. 7. b) MORTON. C. 9 h. 22. 12.
- y) E. N. C. dec. I. a. 2. obs. 193. 10 14 SENAC febr. p. STOLL. MEDICVS p. 44. sq. SAUV. sp. 8. III. 95.

FEBRIS.

N. Optime hæc ferunt corticem et opiata, imo alia non ferunt.

TRITAEA.

SIMPLEX.

DVPLICATA. REGVLARIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{c)}. Salus a laudano ante horrorem, exhibit.

CATHAMERINA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{d)}. Horis vespertinis levis refrigeratio, oscedo, pandiculatio, dein lenis calor, nulla aut vix notabilis ephidrosis, hysteria, vrina copiosa, limpida, pulsus stricti.
5. *Periodica.*

HEMITRITAEA NOTHA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{e)}. Hysteria, comes, auctore STAHLIO, solis naturae viribus sanatur.
5. *Periodica* ^{f)}.

TRITAEA NOTHA.

EPHEMERA.

1. *Maligna* ^{g)}. Primum comparuit in Anglia a. 1486. pergens per 40 annos, interea Germaniam, Belgium, Zelandiam, Brabantiam, Flandriam, Daniam, Noruegiam, Galliam ab anno 1525 - 1530. peragrauit, auctumno maxime faeuiens, hieme inducias adferens, vere reuertens.

Summa

c) Hist. de l'ac. des Sc. 1757. p. 31.

d) SAUV. sp. 3.

e) STAHL.

f) SAUV amphimerina sp. 9. pseudoheimitritaeus RIVERII.

g) SAUV. sp. 7. Hydronosus FORESTI L. 6. obs. 7. 8. Sudor anglicus SENNERT. febr. L. 4. c. 15. et MEAD opp. II. p. 50. maligna IVNCKERI. hydropyretos quorund. sudoriferus morbus Batauorum.

EPHEMERA.

Summa virium prostratio, animi deliquia, anxietas, cardialgia, cephalalgia, pulsus frequentes, celeres, inaequales. Sudor perpetuus, vel subito enecans, vel intra 24 horas morbum soluens. Energia per ephidrosin. Salus a cardiacis et sudorem sustinentibus, adiuuantibus.

AMPHIMERINA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica.*

- a. *Spasmodica* ^{h)}. Post tetartaeam amphimerina, feruor et paraphrosyne, abdomen planum, rigidum, oculi obtutus fixus, nullus calor, spasmi unicusuales, os siccum, linguae conuulsio: in remissione penis, sine mole adaucta, rigescentia.
- b. *Phricodes* ⁱ⁾. Horror tum aegroti, tum adstantium sensitivus, quotidie reuertens, durans ad XII-XV. horas: magna virium prostratio, tremor spasmodicus.
- c. *Semiquartana* et *Semiquintana* ^{k)}. Ea est, quae 4. aut 5. die horrore stipatur, intermediis diebus frigore caret.

TRITAEOPHYA.

1. *Maligna* ^{l)}. *Lipyrria* GALENI, AETII. Tota cutis exsanguis, frigida, cadauerosa, exceptis, quae calent, axillis et praecordiis, calor internus summus ex aegri relatu, sitis horrenda, linguae interdum siccitas, pulsus exiles et fere deficientes, mors non nunquam intra triduum.
2. *Torpida*. *Typhodes* MANGETI ^{m)}. Aeger a prima inuasionem pallidus, debilis et somnolentus, pulsus parui, tardi, calor natiuo minor, exigua aut nulla sitis. Re-

h) Journ. de med. Aout 1757. SAUV. sp. 16.

rifica, algida TORTI p. 193. quæquæ C. PISON. SAUV. sp. 7.

k) SAUV. sp. 23. 24.

i) GALENI isag. M. DONATI hist. in. m. L. 5. c. 5. horrida, hor-

l) SAUV. sp. 9.

m) SAUV. sp. 11.

TRITAEOPHYA.

mittunt, imo initio intermittunt haec symptomata per aliquot horas, et reuiuiscere aeger videtur, verum de-
nuo cum rigore aliquo, aut spasmo cutaneo, inter-
mittentis instar reuertuntur, et post aliquot similes lu-
fus aeger lecto adfigitur, stupidus euadit, nec pe-
riculum curat, nec obiecta sentit, manibus obuia
sine ratione contrectat, lingua balbutit, vel obmutef-
cit, semiuuius videtur, exceptis quibusdam intercur-
rentibus spasmis, potissimum stomachi, tussis insultibus.
Versus finem papulae interdum efflorescunt, vel flori-
dae, vel liuidae, quod peius, accedit diarrhoea, fae-
ces sunt nigrae, foetidae, urinae similes. Sensus ob-
scurantur, visus vix luce adfcitur, auditus obtusissimus
est, quod salutare symptoma fluxum ex auribus criti-
cum praecedit. Sunt, qui citra crisin restituantur post
menses 2. 3. sed raro vim mentis et sensuum aciem
recuperant, nisi post longum tempus. — Oritur post
euacuationes, victum parciolem, vitam laboriosam,
veneris abusum, sollicitudines, debilitatem senilem, con-
stitutionem epidemicam, humidam, inertem seu ine-
lectricam.

Salus a restauratione virium per cardiaca volatilia, am-
bram griseam, moschum, vinum, vesicatoria, diae-
tam mediocrem.

3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*

5. *Periodica* n). Est proprie tritaea simplex, vel duplex,
quae ante auctumnum, s. aestate adoriens, sub remitten-
tis facie ludit et decipit. (Cognoscuntur hae: 1° quod
sub frigore paroxysmi aeger reapse caleat ad tactum. 2°
quod paroxysmus secundae diei mitior sit paroxysmo
primae. 3° quod vel subito, vel gradatim intermissio
obsceuretur, seu apyrexia dubia euadat inter paroxys-
mos,

n) v. Syncopen, carum, ephidro- TI p. 200. 259. SYDENH. p. 24.
fin. Subcontinua malignans TOR- & epist. p. 191. SAUV. sp. 10.

TRITAEOPHYA.

mos, quo tempore superest calor mordax, fitis, linguae ficitas. 4^o vrina parca et rubra, crocea. 5^o angina aphthosa. 6^o graue quodcumque symptoma superueniat, excepto leui delirio.) Salus a vino praeter corticem, modo continuus lecti calor et cardiacorum vsus febri ansam non dederint, vbi cortex inutilis.

SYNOCHA.

SYNOCHVS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{o)}. Post febrim putridam (irritabilem) 14 die maximam partem superatam paraphrosyne, omnium membrorum tremor, et totius corporis rigiditas. Salus a balneo frigido.

TYPHVS.

1. *Maligna. Carcerum. v. Sepsin.* Sub huius febris languore extremo exanthemata retrocedunt, anxietas fumina, imo conuulsiones adfunt. Salus a camphora, moscho.
- β. *Neruosa acuta sporadica* ^{p)}. Febris acuta, praecedente stadio mitiori, animo inquieto et anxietatibus, incipit intercurrentibus refrigeriis, tenuisque, non leuante, sudore; pulsus parui, imbecilles, subduri, nunc celeres, nunc tardi. Dolores artuum, praecordiorum, pulsatio circa praecordia vel umbilicum: Vox per interualla acutior vel subrauca; lingua aspera, sicca, alba, tremula, conatus vomendi, vel vomitus aeruginosi, in scretus desinentes, vrina tenuis, limpida: oculi in vnum locum fixi, fulgentes, rubentes, squalidi, vel clausi: aurium sonitus, dyscoeca, vel acies solito maior. Salus a temperantibus, balneis frigidis, vesicatoriis, excitantibus, cardiacis.

γ. Ma-

o) POMME mal. vap. p. 150.

p) SELLE. p. 272. SAUV. sp. 5. castrensis.

TYPHVS.

γ. *Maligna auctor. TISSOTI* q). Summa virium prostratio absque euidenti causa, animi abiectio, insensibilitas, subita vultus, in primis oculorum, mutatio, interdum ab initio lipothymiae, agrypnia, paraphrosyne, stupor, anxietates praecordiorum, sensationum suppressio, ut non raro omnes deficient: vox debilis, aut aphonia: lingua vel non alienata, vel muco subfusco, flavescente, tecta, raro sicca: Pulsus debiles, frequentes, vel naturales; cutis haud raro non mutata, nec frigida, nec calida, nec humida, nec sicca: Urina cruda, non numquam lactea; vires magis prosteruntur, animus non constat; exacerbatio vespertina. — Signa redeuntis sanitatis, pulsus fortior, urina magis cocta, animi vis restituta, calor aequalis, sudor largus leuans.

δ. *Lethargus* r). Typhus, pulsus molles, inaequales, non frequentes, aeger bene se habere respondet, inter dormiendum delirium obscurum, somnus irrequietus, paucioribus interruptus et magis de lassans, pallor, calor nativo similis, aut minor, cephalalgia, initio carebaria, cum virium prostratione summa, lingua et labia crustis nigris tecta, sicca cum naribus, decubitus supinus, stomadyodia, die 20 finis morbi. Raro petechiis, rarius miliaribus, stipatur.

3. *Hysterico verminosa* s).

2. *Torpida*.

3. *Languida* t). Ex veneris abusu typhus, pulsus nunc fortes et pleni, nunc debiles et inconspicui, urina rubra,

q) TISSOTI §. VNZER T. V. sopore RIVERII 4. obs. p. 134. p. 609. SAUV. sp. 2.

s) SAUV. sp. 4.

r) VOGELII p. 48. maligna cum

t) SAUV. sp. 8.

TYPHVS.

bra, pellucida, cutis ficca, calida, fitis magna, per-
uigilium, nausea.

4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

HECTICA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida* ^{u)}). Cachecticos, profluuiis exhaustos, corri-
pit. Anorexia, carebaria, sopor, mane sapor linguae
deprauatus cum visciditate, dentium fordibus, oris
foetore, hypochondriis tensis.
4. *Irritabilis* ^{v)}). Melancholiae nervosae pedisequa et
comes, abit in tabem nerueam aut phthisin, nisi cu-
retur.
5. *Periodica.*

HEMITRITAEA VERA.

TETARTAEA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis* ^{x)}).
5. *Periodica* ^{y)}). Morbus adoriens ad tetartaeam, qua
male curata, hysteriam excitauit.
β. *Nephralgica* ^{z)}). Vomitus vrinosi, nephralgia,
quarto quouis die recurrentes.

TETARTOPHYA.

1. *Maligna* ^{a)}). Signa comparanda.
2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

ERRATICA.

HEBDOMADALIS, CATHAMERINA, PERIODICA ^{b)}).

Signa dicta. Salus a cortice post 5 septimanam.

PASSIONES CAPITIS.

APOPLEXIA.

1. *Maligna.* 2. *Tor-*

u) SAUV. sp. 10. II. 12. BAGLIV.
op. p. 424.

v) Lenta neruea LORRY de me-
lanch. I. 176. SAUV. sp. 12.

x) MORTON pyr. c. 9. h. 10.
p. 82. SAUV. sp. 10.

y) MORTON pyr. C. 9. h. 10.
p. 82. SAUV. sp. 10.

z) SAUV. sp. 9.

a) MARC DONATI L. 3. c. 14.
L. 7. c. 6. HORSTII I. 1. o. 12.

b) Journ. de med. T. 42. p. 432.

APOPLEXIA.

2. *Torpidā*. Saepe quae dicitur serosa.
3. *Languida*. Finis letalis multorum morborum.
4. *Irritabilis* ^c). Feminis hysteris, aut a partu et metrorrhagia, aut a dystocia, aut animi pathematibus exorients, cedit antihysteris, neruinis.
5. *Periodica* ^d). Saepe, praegressis hepatalgia, cardialgia, haemorrhoidibus, scabie, suppressis, erroribus in victu, corripit ita, ut in 1. aut 2. paroxysmo suavis adsit somnolentia, aut stupiditas, vel delirium leue: urina est crassa, subfusca, lixiuialis, foetens, cum pinguedine innatante, micturitio frequens, dysuria, sanguis extractus est floridus, interdum coloris variegati, cum crusta vel pleuritica, vel gelatinosa, (interdum ascarides vel cucurbitinos fundens).

CARVS.

1. *Malignus*. 2. *Torpidus*. 3. *Languidus*.
4. *Irritabilis* ^e). Subitanea omnis motus et sensus feriatio, cum respiratione vix sensibili, aphonia et dysphagia, refrigerio occipitis, pulsibus depressis, tensis, oris distorsione, imo interdum hemiplegia, ut tamen obscure audiant. In paroxysmo salus a phlebotomia, linteis calidis, potu cardiaco, antihysteris, anodynis.
5. *Periodicus* ^f). Singulis, vel alternis, vel quarto quoque, diebus ingruit, post cephalalgiam, dein delirium,

c) SAUV. sp. 4. SYDENH. de pass. hysterica p. 400.

d) SYDENH. T. I. p. 191. WERLHOFF p. 21. HOFFMANN opp. IV. 25. MORTON opp. p. 194. & p. 265. HUXHAM. opp. de HAEN febr. div. p. 229. LAVTTER h. m. p. 71. A. N. C. vol. 3. obs. 75. I. RHODII obs. C. I. o. 68. p. 39. MEAD opp. I. p. 30. MEDICVS p. 5. SAUV. sp. 9.

e) Pnix hysterica GALENI Apnoea HERACLIDIS, suffocatio mulierum PLINII, aliorum, flatuosa re-

frigeratio SOLANI, apoplexia spasmod. LORRY de melanch. p. I. p. 115. et FR. HOFFMANN C. I. conf. 19. vapeurs hypoch. POMME obs. 9. Essai 1760. SAUV. sp. 9. & 13.

f) Parapoplexia C. PISONIS obs. 169-171. Febris epid. Vrbaetana LANCISII de nox. pal. eff. L. 2. c. 3. lethargica TORTI p. 207. soporosa WERLHOFF p. 17. et f. I. 3. FOREST. L. 3. o. 39. BIANCHI hist. hep. p. 751. SAUV. sp. 3 & tritaeoph. sp. 7. et tetartoph. sp. 4. MOR-

CARVS.

rium, interdum conuulsiones, febris intermittens maligna, ad quam tertio sub paroxysmo pleumque sopor accedit, vt aeger ore hianti, initio sine stertore, immobilis sit. Pulsus aliis frequens, aliis rarus, tardissimus, in multis durus et intermittens, lingua nigra, sitis, vigente delirio nulla, micturitio frequens, post paroxysmum stupor, aegri motibus anxii iactati et fere dextro latere hemiplegici fiunt. In paroxysmo altero sopor profundior, et saepe letalis, maxime quum alia graua symptomata, vt carphologia, subsultus, accedunt. Nisi sopor cum paroxysmo euanescat, aut aeger typhomaniacus, hemiplegicus, maneat, conclamatum fere est. — Sub paroxysmo temperantia et reficientia cum diluentibus commendantur, et applicatio vesicatoriorum. Finito vero paroxysmo remotis curationis impedimentis, et energia excitata per phlebotomiam et emetica, aut eccoprotica, cortex Peruv. larga manu est offerendus, imo et laudanum.

CATAPHORA.

1. *Maligna.* 2. *Torpidia.* 3. *Languida.*

4. *Irritabilis* 8). Coma somnolentum auct. lethargus vulgi. Sopor grauis, ore hianti, maxilla inferiori demissa, oculis clausis, facie saepius pallida, pulsibus raris, interdum depressis, artubus omnino flaccidis. Accedente respiratione stertorosa, alias placida, intra aliquot dies mors. Est senibus familiaris. Conducunt motus, frictiones, vesicatoria, cardiaca, sternutatoria, emetica, neruina.

β. *Somnolentia.* Puerorum sanorum habitudo dormiendi, conducunt similia.

5. *Periodica.*

LETHAR-

MORTON pyr. h. 25. 26. RAMAZ- B. C. Comm. Lips. I. 74. a BONA
ZINI de trit. mal. Mutin. p. 228. obs. med. p. 46. C.L.N. 1731. p. 188.
SYLVIVS de f. epid. Lugd. p.
RIVERII c. 2. o. 26. MEDICVS g) SAUV. sp. 1. 2.

LETHARGVS.

1. *Malignus* v. typhum.
2. *Torpidus*. 3. *Languidus*.
4. *Irritabilis* ^{h)}). Ex vita sedentaria, studiis nimis.
5. *Periodicus* ⁱ⁾).

TYPHOMANIA.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*.
3. *Languida*. 4. *Irritabilis*.
5. *Periodica*. MERCATVS. TORTI. WERLHOFF, MORTON ^{k)}). Epidemica dicitur apud Hispanos, saltem Castellanos, viguit circa Nemaufum 1761.

Variis sub formis haec atrox passio attentos etiam medicos deludit. Est vel cum intermittente designata, vel latente: aeger balbutiens verba mutilat, et vnum pro alio profert.

ECSTASIS. Haec, si alia, non rara.

CATALEPSIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis* ^{l)}). Signa morbi, hysteriae et catalepseos. Salus a motu, phlebotomia, diarrhoea diuturna.
5. *Periodica* ^{m)}).

PARAPHROSYNE.

1. *Maligna*. }
2. *Torpida*. } non rarae.
3. *Languida*. ^{l)}
4. *Irritabilis* ⁿ⁾). Puerperas adoriens, incipit a cephalalgia, et stipatur signis hysteriae et cedit antispasticis et roborantibus.

5. *Pe-*

h) v. SWIETEN §. 1010. SAUV. 1742. p. 47. E. N. C. dec. 2. a. 8. p. 238. DODON. obs. p. 195. 10.

i) FR. HOFFMANN. opp. III. 217.

k) SAUV. ip. 1.

l) SAUV. (p. 1

m) Act. Vratisl. T. XV. p. 204. PVZOS tr. des ecc. n. 44. v. SWIETEN. III. 523 sq. SAUV. sp. 8.

FR. HOFFMANN opp. III. Rec. period. §. 5 p. 41 MEDICVS p. 16.

n) SYDENH. T. I. p. 49. 60. 61.

PARAPHROSYNE.

5. *Periodica* ^o). Alternis diebus per 2 menses apyreta, foli cortici cedens.

PHRENITIS, PARAPHRENITIS.

1. *Maligna* ^p). Vigilium pertinax cum obliuione eorum, quae audiunt, aut ipsi dicunt: delirium furiosum, constans, difficilis et conuulsiva deglutitio: salus ab haemorrhagia, diarrhoea.
2. *Torpida*.
3. *Languida* ^q). Post superatas febres, potissimum amphimerinam hungaricam non raro superuenit iis, quos longa diaeta tenuissima, et plures euacuationes debilitarunt: pulsus mollis et debilis, calor natiuo non maior, lingua nitida. Salus a resicientibus et redeunte magis sanitate eccoproticis.
4. *Irritabilis*. 5. *Periodica*.

CEPHALITIS.

1. *Maligna* ^r). Typhus carcerum PRINGLE. Epidemica a. 1510. Pyrexia continua, ardens, anorexia cum horrore carnum, delirium, gastrodynia, nephralgia, dolor surarum et carebaria.
2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. 5. *Periodica*.

MANIA.

1. *Maligna*. Videre me, et curare per camphorae largum usum, memini.
2. *Torpida* 3. *Languida*.
4. *Irritabilis* ^s). Ex cardialgia hysterica cum hysteria mania.
5. *Periodica* ^t).

MELANCHOLIA. *Cum Speciebus.*

1. *Maligna*.

2. *Tor-*

o) Journ. de Med. Mars 1757. p. 195. SAUV. sp. 10.

p) SELLE p. 273.

q) MEYSEREY mal. des arm. II. n. 259. SAUV. sp. 16.

r) RIVERIUS C. 2. o. 63. 75. SAUV. f. 6.

s) KAAW BOERH. imp. fac Hipp. p. 258.

t) MEDICVS p. 41.

MELANCHOLIA.

2. *Torpida*. Oculi exauati, retracti, fixati, circulo fusco circumducti, languidi, illacrimantes, respiratio profunda, laboriosa, suspiriosa, anxietas, palpitatio frequens, lassitudo, virium defectus, aestus volaticus, obstipatio, anorexia.
3. *Languida*. Fugax.
4. *Irritabilis*. HOFFMANN, ALBERTI, LORRY, ZACCVT. LVSIT. ^{u)}). Frequens.
5. *Periodica* ^{x)}).

PANOPHOBIA.

3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. Frequentes.

NOSTALGIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida*.
3. *Languida*.
4. *Irritabilis* ^{y)}). Tritaea, vel tritacophya, synochus: nausea, anorexia, vomitus, citra saburram. Salus a cortice, narcoticis, eupeptis, patria.
5. *Periodica*.

ATHYMIA.

3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. Non rarae.

AMENTIA.

2. *Torpida*.
3. *Languida*.
4. *Irritabilis*.

SOMNAMBVLISMVS.

5. *Periodicus* ^{z)}).

DAEMONOMANIA.

AMNESIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida*.
3. *Languida* ^{a)}). A venere, et febris sequa.
4. *Irritabilis*. Non rara.
5. *Periodica* ^{b)}).

ACRIP-

u) Pr. h. L. I. p. 289 sq.

x) MEDICVS p. 37.

y) SAUV. sp. 2.

z) MEDICVS p. 34.

a) ETTMVELLER. SALMVTH c. I, o. 6. SAUV. sp. 1. et sp. 8.

b) E. N. C. dec. 2. a. 3. p. 114.

AGRYPNIA.

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. <i>Maligna</i> . | Frequens. | 2. <i>Torpida</i> . |
| 3. <i>Languida</i> . | Non rara. | 4. <i>Irritabilis</i> d). |
| 5. <i>Periodica</i> e). | | |

CEPHALALGIA. CEPHALAEA. CAREBARIA. HEMICRANIA.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. <i>Maligna</i> . | } Non rara. | |
| 2. <i>Torpida</i> . | | |
| 3. <i>Languida</i> . | | |
| 4. <i>Irritabilis</i> f). | Dolor atrox capitis, perterebrans, in parte non raro, quam pollex, vel ouum tegeret, clavi infixi sensationem referens, cum animi desperatione, saepe delirio, ita, vt vehemens in dolores occipitis et spasmos, ad cervicem et scapulas protensos, transeat. Salsus a laudano, fero lactis. | |
| 5. <i>Periodica</i> ff). | | |

MENINGORRHOEA.

AMBLYOPIA.

HEMERALOPIA.

5. *Periodica* g).

DIPLOPIA.

4. *Irritabilis* h).
- Ab epilepsia, paralyti, terrore, debilitate.

VERTIGO.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 4. <i>Irritabilis</i> i). | 5. <i>Periodica</i> k). |
|---------------------------|-------------------------|

CALIGO.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. <i>Maligna</i> . | 2. <i>Torpida</i> . |
| 3. <i>Languida</i> l). | Rhytidosis est subsidentia et corruga- |

d) WILLIS. an. brut. P. 2. c. 2. TISSOT op. I. 85.

e) MEDICVS p. 34.

f) SCHENCK p. 83. TISSOT. SYDENH. SAUV. ceph. 1p. 12. & hemicr. 1p. 6. CL. RAHN. d. §. 2.

ff) SYDENH. l. p. v. SWIETEN. §. 757. De HAEN febr. div. p. Journ. de Med. T. 42. p. 432. A. A. f. pr. A. T. 2. t. 4. p. 72. MORTON p. 32. GRANT. p. 236.

MEDICVS p. 61. p. 67. SAUV. 1p. 4. & 7.

g) Med. obs. nd inq. vol. I. p. III.

h) WILLIS. an. brut. c. 15. PLATER obi. l. I. o BONET. sep. obs. 22. 43 44 SAUV. 1p. 2. 3. 6. 9. i) LITTMVILLER. RAHN d. p. 27. 1q. SAUV. 1p. 3.

k) Journ. de Med. T. 15. p. 38. MEDICVS p. 71.

l) SENNERT. MAUCHART. SAUV. 1p. 17. a rhytidosi.

CALIGO.

rugatio corneae: vbi vel non generatur, vt in senectute, humor aqueus, vel exhauritur, vt in acutis, quibus sanatis euanescit. Si a siccate et calore, curatur fomentis emollientibus, balneo oculi, rel.

4. *Irritabilis* ^m). 5. *Periodica*.

CATARACTA.

3. *Languida* ⁿ). A venere immodica, intensiori oculorum usu.

AMAVROSIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida* ^o).
 4. *Irritabilis* ^p). A vomituritionibus, vomitu, frequentibus: interdum non ultra aliquot horas durat.
 5. *Periodica* ^q). Quotidie, aut alternis diebus, aut omni mense per 14 dies recurrens.

OPHTHALMIA. OPTHALMITES. CHEMOSIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
 4. *Irritabilis*. Non rara.
 5. *Periodica* ^r). Dolor oculi atrox, lacrimatio, fitis vrgens, pulsus celeres, fortes.

ANCILOPS. AEGILOPS.

EPIPHORA.

3. *Languida* ^s). 4. *Irritabilis* ^t).

NYSTAGMVS.

STRA-

m) SCHMUCKERS chir. Schr. II.

n) CALLISEN p. 813.

o) LOMM obs. de tabe dorf. SAUV. sp. 16. Journ. de Med. Mars. 1768. p. 224.

p) SCHMUCKER. chir. Schr. II. RICHT. B. V. 22. S. YVES c. 28. p. 347. SAUV. sp. 15.

q) STORCH a. m. p. 75. F. PLATER, S. YVES. IANIN obs. 4.

de hypop. p. 360. SENAC. I. 2. c. 2. p. 15.

r) MORTON pyret. I. c. 9. TORTI. p. 426. E. N. C. dec. 3. a. 2. p. 330. SENAC. febr. I. 2. c. 2. p. 135. v. SWIETEN II. 534. Journ. de Med. sept. 1760. p. 228. ROSENSTEIN. p. 415. MEDICVS p. SAUV. sp. 23. RIGLER C. E. p. 136.

s) RICHTER II. I. p. ex aegilope.

t) SYDENH. I. 259.

STRABISMVS.

1. *Malignus*.2. *Torpidus*.

a. A paralyfi u). Ex resolutio alterutro musculo recto oculi, ut oculus versus eum musculum vertatur. Salus a tonicis.

b. Buffoni v). Ex alterutrius oculi debilitate, ut v. g. oculus dexter non videat ultra semipedem, et finitester ultra pedem. Et est vel natiuus, incurabilis, vel a paralyfi, epilepsia, consuetudine. Salus a tonicis.

3. *Languidus*.4. *Irritabilis*.5. *Periodicus* x).

DYSECOEA.

1. *Maligna*.2. *Torpida*.3. *Languida*. Frequens.4. *Irritabilis*. Frequenter occurrit.5. *Periodica*.

COPHOSIS.

1. *Maligna*.2. *Torpida*.3. *Languida*.4. *Irritabilis*.5. *Periodica* y).

PARACVSIS.

1. *Maligna*.2. *Torpida*.3. *Languida*. Non rara. — Huc sp. e. f. pathol. general.

4. *Irritabilis* z). Ex musices, lyrae, tonitru, auditu, aut sola meatus auditorii externi contrectatione, vomitus, urinae incontinentia. Nimia igitur organi auditus sensibilitas, per sympathiam varias passiones excitans.

5. *Periodica*.

SYRIGMVS.

1. *Malignus*.2. *Torpidus*.

3. *Languidus* a). A fame, veneris abusu, lipothymia, morbo superato.

4. *Irritabilis* b).5. *Periodica*.

V 2

OTI-

u) SAUV. sp. 5.

z) E. N. C. dec. 3. a. 3. obs.

v) Mem. de l'ac. des Sc. 1743.

182. dec. 1. a. 1. o. 194. A. N. C.

5. sp. Ess. d'Edinb. III 298

vol. 2 obs. 200. PECHLIN. L. 2.

x) BORELL. obs. C. 2. o. 1.

obs. 45.

y) N. A. N. C. vol. 2. p. 179.

a) RIVERII pp. SAUV sp. 1 9.

E. N. C. c. 5 & 6. p. 27.

b) HOFFMANN. SAUV. sp. 7. 9.

OTITIS. OTALGIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica* ^{c)}).

OTORRHAGIA.

OTORRHOEA.

ANOSMIA. PAROSMIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{d)}). Odoratus spontaneus simulatus lotii.
5. *Periodica* ^{e)}). Inguente opisthotono odor moschi.

NASITIS.

1. *Maligna* ^{f)}). In malignis nasus purpureus, brunneus, nigricans, tumidus, pustulosus, mortem praenunciat. Ex 20. vix 2. euadunt. Accedit gangraena, aromaticis curanda.
2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica* ^{g)}).

EPISTAXIS. RHINORRHAGIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* ^{h)}).

CORYZA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis* ⁱ⁾).
5. *Periodica* ^{k)}). Cephalalgia, capitis intumescencia, sinuum infarctus mucosus, limpidus, acer.

OZAENA.

RHINOSTEGNOSIS.

RHINOCRESMOS.

GELA-

c) Eph. Vratisslav. 1726. p. 487. 7 & 8. p. 394. A. N. C. vol. 3. N. A. N. C. T. 2. p. 362. SENAC. app. p. 171. vol. 4. p. 51. sq. SCHENCK. p. 564. Comm. Litt. N. r. 1731. p. 59. 1738. p. 283. ROSENSTEIN p. 415.

d) HARDER, obs. 40.

e) Aët. Mogunt. I. 305.

f) SAUV. gutta rosea sp. 4. de MEYSERREY t. 2. 241.

g) E. N. C. dec. 3. a. 3. p. 68.

h) BLANCARD in diar. Holl. C. 6. obs. 14. E. N. C. dec. 3. a.

i) BRENDL. d. de valet. ex hyp. §. 6.

k) Journ. de med. Mars 1751. p. 196.

GELASMVS.

1. *Malignus*. Non rarus. 2. *Torpidus*.
3. *Languidus*. 4. *Irritabilis* ¹⁾). 5. *Periodicus*.

STENOSTEGNOSIS.

CHILON.

1. *Malignum*. 2. *Torpidum*.
3. *Languidum*. 4. *Irritabile*. 5. *Periodicum* ^{m)}).

STOMADYSODIA.

TRISMVS.

1. *Malignus*. 2. *Torpidus*. 3. *Languidus*.
4. *Irritabilis* ⁿ⁾). Maxima et dolorifica os aperiendi difficultas, ptyalismus vber, agrypnia, musculorum maxillae et vicinorum agitatio continua, dolores vagi capitis. Salus etiam ab inuisione nerui adfecti aut partis vicinae, vesicator.
5. *Periodicus*.

AMASTESIS. BRADYMASTESIS.

PTYALISMVS.

1. *Malignus*. 2. *Torpidus*. 3. *Languidus*.
4. *Irritabilis* ^{o)}). Saepe quantus est a mercurio.
5. *Periodicus* ^{p)}).

STOMACACE.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. 5. *Periodica* ^{q)}).

ODONTITIS. ODONTALGIA. PARVLIS. EPVLIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis* ^{r)}). 5. *Periodica* ^{s)}).

PRI-

1) Journ. de Med. T. II. p. 312. p. 100. vol. I. p. 90. vol. II. p. 457.

m) E. N. C. cent. 7 & 8. p. 411. MEDICVS. p.

n) ANDRE, obs. 2. 3. 4. p. 343 sq. q) SCHENCK p. 359. ARNOLD

o) BALLON. L. 2. conf. 49. SYLVII pr. MORTON. ROEPER d. de ptyal. SARCONE §. 74.

p) E. N. C. dec. 2. a. 8 p. 229. dec. 3. a. 3. p. 57. A. N. C. vol. X.

BOOT. de adf. omiff. p. 25. R. A. VOGEL. de morb. rar. p. 23. C. L. Nor. 1735. p. 131. MEDICVS p. 57 sq. LAVTTER hist. m. 26. p. 15.

r) SYDENH. I. p. 258. RAVLIN. mal. p. 25. TISSOT op. 1 87.

s) TORTI p. 438. MEDICVS p. 88 sq. STOLL. III. 95.

PRISIS.

AGHEVSTIA.

GLOSSITIS.

RANVLA.

PARAGLOSSE.

MYTITAS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.4. *Irritabilis* ^t).

β. A glossolyfi ^u). Aegri linguam nec exserere, nec mouere possunt, deglutitio difficilis, ciborum in ore volutatio: apoplexiae aut hemiplegiae saepe comes aut pedisequa. Salus ab excitantibus, neruinis, roborantibus, sialagogis.

5. *Periodica* ^x).

APHONIA.

4. *Irritabilis* ^y). Etiam ex hemiplegia, apoplexiae recidiuam portendens. Salus ab excitantibus, neruinis.

CYNANCHE. ANGINA.

1. *Maligna* ^z). Post horrorem, calorem, ecclipsin, cephalalgiam, cynanche; sitis, anxietas, calor mordax, ficcus: pulsus celeres, subduri, lingua sicca, ptyalismus mediocris, dysphagia tolerabilis: glandulae maxillares et parotides admodum tumidae, inflammatae, reliquae minus: in maiori malo sopor, paraphrosyne: pyrexia atypica; nullum a phlebotomia leuamen, nec a reliquis remediis, in angina sollemnibus. Malum in primis infantes tenuit, intra sex primos dies exanthema, rubeolae simile, primum faciem, dein humeros et pedes occupans, post aliquot dies euauit: aliquos miliaris

^t) BRENDÉL, T. I. p. 184. SAL-MYTH. I. 30. o. 28. HALLER! el. phys. III. 473. SAUV. sp. 6.

^u) SAUV. sp. I.

^x) E. N. C. cent. 9 & 10. p. 257. dec. 2. a. 5. p. 45. A. N. C. vol. 2.

p. 149. vol. 4. obs. 109. SCHENCK obs. p. 97. Rec. period. T. I. p. p. 446. MEDICVS p. 92 sq.

^y) E. N. C. dec. 2. a. 7. o. 133. SAUV. sp. 7 & 8.

^z) TISSOT §. 117. SAUV. sp. 15.

CYNANCHE. ANGINA.

ris rubra vel alba tenuit: ab exanthemate leuamen et a sudore salus, qui etiam conducebat ad finem mali obueniens exanthematis expertibus. Post morbi fugam in omnibus cuticulae desquammatio. Vox in multis alienata modo singulari. Sanitas aegre rediens, et a frigore, suscepto iusto citius, detentiones serosae in variis partibus molestae. Salus in adultis a phlebotomia, interdum emetico, diapnoicis, vesicatoriis.

Procul dubio rectius ad scarlatinam referenda.

2. *Torpida. Trachealis* ^{a)}). Humidam, polyposam etiam dicendam, vidi in femina tenera, post nimia, phlebotomiam, catamenia, adiapneustiam. Salus (abstinendo a phlebotomia, hirudinibus, ob pulsus debiles, molles, minus frequentes, et supra dicta) a vesicatorio ad nucham, usu resoluentium, antispasticorum, roborantium, producente, praeter vrinam criticam, sputa caseosa critica. Signa praeterea ea, quae enarrantur in pathologia catarrheumatis ad cynanchen trachealem, (vt haec tamen passiuua esset), inprimis vocis indoles, suffocationis spasticae, ab obstipatione per polyposam membranam, metus.

3. *Languida.* QVARIN paralytodea ^{b)}). Post continuas et intermittentes longiores, euacuationibus iusto copiosioribus institutis oritur ex vario morbo: pallor, siccitas, tenuitas faucium, facies hippocratica, angina. Salus a replentibus, roborantibus, sed raro aeger talia deglutire potest, hinc iniiciantur enemata nutrientia, roborantia, interdum ex cortice. In eadem a nimia venere nux indica, iuglandes conditae, cum syr. cinam. interdum conducunt.

4. *Irritabilis* ^{c)}). Quotidie periodice reuertitur cum sopore,

^{a)} HELD. Ausz. I. 265.

^{b)} Infl. p. 51. sq.

^{c)} RIVERII C. 2.0.26. FR. HOFFMANN. SAUV. sp. 9.

CYNANCHE. ANGINA.

porre, nausea, suffocatione, doloribus vagis, dysphagia, hysteria rel. Salus a laudano.

5. *Periodica.*

HYDROPHOBIA.

1. *Maligna* d). Comes febrium neruofarum, malignarum, vt hemitritaei, typhi, phrenitidis, epilepsiae, cynanches, peripneumoniae, gastritidis, cephalitidis.

β. RABIES CANINA. *Auct.* e). Oritur ex animalis morfu per venenum, ope salivae et vulneris communicatum, hydrophobia cum mordendi alios non raro desiderio. Salus aut leuamen a vulneris scarificatione, cruentatione, cantharidum etiam pulvere illato, et vesicator. adplicatione, inunct. mercurii ad dies 40. moscho, cinnab. opio, remedio Borussico, interdum balneis.

2. *Torpida.*

3. *Languida.*

4. *Irritabilis.*

5. *Periodica* f).

DYSPHAGIA.

1. *Maligna* g).

2. *Torpida* h). Apoplexiae, paralyseos, comes; musculorum laryngis atonia et resolutio statuitur causa adfectus continui, vbi solida tantum deglutiuntur, fluidiora per os et nares regurgitant, aut in laryngem illabuntur. Dolor nullus, resistentia nulla, stilo immisso obiecta.

3. *Languida* i). Remanet dysphagia post vlcera venereorum sanationem, sponte sanatur.

4. *Irrit-*

d) SALMVTH. C. 2. o. 52. BO-
RELL. castr. C. 3. o. 38. A. N. C.
T. 3. o. 205. Ést. d'Edimb. T. 1.
Journ. de med. Avr. 1761. Aout
1750. SAUV. sp. 2.

e) SAUV. sp. 1.

f) DONAT. hist. mirab. p. 297.
E. N. C. cent. 3 & 4. p. 115. cent.
9 et 10. p. 171. Comm. Litt. Nor.
1739. p. 5. 1740. p. 282. 1744. p.

35. Rec. period. T. 6. 320. T. 7.
p. 3. MEDICVS p. 134.

g) HIPPOCRAT. Coac. §. 62.
KLOECKH. op. p. 161 sq.

h) FOREST. I. 15. c. 30. TVLP.
I. 44. v. SWIETEN I. 702. SAUV.
sp. 3. Comm. Harlem. XI. p. 1.
p. 214.

i) PLENCK m. v. p. 100. DVN-
CAN. med. cas. p. 176.

DYSPHAGIA.

4. *Irritabilis* ^k).

a. *Spasmus pharyngis*: difficultas deglutiendi, ut nec solida, nec fluida, transeant, rigida vicinorum constrictio, dolor, impeditus motus, molestia suffocativa, sensus palii infixi, quasi quidquam inde proserperet, aphonia, interdum convulsiones, eclampsia.

b. *Gulae inferioris spasmus*: sensus deglutorum haerentium in tubo oesophagi, maxime circa cardiam, imprimis a potu frigido, dolor in spina dorso intra scapulas, nausea, ructus, muci limpidi ex oesophago reiectio. Saepe opisthotoni comes, aut palpitationis et epialae. Salus a cataplasmate anod. ex theriaca, aromaticis, oleo macis et spiritu camphorato, enemate ex opio, fumo nicot.

5. *Periodica* ^l).

TRACHELOPHYMA.

5. *Periodicum* ^m).

OBSTIPITAS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*

4. *Irritabilis* ⁿ). Renuens, annuens, lateralis. Salus a frictionibus, resolventibus, balneis.

5. *Periodica.*

III. PASSIONES THORACIS.

MASTODYNIA.

SPARGANOSIS.

AGALACTIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.* Certe dantur.

GALACTIRRHOEA.

OSCEDO.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*

4. *Irri-*

k) FR. HOFFMANN. BONET. sep. FOREST. X. 112. 113. SAUV. sp. 1. 2. Aët. Helvet. vol. II. p. 94. Hist. de l'ac. des Sc. de Par. 1768. p. 45.

l) WILLIS. an. brut. p. 209.

m) HEISTER Wahrnehm. p. 838.

n) SAUV. sp. 1. 2. 5. 6.

OSCEDO.

4. *Irritabilis* o). Prodromus hysteriae.
5. *Periodica* p).

SINGULTVS.

1. *Malignus*. 2. *Torpidus*.
3. *Languidus* q). Ab inanitione, vomitu, diarrhoea, haemorrhagia, venere, immodicis. Salus a (remotione morbi et passionis primariae, tum) anodynis, repletibus, analepticis.
4. *Irritabilis* r). Spasmodum abdominalium pedisequa et comes, ab atonia viscerum abdominalium. Salus etiam a linimentis, pannis calidis, aromaticorum fumo imbutis, cucurbitulis.
5. *Periodicus* s).

STERNVTATIO.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. 5. *Periodica* t).

TVSSIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.
4. *Irritabilis* u). Corripit, qui debilitate ventriculi laborant, hinc et ipasimis saepe corripuntur: unde et eos, qui grauiori sepsi, aut neurosi maligna, laborarunt diu, molestae tussi, vesperi noctuque in primis infestanti, obnoxii sunt. Sputa aut nulla, aut spumosa, imo non raro puriformia. Dolor in thorace nullus, nisi a diuturna et validiori tussi, nulla in respirando difficultas; at scrobiculum dolet, indeque, si attentius obserues, irritamentum ad fauces, gutturue, et demum ad thora-

o) SAUV. sp. 4.

p) MEAD op. I. p. 49.

q) TRALLES op. p. 112. HOFFMANN de sing. §. 7, 17. HIPPOCR. aph. VII. 3, SAUV. sp. 8.

r) HOFFMANN. TRALLES l. c. SAUV. sp. 25. & 5. 27. BONETI scpt. med. l. 5. f. 5. c. 6.

s) SENAC. l. 2. c. 2, p. 134. ME-

DICVS. p. 123. RIVERIUS C. I. o. 47. C. III. o. 78. SAUV. amphi. sp. 14.

t) E. N. C. dec. 2. a. 8. p. 229. A. N. C. vol. 2. p. 432. vol. 3. p. 200. SALMVTH. C. I. obs. 39 Ast. Suec. vol. XXIII. p. 296 sq.

u) BALLON. SAUV. sp. 2. STOLL. R. M. l. p. 229. 238.

TVSSIS.

thoracem prodit, vt a validiori tantum succussione humores ad pulmones alliciantur, iique vitium contrahant. Salus a roborantibus, stomachicis, polygala, lichene island., exercitiis, lacticiis, narcoticis.

5. *Periodica* x).

CATARRHVS.

1. *Malignus*.

2. *Torpidus* y). In speciem typhi aegrotos detinet. Salus, praeter mites primarum viarum per emetica et ecoprotica euacuationes, a neruinis cardiacis, diaphoreticis, praecipue cortice.

3. *Languidus* z). Ex neglecta febris maligna conualescentibus familiaris, roborantibus et stomachicis obtemperat.

4. *Irritabilis* a). Non raro in hypochondriacis obuius.

5. *Periodicus* b).

PLEVRODYNE.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.

4. *Irritabilis* c). Spasinis abdominalibus, et flatuum, scybalorum, in intestino colo retentioni, debetur: pectoris partem subito corripit dirus dolor, subito iterum recedens, oppressio in loco dolente respirationem intercipit, nulla tussis vrget, pulsus est lentus, contractus. Salus a calore, frictionibus pectoris et abdominis, carminatiuis, enemate,

5. *Periodica* d).

PNEV-

x) SENAC. l. 2. c. 2. p. 134. ROSENSTEIN, de tussi p. 415. MEDICVS. p. 113. HOME med. facts. p. 145.

y) BACKER de cat. et dysf. Lond. p. 13. RAHN. d. c. p. 45.

z) STOLL. III. 43.

a) BRENDL. de val. ex hyp. §. 6.

b) Rec. period. T. 6. p. 197. RAHN. d. c. p. 46.

c) VERNA. C II. p. 87. STOERCK. I. 78. v. SWIETEN. §. 633. 675. BALLON. epid. p. 7. 8. 18. 54. BIANCHI h. h. p. 235. PRINGLE. p. SAUV. sp. 4 & 6.

d) MORTON. pyr. p. 93. Journ. de Med. Mars 1761. p. 211. SAUV. sp. 15.

PNEVMONIA.

PLEVRITIS.

1. *Maligna* ^e). Oritur ex biliosa, vbi phlebotomia, et emeto-cathartica rite adhibita morbum augent. Salus a decocto corticis Peruv. cum camphora, inf. rad. serpent. virg. contray. angel. vesicator. sinapismis.
2. *Torpida.* 3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* ^f). Per paroxysmos, a frigore incipientes, sudore terminatos, corripit.

PLEVROPERIPNEVMONIA.

2. *Maligna.* Ecclipsis summa, syncope frequens, pulsus molles, intermittentes, rari, respiratio brevis, dolorifica, tussis sicca, lingua alba; leuamen, salus ab extracto cort. Peruv. et pectoral. suadent, hanc me vidisse.
2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

PERIPNEVMONIA.

1. *Maligna* ^g). 2. *Torpida.* Simulata ^h).
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.* Chronica, hysterica.
5. *Periodica.*

HAEMOPTYSIS.

1. *Maligna.*
2. *Torpida* ⁱ).
 - a. Ex pulmonum laxitate nimia oriunda: sanguis reiectus est rutilus, spumofus, absentia spasminorum.
 - b. Ex pulmonum substantia remollita, flaccida, quasi ex spongia dicitur exprimi, cum frustis pulmonum nigris,

e) STOLL. I. 18.

f) MORTON pyr. p. 341. h. 8. et de inte m. gn. p. 33. TORTI l. 5. c. 6. VALLES. in epid. l. 1. f. 3. SENAC. c. 18. p. 102. LAVTTER hist. med. C. 2. c. 5. 9 v. SWIETEN. III. 445 sq. De HAEN. T. 2. p. 91. & febr. div. p. 139. SARCONI. §. 165. 233 sq. MEDICVS. p. 218. SAUV.

epid. Monsp. 1760. I. p. 351. et sp. 4. & tritaea sp. 4.

g) QVARIN infl. p. 112.

h) HVXHAM. II. 87.

i) DODON. obs. c. 24. STOLL. I. 50. III. 16. HALLERI el. phys. I. 103. PECHLIN. obs. L. I. obs. 43. HVXHAM. febr. p. 44. 191.

HAEMOPTYSIS.

nigris, sphaelo corruptis; sanguis spumofus, nigricans, cum tuffi viuida eiicitur.

3. *Languida* ^k). A feminis iactura nimia: carnis iactura, capillorum defluuium, membri virilis laxitas, mifanthropia, triftitia, hypochondriafis, melancholia, oculi concaui, album oculorum flauum aut fubfufcum; initio circa os fterni tenfiones et continuus ardor, tuffis ficca.
4. *Irritabilis* ^l). Hypochondriacis, hystericis familiaris. Salus a balneis, enematibus, frigidis, ptifana refrigerante.
5. *Periodica* ^m). Orthopnoea tempore paroxyfmi, tuffis ficca, violenta, anxietas.

PNEVMOPHTHOE.

1. *Maligna*.

2. *Torpida* ⁿ). Pituitofa *auct.* Alios morbos, fractis multum viribus, fequitur: incipit a tuffi, catarrho, peripneumonia; fputa initio liquida, frequentia, tum tenacia, albida, aquam colore albo tingentia, flauefcentia, dein viridefcentia, mucofa, multa, fubcruenta, fubdulcia, falfa: mox pectoris dolores pungentes, obtufi, mox nulli, febris amphimerina, ephidrofis, diarrhoea, oedematia pedum, mors ex fuffocatione aut eclipfi. (Credit Cl. MURRAY, et consentiunt obferuata, chylum per fputa perire.) Salus a cort. Peruv. cum quaffia, polyg. amara, lich. island. rad. arnic. fero lactis, lacte afin. humano, tindtura martis, equitat. et vefitione in curru: fuffimig. balfamicis, ore hauffis.

3. *Lan-*

k) TISSOT I. p. STOERCK. II. 216.

l) FR. HOFFMANN M. R. S. t. 4. p. 2. SCHROEDER d. de haem. op. II. 331. POMME mal. vap. obf. 8. p. 105.

m) MEDICVS p. 115. STOERCK. II. 165.

n) De HAEN. III. c. 5. p. 187. I. A. MURRAY pr. de phth. pituit. Goerr 1776 STOLL I. 204. fq. II. 98. CHALMERS Dif. of South Carol.

PNEVMOPHTHOE.

3. *Languida* ^o). A nimia venere.
4. *Irritabilis* ^p). Hypochondriasis, hysteriae, melancholiae pedisequa. Salus a castoreo, narcoticis, spir. C. C. usu rhei, pilul. balsam. pector., aquis martialibus, antequam pulmo vere exesus esse credendus.
5. *Periodica* ^q). Post intermittentis larvam, signa pneumophthoës. Salus a cortice, beccihicis admixto.

ANHELATIO.

1. *Maligna*.
2. *Torpidæ* ^r). ORTHOPNOEA. Debilitas ex febrî superata, potiss. organi, respirationem perficientis, hinc a somno capto, solis agentibus musculis inuoluntariis, vitalibus, suffocationis metus. Salus a somno impedito, neruinis.
3. *Languida* ^s). Puerperis, hydropicis, haemorrhagiam passis, rel. familiaris. Illis accidit, dum moles abdominis subito detrahitur.
4. *Irritabilis*. ORTHOPNOEA ^t). ASTHMA ^u). EPHIALTES ^x). Hypochondriacis, hystericiis, melancholicis, nostris familiaris, ob organa respirationis varie laesa. Orthopnoea, praecipue durante coitu, aut sub hysteriae paroxysmo excitata, designatur per respirationem velocem, laboriosam, praecipitem, cum spasmodica pectoris agitatione, voce rauca, obscura, et summo suffocationis metu. Vbi vero anacatharsis nulla est, et post

o) TISSOT, STOERCK l. c.

p) MORTON c. 4. SAUV. sp. 16.

q) MORTON phthis. c. 12. TRALLERES op. 4. p. 22. WERLHOFF p. 54. SAUV. 12.

r) Med. obs. and inq. vol. I. a. 3. p. 36.

s) SAUV. sp. 19. PLATNER, chir. §. GERNHARD d. de spasm. ab inanin. L. 1755.

t) BAGLIV. l. 2. p. 203. BALLOL. epidem. p. 198. BARTHOL.

c. 4. ep. 454. SOLENAND. conf.

14. WILLIS. nerv. c. 26. FORESTI obs. VI. 10. SAUV. sp. 3. 4.

u) WILLIS c. 12. de asthm. BAGLIV l. c. BOERHAAVE conf. ARETAEVS l. 3. c. 11. ETTMVELLER p. 162. FR. HOFFMANN de asthm.

HELMONT. p. 14. HQRST. l. 5. o. 32 FLOYER de asthm. p. 113. RIVERII l. 7. c. 1. SAUV. sp. 2. 3. 4.

x) ETTMVELLER. SCHENCK. RHOD. c. 1. obs. 54. SAUV. sp. 6.

ANHELATIO.¹

post pleurospasium subito cum violentis symptomatibus, non raro convulsionibus, corripit, humido non dissimile ceterum, asthma *siccum* vel *convulsivum* dicunt. Saluti sunt antispastica, anodyna, roborantia.

5. *Periodica*. ORTHOPNOEA ^y). ASTHMA ^z). EPHE-
ALTES ^a).

CARDITIS.

PALPITATIO.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*.
3. *Languida* ^b). A nimia venere, studiis nimis.
4. *Irritabilis* ^c). 5. *Periodica* ^d).

ANXIETAS.

1. *Maligna*. Frequens. 2. *Torpida*.
3. *Languida*. Non rara.
4. *Irritabilis* ^e). 5. *Periodica* ^f).

CARDIOGMVS.

3. *Languidus*. 4. *Irritabilis*. Frequentes.

III. PASSIONES ABDOMINIS.

HEPATITIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*.
3. *Languida*. 4. *Irritabilis*.
5. *Periodica* ^g). Signa morbi et passionis: sub insultu frigore hepatitis; post insultum crisis imperfecta per sputa et aluum: tussis mediocris, sputa copiosa, faciliora. Salus

y) MORTON. pyr. p. 139. h. 7. et p. 74. E. N. C. dec. 3. a. 5 & 6. p. 243. A. N. C. vol. 8. p. 39. SAUV. sp. 20.

z) Comm. Bonon. V. p. 2. p. 216. SYLVIVS de interm. TORTI p. 302. E. N. C. dec. 3. a. 2. p. 122. A. N. C. vol. 8. obs. 114. vol. 3. obs. 59. MEAD l. 48. SAUV. sp. 18.

a) FOREST. t. 10. o. 52. SAUV. sp. 5.

b) HOFFMANN M. R. S. p. 3. S. I. c. I. §. 29.

c) SYDENH. RHOD. l. 2. o. 40. SAUV. sp. 12. 13. 14. SENNERT. pr. IV. l. 3. p. 5. S. I. c. 4.

d) MORTON op. p. 246. 249 sq. STOERCK l. 75. II. 163. SENAC l. 2. c. 2.

e) BOERHAAVE §. 633. SAUV. sp. 2.

f) SENAC l. 2. c. 2. p. 134.

g) SARCONI §. 265 sq. E. N. C. dec. 3. a. 4. p. 186.

HEPATITIS.

lus a cortice audacter propinato, quamvis subsequens paroxysmus maior sit praecedenti, et dein soluentibus.

SPLENITIS.

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Maligna.</i> | 2. <i>Torpida.</i> |
| 3. <i>Languida.</i> | 4. <i>Irritabilis.</i> Non rara. |
| 5. <i>Periodica.</i> | |

PANCREATITIS.

PERITONITIS. EPIPLOITIS.

GASTRITIS.

APEPSIA BRADYPEPSIA. DYSPEPSIA.

1. *Maligna.* Non rara.
2. *Torpida.* APEPSIA ^{h)}). A nervorum resolutione paralytica: et comes apoplexiae, cari, catalepticos. Continua grauitas stomachi, nausea, vomitum.
- β. BRADYPEPSIA ⁱ⁾). Inappetentia, dolores, comprimendo, distendendo, et grauius rodendo, molestantes, excitati a leui errore in victu et exercitio, admissio ad epigastrium frigore, cibis dyspeptis. Debilibus, senibus, frigidis et humidis abutentibus, familiaris. Salus ab eupeptis, stomachicis, etiam externis, diaeta congrua.
3. *Languida.* APEPSIA. BRADYPEPSIA ^{k)}). A venere, maxime ante digestionem, aestiuo tempore, frequenter, stante corpore, ab imaginatione, non a natura excitata, apud senes rel. peracta. Salus ab abstinentia a venere, cibis eupeptis, vsu lactis, ambrae, coccolatae, rad. ginseng. rel. BVLIMIA ^{l)}). A morbo conualescentes, exhausti, non raro hac laborant, vt de se ipso

h) Mem. de l'ac. des Sc. 1756. p. 223. SENNERT. BONETI sep. t. 2. obs. 1. SAUV. anorexia sp. 1. et cardialg. sp. 7.

i) PLATER. p. 396. 377. SAUV. sp. 9. cardialg.

k) SANCTOR. med. stat. f. 6. P. ALPINVS de med. Aegypt. SAUV. anorex. sp. 8.

l) SAUV. II. 217.

DYSPEPSIA.

ipſo narrat SAUVAGESIVS, atque ego in me aliisque vidi.

4. *Irritabilis.* Dyspepsia irritabilis declaratur per CARDIALGIAM, GASTRODYNIAM ^{m)}, FLATULENTIAM ⁿ⁾, BVLIMIAM ^{o)}, VOMITVM ^{p)}, rel. Et GASTRODYNIA quidem, quam *flatulentam* dicunt, ſtipatur vehementi dolore tenſuo ſub cordis ſcrobiculo, dyſpnoea, trunci antrorſum ſtectendi neceſſitate, pulſus imminutione, depreſſione, anxietate ſumma, ita, vt dolor a preſſione non augeatur, omnium vero leuamen ſequatur a flatuum emiſſione.

Ea vero, quam *hystericam* dicunt, praeter dolorem, vomitum humorum virideſcentium, athymiam inferit: dolor, per aliquot dies vrgens, ceſſat, poſt plures ſeptimanas reuerſurus; ſedata autem paſſione, epigaſtrii ſenſibilitas, minimam preſſionem fugiens, adeſt, et ſaepe aurigo.

FLATVS erumpentes, nec acidi, nec nidoſi, vel inodori ſunt, vel adſumtorum odorem retinent.

BVLIMIA vero ſaepe comites habet cardialgiam, lienteriam, ingeſtorum vomitum, et quartanae, aſciti, aliisque chronicis paſſionibus, ſuperuenit, malo omine, lienteriam, atrophiam, aſcitem, inducens.

5. *Periodica.* CARDIALGIA ^{q)}. GASTRODYNIA ^{r)}. PYROSIS ^{s)}. BVLIMIA ^{t)}. POLYDIPSIA ^{u)}. VOMITVS ^{x)}.

CHO-

m) ETTMVELLER. FR. HOFFMANN. SAUV. ſp. 2. & 14. & 16. SYDENH. c. 7. pr. int. p. 669 ſq. De MEYSEREY n. 413.

n) IVNCKER. SAUV ſp. 3.

o) SAUV. ſp. 1 2

p) Rec period. T. V. p. 31. POMME mal. vſp. p. 91

q) MORTON C 9. h. 16. TORTI. l. 3. p. 125. 183. BARTHOL. l. 3. o. 50. SAUV. ſp. 4.

r) MORTON l. c. Journ. de med. Janv 1761. p. 25. MEDICVS p. 121. SAUV. ſp. 17.

s) E. N. C. cent. 7 & 8. p. 266. Miſc. Berol. T. 6. p. 71.

t) DODON. obſ. p. 155. DONAT h. m. p. 194. SCHENCK.

u) MEDICVS. p. 131.

x) Journ. de med. 1761. p. 35. 1757. mars p. 198. MEDICVS p. 13.

CHOLERA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica* ^y).

ENTERITIS. ILIACA. COLICA. MESENTERICA et OMEN-
TITIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* A nimia feminis profusione.
4. *Irritabilis.* *Colica* ^z). Dolor vehemens, vel leuissimum palpum refugiens, per intervalla, et subito sine causa euidenti recurrens, in intervallis partis veluti teneritudo et tactus intolerantia; alternatio cum visus obnubilatio-
ne, syncope, animi deiectione; vomitus, diarrhoea, viridescences; pyrexia, synochus aut typhus.
5. *Periodica.* *Colica* ^a).

RACHIALGIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^b). Forte omnis huc pertinet, ob egre-
gium et fere specificum opii usum.
5. *Periodica* ^c).

ILEVS.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus* ^d). 3. *Languidus.*
4. *Irritabilis* ^e). 5. *Periodicus* ^f).

HAEMATEMESIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{ff}). 5. *Periodica* ^g).

MELAENA.

5. *Periodica* ^h).

HAE-

y) MORTON pyr. p. 16. 33. 81.
TORTI l. 3. c. 1. p. 144. De MEY-
SEREY t. 2. a. 499. n. 214.

z) SYDENH. SAUV. sp. 17.

a) MORTON pyr. p. 33. h. 17.
MEDICVS. p. 147. §. 46. SENAC.
l. 2. c. 2.

b) DAELHAVSEN d. § 26. De
HAEN R. M. C. III. f. 6. STOLL. I.

c) TRONCHIN de rach. RIVE-
RU pr. l. 10. c. 1.

d) Phil. Trans. vol. 47. n. 16.
p. 123. Comm. Lipf. III. 18.

e) SENNERT. TVLP. l. 2. o.
41. SAUV. sp. 3.

f) DODON. pr. l. 2. c. 52. FO-
REST. obs. de trit.

ff) Mel. POMME mal. vap. p. 122.

g) MEDICVS p. 125.

h) TORTI l. 4. c. 1. h. 1. SE-
NAC. de febr. p. SAUV. sp. 6. 7.

HAEMORRHOIS. MARISCA. DYSHAEMORRHOIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodica* ⁱ).

PROCTITIS.

OBSTIPATIO.

1. *Maligna.*
2. *Torpida* ^k). A motu intestinorum languidiore, corporis quiete, studiis feneratoribus, somno longiore, paralyfi, paresi, soporosis passionibus. Salus a motu corporis, calefacientibus, stomachicis, catharticis.
3. *Languida* ^l). Ex abstinencia a victu, potu, vt in dysphagia; a coitu frequentiori.
4. *Irritabilis* ^m). Salus a balneis tepidis.
5. *Periodica.*

TENESMVS.

DYSENTERIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* ⁿ). Deiectiones sunt acres, biliosae, mucosae, cruentae, tormina, tenesmus, stomachi dolor, quasi eius membranae excoherentur ac diuellerentur: pyrexia intensior, quam in cholera, pulsus expansi; singultus, urinae crocea rubedo, linguae scabrities.

DIARRHOEA.

1. *Maligna.*
2. *Torpida* ^o). Debiles, exhaustos, pallidos adoriuntur ob languorem resorbentium. Excrementa naturalia, liquida. Salus a cibis siccis, abstinendo a iusculis aquosis, butyro; aqua cum cort. aurant. aut cinam. decocta et refrigerata, colata, quot. 2. v. 3. sunt. paruo

X 2

cochl.

i) MEDICVS p. 151.

k) De GORTER. II. 100.

l) De GORTER. II. §. 378.

m) POMME mal. vap. p. 84.

n) TORTI. l. 3. c. 1. p. 125.

MORTON. app. ad exerc. 2. CLEG-
HORN Min. p. WERLHOFF p. LAVT-TER h. m. c. 17. 20. GRAINGER.
p. 8. SAUV. sp. 17. WARTON app.
ad exerc. de febr. ep. A. MONRO
de dysf. in A. A. f. pr. A. T V.
p. 156.o) ROSENSTEIN sp. 3. p. 101 sq.
SAUV. sp. 2.

DIARRHOEA.

cochl. vini mart. v. tinct. mart. rel. De HAEN laudat ly-
simach. vulg. fl. purpur. puluer. cuius et flor. et rad. lau-
dantur decocta, ab aliis.

3. *Languida.* 4. *Irritabilis.* 5. *Periodica P).*

DYSENTERIA.

1. *Maligna.*

2. *Torpidā q).* Oritur post diarrhoeam, dysenteriam,
aphthas, rel. Ructus acidi bonum significant, qui sint a
retentis cibis. Salus a roborantibus, etiam sub lini-
menti forma epigastrio et dorso illitis.

3. *Languida.* 4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

COELIACA.

5. *Periodica r).*

HEPATIRRHOEA.

5. *Periodica s).*

ASCITES. INTERCVS. SPLANCHNODES.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus.*

3. *Languidus t).* Est a languore ab inanitione et colli-
quatione: vrina pauca, lixiuialis, fitis intensa, rel. Sa-
lus, praemissa catharsi a diaeta lactea, fitis tolerantia,
vsu diureticorum leniorum, roborantibus.

4. *Irritabilis.* 5. *Periodicus.*

TYMPANITES. METEORISMVS.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus.* 3. *Languidus.*
4. *Irritabilis.*

- α. *Intestinalis u).* Salus a fotu frigido, niue; aqua
pulli, fero lactis, enemate oleoso, balneis frigidis,
diarrhoea biliosa.

β. Me-

p) MORTON. pyr. p. 75. 80.
135. MEDICVS p. 143. SAUV. sp. 20.

q) ROSENSTEIN sp. II. diarrh.
p. III. SAUV. sp. 2.

r) ARETAEI diut. I. 2. c. 7. AE-
TII tetr. 3. f. I. c. 37. L. MERCATI
prax. I. 3. c. 10. V. RIEDLINI lin.
med. 2. 1697. III. oct. XVI.

s) TORTI p. 182. febr. hepat.
ei. p. 125. SAUV. sp. 7.

t) IVNCKER. SCHENCK. SAUV.
sp. 7.

u) AUVS. sp. 5. COMBALVSIER
n. 368. POMME eff. f. I. vap. obs.
14. 15.

TYMPANITES ^{cet.}

β. Meteorismus *).

5. *Periodicus*.

NEPHRITIS. NEPHRALGIA. VRETERITIS.

1. *Maligna*. 2. *Torpida*. 3. *Languida*.4. *Irritabilis* γ). Hystericas adoritur nephralgia continua immanis; accessio et fuga subitanea. Salus a narcoticis.5. *Periodica* z). Dolor dirissimus, vomitio, algor extremorum, lipothymia.

CYSTITIS. CYSTOSPASMVS. VRETHRITIS.

HAEMATVRIA.

2. *Torpida* a). 3. *Languida*.4. *Irritabilis*. 5. *Periodica* b).

PYVRIA.

DIABETES.

1. *Malignus*.2. *Torpidus* c). Indefinens non coërcibilis mictio, copiosior, quam potus, adipis colliquatio, sitis vrgens, salua spumosa, viscida, fastidium, animus dubius, praecordia graua: a retenta vrina tumor abdominis, testium, crescente passione calor mordax viscerum, tabes. Rara. Salus a diaeta lactea, equitatione, emulsionibus, mucilaginosi, inprimis vero tinct. cantharid. ad gutt. x. ex aqua propinata.β. *Anglicus* d). Ex abusu vini meracioris; oris siccitas, sitis magna, macies summa, asthenia, hectica: vrina odoris, coloris, et saporis mellei. Salus a diaeta lactea, mucilaginosi, adstringentibus, vt sero lact.

x) SAUV. sp. 3. RAVLIN. mal. vap. p. 29.

y) SYDENH. de col. bil. cap. 7. p. 132. et diff. epist. p. 430. SAUV. sp. 5.

z) MORTON pyr. h. 28. p. 101. MEDICVS. p. 157. SAUV. sp. 13. et retart. sp. 9.

a) C. L. N. 1731. p. 154.

b) MEDICVS p. 165.

c) ARETAEVS diur. l. 2. c. 2. DEIDIER conf. 58. A. A. f. pr. A. l. 2. p. 127 sq. SAUV. sp. 1.

d) MEAD de venen. collect. ac. T. 3. obs. 122. SAUV. sp. 2 & 5.

DIABETES.

lact. alumin. rheo, cinamomo, laudani dosi, aqua calcis.

γ. Febrifequus^e). Post intermittentes senibus, phlebotomiis et catharticis mulctatis, accidit. Salus a diaeta lactea et roborantibus.

δ. Spurius. *Chyluria*, *Chalacturia*^f). Iam initio excretio lactiformis, chylosae vrinae, citra sitim, cum febris lenta. Salus ab usu roborantium.

3. *Languidus*.

4. *Irritabilis* g). Hystericis familiaris saepe cum leucophlegmatia alternat. Salus a fero lactis aluminato ex lact. paul. coct. libr. IV. et alum. dragm. 3. cuius vnc. IV. ter quot. exhibeantur.

5. *Periodicus* h).

ENVRESIS.

1. *Maligna*.

2. *Torpida*ⁱ). A paralyfi sphincteris vesicae, ex laesione quavis cerebri, medullae spinalis, lumborum, ossis sacri, ex graviditate aut partu numerofo, diuturna prava infantum consuetudine, continuum fere vrinae stillicidium. Salus a fomentis spirituosiss, vnguentis nervuinis, perinaeo et regioni pubis adplicatis, infessu aromatico, chamaem., roris mar. salviae, rel. decoct., vesicatoriis ad os sacrum.

3. *Languida*. *Irritabilis*. 5. *Periodica*.

BRADYSVRIA.

1. *Maligna*.

2. *Torpida*. Pueris familiaris est voluntaria vrinae retentio, vesicae vires sensim ita debilitans, vt dein bradysuria frequenter per diem accadat.

3. *Lan-*

e) SYDENH. ep. resp. I. p. 192. NE de san. 177. SAUV. sp. 3. SAUV. sp. 7.

h) MEDICVS p. 161.

f) STOELLERI obs. I.

i) JVNCK. tab. 98. SAUV. sp. 2.

g) SYDENH. d. de hyst. CHEY. Med. ess. III, 138.

BRADYSVRIA.

3. *Languida*. 4. *Irritabilis*. Frequens.
5. *Periodica*. Vidi.

DYSVRIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida* ^{k)}). Post quemlibet pastum, non aucta urinae copia, nec frequentia, sed necessitate incoercibili, et cum leui irritatione vesicae, mingitur vrina aquosa, cruda, cum macie et febricula nocturna, quod in hysterica vidit D. COVLAS, in phthifica ipse. Salus a remediis, ad diabeten torpidum indicatis.
3. *Languida*.
4. *Irritabilis* ^{l)}). A spasmo hysterico sphincteris vesicae, calculum vesicae non raro simulat: vrina cruda, aquosa.

ISCHVRIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida*.
a. Renalis ^{m)}).
b. Vreterica. Comes et pedisequa aliorum morborum et passionum.
c. Vesicalis ⁿ⁾). Est a vesicae stupore, anaesthesia, ipsius fibrarum muscularium paracinesia perfecta vel imperfecta, vel ab utraque causa. Signa ischuriae verae, libertas urethrae, signa vesicae torporis, paralyseos. *Vesicae paralyxis perfecta*, ut sensus et motus simul laesi sint, designatur partim a causis, nimirum vertebrarum luxatione, fractura, medullae spinalis, maxime caudae equinae vulnere, protuberantiis, nervos ea
in

k) SAUV. sp. 17.

l) SYDENH. de hyster. p. 132. SAUV. sp. 1.

m) SALII DIVERSI. MERCATI. HORSTII T. 2. l. 4. obs. 49. MARC. DONATI h. m. l. 4. c. 28. BARTHOL. C. 4. ep. 18. 38. 39. HOECHSTETTER dec. 5. c. 20. SAUV. sp. 10.

n) LIEVTAVD syn. pr. I. p. ZACVT. LVST. med. pr. h. 140. MANGETI bibl. m. p. 1 t. 4. HOLLER. de morb. int. c. 47. AMATI LVST. C. 4. c. 10. Ess. d'Edinb. t. 2. art. 32. SAUV. sp. 21. GRAS-HVIS col. pist. p. 69. Med. obs. and inq. vol. I. p. 87.

ISCHVRIA.

in parte adficientibus, mora in locis humidis, aquis frigidioribus, praefidiis frigidissimis, ad vesicae regionem adplicatis, adfectibus soporosis, senio; partim a symptomatis, quorsum anodynia, renuens sensum, ab vrina collecta excitandum, partium aliarum ignavia, frigiditas, resolutio, mictio, subsequens tussim et nixum validum similem, et maxime hypogastrii pressionem, defectus denique signorum ischuriae cystophlegmaticae. *Imperfecta* vero vesicae paralyfis, ubi motus solus laesus, iisdem gaudet signis, praeter anodyniam. Leuamen salus a catheterismo repetito, remediis antiparalyticis variis, internis atque externis, et remotione causarum paralyseos.

d. Vrethrica.

3. *Languida.*4. *Irritabilis* o). Salus a balneis frigidis.5. *Periodica* p).

DYSMETRORRHOEA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida* q).4. *Irritabilis* r). Salus ab opio, castoreo, asa foet., fucino, marte, stachyde foet., zibetho.5. *Periodica.*

HYSTERALGIA.

1. *Maligna.*2. *Torpida.*3. *Languida* s).4. *Irritabilis.*5. *Periodica* t). Dolorum, spasmodorum, animi deliquii, vomitionis, vociferationis, ut in parturientibus, citra grauiditatem concursus, pulsus febriles, lingua sordida, vrina lateritia, periodus.

METRITIS.

1. *Maligna.*2. *Torpida.*3. *Lan-*

o) POMME mal. vap. p. 84.

r) SAGAR sp. 14.

p) MEDICVS p. 158.

s) SAUV. sp. 10.

q) SAGAR sp. 7.

t) MORTON. pyr. p. 92. hist. 19. 20. rel. SAUV. sp. 9.

METRITIS.

3. *Languida* ^{u)}). Metrorrhagiae alius morbi immodicae pedisequa; typhus, tritaeophya, dysuria, obstipatio, hysteralgia, dysflogia, desiderium coitus, tetanus, cataplexis, miri spasmi, risus, fletus, suspiria, subdelirium, imo hydrophobia, rel. Saepius vidit Cl. SAGAR. Salus ab emulsionibus ex sem. frigid. et papav., iusculis, lacte cum ouis, flor. rhoead. enemat. nutrit. inunct. spinae dorsi et abdominis oleo cannab., iniect. in vaginam ex lacte rec. tepido, medicato per incoctam cannell. dulc. et symphytum, aqua menth. chocol. tenui cum lacte et conf. alkerm. Antihysterics foetidis et aromaticis, imo cortice, vtendum non est.

4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

METRORRHAGIA.

ABORTVS.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus.* 3. *Languidus.*
4. *Irritabilis.* 5. *Periodicus* ^{v)}).

COLPOSIS.

LEVCORRHOEA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* Pallor oedematofus, squalidus, asthenia, hysteria, inappetentia, sitis, marcor crescens, hanc definiunt.

NYMPHOMANIA.

5. *Periodica* ^{x)}).

STERILITAS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida* ^{y)}.
4. *Irritabilis* ^{z)}. 5. *Periodica.*

HYDROMETRA.

PHYSOMETRA.

GRAVIDITAS.

PARTVS.

DYSTO-

^{u)} SAGAR sp. 2.

^{x)} SCHENCK obs. p. 614.

^{v)} E. N. C. dec. 3. a. 4. p. 106.

^{y)} KAEMPF enchir. med. p. 182. causa sexta.

A. N. C. T. 1. p. 200. T. 2. p. 30.

ALLEN. syn. pr. med. p. 506. MERCURIAL. conf. l. c. 57. MEDICVS

^{z)} KAEMPF enchir. med. p. 182. causa quinta.

p. 177.

DYSTOCIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida* ^{a)}). A debilitate nativa, vel per morbos adfecta. Salus ab analeptis, cardiacis, aromaticis, roborantibus.
3. *Languida*. Non rara post metrorrhagiam diuturnam sub graviditatis finem. Salus a partu artificiali, si est a placenta soluta.
4. *Irritabilis*. 5. *Periodica*.

DYSLOCHIA.

4. *Irritabilis* ^{b)}).

PHYSCONIA.

5. *Periodica* ^{c)}).

HERNIA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida*. EXANIA ^{d)}). Comes paralyseos. Salus a liq. fl. verbasci, in vngv. consist. redacta.
3. *Languida*.
4. *Irritabilis*. BVBONOCELE ^{e)}).
5. *Periodica*.

ENTEROCELE. BVBONOCELE. OSCHEOCELE ^{f)}).

OMPHALORIXIS ^{g)}).

PHIMOSIS. PARAPHIMOSIS.

GONORRHOEA.

1. *Maligna*.
2. *Torpida*. Si gonorrhoea quaecumque fit habitualis, quod accidit laxatis, aut erosio osculis excretoriis vesicularum, et a repetitis gonorrhoeis virulentis, fugato licet viru, et a masturbationē, semen, aut lymphā, sine

^{a)} MAVRIC. l. 2. c. 10. SAUV. sp. 1.

^{b)} POMME mal. vap. p. 156.

^{c)} E. N. C. dec. 3. a. 5 & 6. app. p. 92. obs. 4. a. 7 & 8. app. p. 74. Acta Hafn. T. 1. o. 108. Comm. L. Nor. 1732. p. 44.

^{d)} F. PLATER pr. l. 2. c. 2. DIO-

NIS d. 4. p. 392. NENTER t. 126. SAUV. sp. 5.

^{e)} RVYSCH obs. an. chir. C. I. obs. 98. p. 91.

^{f)} E. N. C. dec. 6. obs. 61. p. 318.

^{g)} FABRIC. HILD. obs. p. 219. DODON. obs. p. 206 sq.

GONORRHOEA.

sine sensu, sub alui depositione non raro effunditur. Salus a vita casta, eupeptis, potu, iniectionibus in vrethram, adstringentibus, balneis frigidis, roborantibus et neruinis, genitalibus admotis.

3. *Languida*. In exhaustis post quamvis non raro evacuationem naturalem aut artificialem.

4. *Irritabilis*. 5. *Periodica* ^{h)}).

SATYRIASIS. PRIAPISMVS.

IMPOIENTIA.

1. *Maligna*.

2. *Torpida*. Ob defectum

α. Erectionis congruae.

1. *Ab aëre frigidiore* ⁱ⁾). 2. *A labore nimio*.

3. *A studiis nimis* ^{k)}). 4. *A refrigerantium abusu*.

5. *A debilitate ex coitu nimis frequenti* ^{l)}).

6. *A hemiplegia, paraplegia, omnibus adfectibus soporosis* ^{m)}).

7. *Ab animi curis* ⁿ⁾).

8. *A dubitatione viri de sua potentia* (fascinatio) ^{o)}).

A paralyti aut atonia musculorum erectorum. Salus a fuga caussarum, immersione penis in decoct. sem. sinap., fomentat., linim. neruinis, ad partes genitales et spinam dorsi adplicatis, rel.

β. Eiaculationis congruae ^{p)}). Praesto est erectio penis toto veneris tempore, sola feminis emissio in culpa est: vel tum membri erectio, tum feminis emissio,

h) MEDICVS p. 168.

i) E. N. C. dec. 1. a. 3. obs. 41.

k) SCHENCK obs. 21. l. 4.

l) F. PLATER. obs. t. 1. l. 2. c. 17. l. 1. p. 239. TEICHMEYER m. f. c. 15. SAUV. anaphrod. sp. 2.

m) SAUV. II. 771.

n) FOREST. l. 26. obs. 16. 7. GESNERS Beob. V. 95.

o) DELRII disq. mag. p. SIMON. de imp. c. 3 & 6. TEICH-

MEYER. c. 15. §. 3. WIERI praest. daem. l. 3. c. 14. BORELLI obs. c. 4. o. 65. rel.

p) AETII terr. 3. f. 3. c. ult. 1. MATTH de GRADI conf. 69. AMATI LVSI. L. 2. c. 18. & 81. MARC. DONATI h. m. c. 18. SCHENCK. l. 4. de imp. vir. FOREST. l. 26. obs. 18. 19. VESLING ep. 38. ETTMELLER de morb. vir. c. 2. p. 459. SAUV. sp. 7.

IMPOTENTIA.

emissio, peccat, dum illa vel nulla prorsus est, vel debilis, vel ante absolutam venerem cessat, ipsa ineunte sufficiens. Signa fractae erectionis manifesta, et virium eiaculariarum labefactorum, vel ambarum simul. Eiaculationem labefactatam arguunt: 1^o explorata, sub feminis emissione (?) imo sub guttularum urinae, ad mictionis finem in vrethra restitantium, eiectione vibratoria, penis radix, quae minus intendi, debilius contrahi, imbecillius concuti percipitur. 2^o minor, inter eiaculandum, vrethrae et balani intumescencia. 3^o caussarum antecessio, quibus morbus et passio haec tribui potest. Salus a similibus.

- γ. *Seminis fertilis* q). Est a torpore virium, semen elaborantium, ut semen aquosius, idque copiosissimum in coitu sub mollissima et momentanea erectione penis effundatur. Signa constitutionis debilis, et gonorrhoea saepe praegressa. Salus a similibus, et vino optimo, chocol. ambra, moscho, cremore ex rad. salep dragm.; quot. hausto, rad. ginseng, ad dragm. 2-4. quotidie manducata, elect. diasatyr. et sinap. rel.

3. *Languida.* Ob defectuma. *Erectionis.*

1. *A diaeta tenui, inedia.* 2. *A morbo vix superato.*

b. *Eiaculationis.*

- c. *Seminis fertilis.* Causae ad a. indicatae et b. c. generant. Salus a fuga caussarum, cet.

4. *Irritabilis.*5. *Periodica.* Ob defectuma. *Erectionis congruae.*

- b. *Eiaculationis congruae* r). Comes epilepsiae periodicae, euenientis sub coitu, ut remittente de-

mun

q) ETTMVELLER. SAUV. sp. 8. MORGAGNI.

r) SAUV. lp. 6.

IMPOTENTIA.

mum corporis rigiditate efflueret semen ex vrethra
penis iam flaccidi.

AEDAEOPSOPHIA.

V. PASSIONES EXTREMORVM ET PERIPHERICAE.

MYOSITIDIS *species.*a. *Cephalica.*b. *Pleurodyne.* v. Supra.c. *Spasma.*d. *Myocoilitis.*

LUMBAGO.

1. *Maligna.*2. *Torpida.*

3. *Languida* ^{s)}) A venere, maxime stando, nimium
exercitata, faeuissima cum atrophia femorum semipara-
lytica, vel dolor spinæ dorsi viuidissimus a medio dorsi
ad coccygem cum tumore, macies, asthenia. Salus a
vita casta, rel.

4. *Irritabilis.*5. *Periodica.*

RHEVMA.

1. *Malignum.*

2. *Torpidum* ^{t)}) A diuturno moerore, studio, tristi-
tia, hypochondriasi, hysteria, oritur alternans cum ani-
mi deiectione. Salus a catharticis, roborantibus, ner-
uinis.

3. *Languidum* ^{u)}) 4. *Irritabile.* 5. *Periodicum* ^{x)}).

ISCHIAS.

1. *Maligna.*2. *Torpida.*3. *Languida.*

4. *Irritabilis* ^{y)}) Subito accedit et recedit, teneritudo
partis, quae recedente dolore tangi vix potest. Salus
etiam a pannis, fumo aromat. imbutis, frictione, ele-
ctrisatione.

5. *Pe-*

s) Journ.' de med. Fevr. 1755.
p. 110. TISSOT. de maltupr. p.
222. SAUV. sp. 15.

t) MUSGRAVE. cap. 5. SAUV. sp.

6. PAUL. AEGIN. l. 3. c. 78.

u) HIPPOCR. aph. VI, 28.

x) WERLHOFF. p. 55. COCK-
BURN de morb. navig. obs. 19.
A. N. C. vol 5. obs. 18.

y) SYDENH. de col. bil. p. 132.
RAVLIN mal. vap. o. 8. SAUV.
sp. 3.

ISCHIAS.

5. *Periodica* ²⁾. Periodus quotidiana, tertiana, quartana, pyrexia interdum grauis, recedit cum sudore. Salus etiam a vesicatorio cruri admoto.

Pudendagra.

Paronychia.

OSTEOCOPVS.

GONGRONA.

MYOPALMVS. Irritabilem et periodicum vidi in musculis femoris et faciei, satis conspicuum.

TREMOR.

1. *Malignus.* Vidi.

2. *Torpidus* ^{a)}. A pathematibus, ab operatione reformidata.

3. *Languidus* ^{b)}. 4. *Irritabilis.* 5. *Periodicus* ^{c)}.

CARPHOLOGIA.

PANDICVLATIO.

LASSITVDO.

1. *Maligna.*

2. *Torpida* ^{d)}.

3. *Languida.*

STVPOR.

TARANTISMVS.

5. *Periodicus* ^{e)}.

BERIBERIA.

SCELOTYRBE.

1. *Maligna.*

2. *Torpida* ^{f)}. Pueros, puellasue a decimo aetatis anno ad pubertatem inuadens, se prodit claudicatione vel instabilitate alterutrius cruris, eiusdemque lateris manus motum voluntarium subire nequit. Salus a tonicis et cephalicis, china, cascar., thermis, et harum embrocatione, electrificatione.

3. *Lan-*

2) E. N. C. dec. 3. a. 7 & 8. p. 346. Ess. d'Edinb. t. 6. art. 49. sp. 143. SAUV. sp. 1.

a) LORRY de mel. I. 98. SAUV. sp. 14.

b) SENNERT. SAUV. sp. 1.

c) TVLP. obs. 30. Journ. de

med. T. I. p. DODON. obs. p. 163. MONRO in d'Edinb. Bem. II. 400. MEDICVS p. 17 sq.

d) SAUV. sp. 2.

e) MEDICVS p. 36.

f) Chorea S. Viti SYDENH. SAUV.

sp. 1.

SCELOTYRRE.

3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*
5. *Periodica* g).

LORDOSIS.

CONTRACTURA.

CLAUDICATIO.

ECTOPIAE.

EXARTHREMA.

1. *Malignum.*
2. *Torpidum.* A ligamentorum debilitate, morbos et passionibus diuturnos excipiens. Salus ab analeptics, stimulantibus, spirituosiss, (inunctionibus mercurialibus post repositionem et deligationem).
3. *Languidum.* 4. *Irritabile.* 5. *Periodicum.*

DIASTASIS. LOXARTHRVS.

INTVMESCENTIA.

ANASARCA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida* h). A diuturnis euacuationibus. Salus ab analeptics, stomachicis, eupeptis, euchymis, abstinentia ab euacuationibus: tonicis non irritantibus, hinc ab aqua, in qua rheum et ferrum cum cinamomo infusa, diaeta lactea.
4. *Irritabilis* i). Hysterics, ficcis, melancholicis, superuenit, v. g. post synochum media aestate. Cutis vestigia prementis digiti vix retinet, unde differt a genuina (v. catarrh.) Salus a diabete, hinc et fero lactis, dein lacte asinino. Augmentum a cathartics et diuretics.
5. *Periodica.*

PHLEGMATIA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*
3. *Languida.* Frequens.

4. *Ir-*

g) DEIDIER. SAUV. sp. 4.

h) MONRO de hydr. p. 12. n. h. SAUV. sp. 2.

i) SAUV. sp. 6.

PHLEGMATIA.

4. *Irritabilis* ^{k)}). Alterutram furam adficit, et digiti prementis vestigium non seruat.

5. *Periodica* ^{l)}).

PHYMATA. PHLEGMONE. BVBO. PAROTIS. FVRVN-
CVLVS. ANTHRAX.

EXANTHEMATA.

ERYSIPELAS ERYTHEMA.

5. *Periodicum* ^{m)}).

VARIOLA.

1. *Maligna*.

2. *Torpida* ⁿ⁾). His est os pallidum, pulsus debilis, celer, tremulus, ingens spirituum deiection, cum vrina pallida, cruda, turbida, vel limpida, horror et aestus alternant, parum sitiunt, neque magno de dolore, sed de perpetuo languore, ventriculi aegritudine, vertigine, cet. conqueruntur. Eruptio die demum 7. aut 8. fit, quo prodeunt stigmata, quae tarde in papulas pallidas et depressas conuertuntur. Loco puris cocti inest vel sanies corrodens, vel aër: si prius, variola *lymphatica* vel *crystallina*, et humore euaporato vel absorpto flaccidae, *siliquosa*, vocantur, si posterius, *verrucosa*, *emphysematica*, dicuntur. Vrina est praeter rationem cocta. Pustulae in extremitatibus prius, quam in facie, erumpunt. Deficit consueto tempore tumor faciei et manuum: noua pustularum copia post alteram erumpit. Saluatio. Infinitiae vulnus pallidum, non tumidum, indolens, pruritu carens.

3. *Languida*. ^{o)}).

4. *Irritabilis*.

5. *Periodica*.

VARICELLA.

RV-

k) SAUV. oedema sp. 4.

l) STOERCK II. 168.

m) C. L. N. 1737. p. 60. A. N. C. vol. V. o. 41.

n) Crystallinae et verrucosae
MEADII p. 34. 36. HVXHAM. II.

121. 132. 137 138 ELLER de cogn. m. p. 126 SCHROEDER p. 31. 58. de var. SAUV. sp. 5 & 6. SELLE p. 297.

o) HVXHAM II. 133. ROEDER. p. 39. de v. mali moris.

RVBEOLA.

- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1. <i>Maligna.</i> | 2. <i>Torpida</i> P). | Eruptio lenta. |
| 3. <i>Languida.</i> | 4. <i>Irritabilis.</i> | 5. <i>Periodica.</i> |

SCARLATINA.

- 1.
- Maligna.*

URTICARIA.

ESSERA.

MILIARIS.

1. *Maligna.*
2. *Torpida* 9). Post respirandi difficultatem, anxietatem, sudorem acidulum, pruritum, eruptio critica, vel leuans: exanthemata, femini papaueris similia, mox albas vesiculas, lymphæ turgidas, effingentia, et cum cutis desquamatione exarescentia.
3. *Languida.* 4. *Irritabilis.* 5. *Periodica* r).

PEMPHIGVS.

APHTHA.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. <i>Maligna.</i> | 2. <i>Torpida.</i> |
| 3. <i>Languida.</i> | 4. <i>Irritabilis.</i> |
| 5. <i>Periodica</i> s). Diuturna, singultus, transitus in intermittentem. | |

PETECHIAE.

PESTIS.

1. *Maligna* t). Pulsus parvus, mollis, frequens, inaequalis: lingua primum alba, postea rubra, nigra, et arida: vomitus aeruginosi, atrii, cruenti. Nulla manifesta bubonum vel anthracum eruptio. Mors intra aliquot horas, vel ad summum 3 dies.

- β. *Maligna* u). Pulsus celer, contractus, inaequalis, pressa arteria euanescent. Sitis, nausea, vomitus

aeru-

p) FR. HOFFMANN M. R. S. de morb. obs. 7. MORTON. ex. 3. c. 4. p. 28 sq. et pyret. c. 3. p. 12.

q) HVXHAM. II. 87. GLASS. c. p. 95. SELLE p. 299.

r) MORTON. p. 260.

s) SYDENH. I. 358. v. SWIETEN III. 214.

t) CHICOYNEAV sp. 1. tr. de la peste P. 1. p. 37. 224. 242. 244. CHENOT. sp. 7. p. 68. SELLE p. 278.

u) CHIC. l. c. sp. 2. P. 1. p. 38. 250. 318. sp. 4. CHENOT. p. 64. FOREST. l. 6. obs. 12. SELLE p. 282.

PESTIS.

aeruginosi, cruenti, vel atrii: aestus interne vrens, externe naturalem non superans, cephalalgia ingens, lingua initio alba, deinde nigra. Haemorrhagiae, petechiae, vibices, eruptio bubonum et anthracum, acrius dolentium, nigrescentium, facillime in gangraenam abeuntium.

2. *Torpida.* 3. *Languida.*

EFFLORESCENTIAE. PHLYCTAENAE.

PUSTULAE. PAPULAE. VARI. EPINYCTIS.

PSYDRACIA. HYDROA. HERPES. IMPETIGO.

PSORA. (*Scabies.*) 5. *Periodica* ^x), per tres annos die 7. apparens, asthma relicto. Salus a cort.

MACULAE. LICHEN. PORRIGO. VITILIGO.

GUTTA ROSEA. EPHELIS. ECCHYMOMA.

PHRICASMVS.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus.*3. *Languidus.* 4. *Irritabilis.*5. *Periodicus* ^y). Pulsus depressi, exiles, frequentes. Salus etiam ab infuso ribes. nigri, quot. sumto.

ARDOR.

4. *Irritabilis.* 5. *Periodicus* ^z).

PRURITVS. ADIAPNEUSTIA.

EPHIDROSIS.

1. *Maligna.* Vide ephem. 2. *Torpida.*3. *Languida.* 4. *Irritabilis.*5. *Periodica* ^a). Inuadit frigore et horrore, cui succedit calor, et statim sudor subfrigidus, pyrexiam intendens potius, quam alleuans, pulsus celeres, minuti, debiles,

x) Comm. Lips. XVI. 701.

Journ. de med. 1761. p. 46. SAUV. rigor. sp. 6 & 7. et algor sp. 3.

y) GALEN. de tr. c. 7. SCHENCK obs. p. 338. Comm. Litt. Nor. 1736. p. 256. MORTON op. p. 239. SENAC. p. 35. et 109. TORTI febris algida et amphimerina algida p. 1. 3. p. 126. 187. MEDICVS p. 53. STOERCK II. 163. MEDICVS p. 51.

z) Act. Hafn. vol. 5. p. 79. MORTON. op. p. 242.

a) Tritaeophya elodes GRAEC. sudatoria seu diaphoretica TORTI l. 3. p. 126. 187. MEDICVS p. 53. SAUV. sp. 7. et tritaeoph. sp. 4.

EPHIDROSIS.

debiles, respiratio anhelosa, frequens, vires dissipantur, mens sola lucidissima, at sentit homo, se paulatim mori, quod nisi primo insultu fiat, non raro proximo accidit, maxime quum sudans aeger algidus fit, vt circa tempus. declinationi proximum, tenui, frigido et viscoso sudore cum frigore marmoreo perfundatur.

DYSODIA.

CACHEXIAE.

AVRIGO.

1. *Maligna.* 2. *Torpida* ^{b)}. 3. *Languida* ^{c)}.
4. *Irritabilis* ^{d)}. Longo morbo debilitatis, hysteris, hysteralgiam, ileum, gastrodyniam passis, hypochondriacis, superuenit cum summa animi et corporis prostratione, intra aliquot dies interdum sponte cessans. Salus etiam a diluentibus, aperientibus, roborantibus.
5. *Periodica* ^{e)}.

MELASICTERVS.

1. *Malignus.* 2. *Torpidus.* 3. *Languidus.*
4. *Irritabilis,* 5. *Periodicus* ^{f)}.

PHOENIGMVS.

CHLOROSIS.

PNEVMATOSIS.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.* 3. *Languida.*
4. *Irritabilis* ^{g)}. Spectat ad carnes musculosas, maxillam, humeros, manus, crura, tibias, nunc dolorem, nunc tumorem adducens, cum diabete et ptyalismo, spasmus, alternat. Tumor *matutino* tempore magis protuberat, digito prementi non cedit, nec vestigium vllum manet, plerumque tibiarum alterutram tantum

Y 2

inflat,

b) C. L. N. 1731. p. 182 sq.

1730. p. 840. Rec. period. T. 5. p.

c) C. L. N. 1731. p. 182 sq.

A. N. C. vol. 7. p. 50. vol. 10. p.

d) SYDENH. f. 4. c. 3. col. hyst. RAVLIN mal. vap. p. 13. SAUV. sp. 13.

94. SAUV. sp. 8.

f) MANGETI oibl. pr. p. 844.

e) ETSMVLLER I. p. 264 FR. HOFFMANN obs. 5. Eph. Vratisl.

g) SYDENH. d. epist. de hyst. SAUV. sp. 3.

PNEVMATOSIS.

inflatur, ceterum hydropicorum tumores ad amussim accumulatur, ut aegrae, se hydropicas esse, seuerere contentant. Salus ab antispasmodicis, et suffitu aromatico.

ALOPECIA.

OSTEOCACHEXIA *cum Speciebus.*

ELCOSIS.

CANCER. CARCINOMA.

GANGRAENA.

1. *Maligna.* 2. *Torpida.*

3. *Languida* h). In subiectis, profluuiis, febribus, exhaustis, oritur gangraena. Pedes, et digiti, rigidi, sensus expertes, cutis sana, punctata, dein liuida. Salus ab analepticis, cortice.

4. *Irritabilis.* 5. *Periodica.*

NECROSIS.

VVLNVS.

MARCORES.

TABES.

3. *Languida* i). A ptyalismis. Salus a retenta salua bona.

ATROPHIA.

2. *Torpida* k). Habitus initio oedematofus, facies pallida, squalida, ciborum omnium, praeter potulenta fastidium; asthenia, vrina pauca, rubra, interdum pallida et copiosa, facile phlegmatia. Est a pathematis animi grauioribus, liquorum spirituosorum abusu, aëre insalubri. Salus ab amaris, stomachicis, neruinis, analepticis, eupeptis, euchymis, vita iucunda.

SEPSIS.

PASSIONES PRIMARIAE.

PARALYSIS. PARESIS.

1. *Putrida* l).

2. *Biliofa putrida.* β. Comes amphimerinae hungaricae.

PARA-

h) HOME med. facts. p. 81.

i) RVYSCH Adv. dec. 2. n. 5.

k) MORTON phthis. c. 1. ta-

bes neruea LORRY de mel. l. 182.

SAUV. sp. 1.

l) RIGLER Const. epid. putr. p. 116.

PARAPLEGIA.

1. *Putrida.*2. *Biliosa putrida.*

HEMIPLEGIA.

1. *Putrida.*2. *Biliosa putrida.* v. amphimer.

SYNCOPE. LIPOTHYMIA. ASPHYXIA.

1. *Putrida* ^m). Pedisequa phlebotomiae non indicatae, aut a sphacelo partis internae, vt a fetu mortuo, ab ichore putri.

2. *Biliosa putrida.*

ASTHENIA.

1. *Putrida.* Epigenema.2. *Biliosa putrida* ⁿ).

ANAESTHESIA.

ATONIA.

SPASMVS ^o).

CONVULSIO. ECLAMPSIA. EPILEPSIA.

1. *Putrida.*2. *Biliosa putrida* ^p).

TETANVS. CATOCHVS.

HYSTERIA. HYPOCHONDRIASIS.

1. *Putrida.*2. *Biliosa putrida* ^q).

DOLOR. ANODYNIA.

1. *Putrida.*2. *Biliosa putrida.* } anodynia frequens.

RHEVMATISMVS.

1. *Putridus* ^r). Dolor ad attactum articuli, sine notabili tumore pallentis.

2. *Biliosus putridus.*

PHLEGMASIA. INFARCTVS.

1. *Putrida.*

2. *Biliosa putrida* ^s). Plerumque occulta, seu anodynia stipata, proclivitas sanguinis in dissolutionem maxima, vix in suppurationem, augmentum ab antiphlogisticis

m) SAUV. sp. 14. RIGLER. p. 86.

n) TISSOT. epid. Lausan. T. I. p. 128 sq. STRACK de morbo c. petechiis p. 142 GRAINGER p. 30.

o) WIENHOLT. p. 27. not. i.

p) TISSOT. l. c. p. 113. Rec. period. T. 6. p. 64 sq. t. 10.

q) FINKE p. 131.

r) RIGLER l. c. p. 114.

s) Cl. A. WIENHOLT d. de infl. occultis, Goett. 1772.

PHLEGMASIA. INFARCTVS.

sticis veris, salus ab antisepticis, vitriolo, acidis, alumine, sale ammon., cortice. — Phlegmasia biliosa putrida timenda, quum morbo diutius iam durante symptomata acius vrgent, adpetitus pertinaciter deficit, nec acidis nec eccoproticis reuocari potest, vomitus leuationem non adfert, si congestio ad caput, et symptomata inde oriunda, post phlebotomiam, temperantia, euacuantia, non cedunt, lingua est fusca, nigra, arida, spiritus cum anxietate ducitur maiori, ac reliqua volunt, accedit singultus, hypochondriorum inflammatio subesse solet. Adest et sensus molestus, grauatiuus, fixus licet nullus dolor, aut hic saltem ex tactu, concussione leuissima corporis, sono emissio. Oculorum obtutus acris et intentus, animus abiectus, spatini.

HAEMORRHAGIA. PROFLVIVM. APOCENOSIS.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. <i>Putrida.</i> | } per frequentia. |
| 2. <i>Biliosa putrida.</i> | |

FEBRIS.

TRITAEA. SIMPLEX.

1. *Putrida* ^t).
2. *Biliosa putrida* ^u). Autumno accidens symptomata nervosa periculossima adiuncta habet. Salus expulsio fordibus a corticis largo usu cum alumine crudo.
3. *Putrida verminosa* ^x). (Nocuit mercurii usus.)

DVPLICATA.

1. *Putrida* ^y).

CATHAMERINA.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. <i>Putrida.</i> | 2. <i>Biliosa putrida</i> ^z). |
|--------------------|---|

HEMITRITAEA NOTHA.

TRITAEA NOTHA.

EPHE-

t) Rec. period. T. 6. p. 80.

u) SELLE p. 311.

x) Rec. per. T. 6. p. 64.

y) Rec. per. T. 6. p. 80.

z) FINKE l. c. p. 123.

EPHEMERA.

1. *Putrida*. Sustinui sudatorium.
2. *Biliofa putrida* ^{a)}).

AMPHIMERINA.

1. *Putrida*.
2. *Biliofa putrida* ^{b)}). Vt plurimum epidemica, castrensis, aestate, militibus, potissimum plethoricis, familiaris. Post horripilationem et cephalalgiam fitis et aestus maximus, ardor circa scrobiculum cordis, lingua sicca, tumida, frequenter angina, die 4. 7. paraphrosyne (oculi fulgidi, venae capitis tumidae) pulsus fortior, quam in malignis, agrypnia continua cum anorexia, non nullis vomitus, dysenteria, petechiae, paralyfes, hemiplegiae, parotides, rhinorrhagia, exacerbatio vespertina. Conualescentes obnoxii sunt phrenitidi languidae. Ob frequentes, cephalitidem et gastritidem, phlebotomia facilius aut largius, aut repetita admitti potest, pro plethora comitante.

^β. *Biliofa putrida* ^{c)}). In regionibus humidis, paludosis, tempestate calida, m. Iul. Aug. ex halitibus putridis plantarum, pisciumque corruptione, rel. oritur. Amphimerina initio, transit in tritaeam. Inuadit raro cum frigore, saepius cum cephalalgia, calore exurenti, siti excedente, osteocopo, lumbagine, magna lassitudine et anxietate, frequenti cardialgia, gastrodynia, vomitu bilis viridis, flauae, odoris ingrati. Pulsus exigui, a phlebotomia crescentes, Cephalalgia interdum subitanea et vehementissima, remittente feбри cum sudore dolor periodice cessans, aliis in paroxysmo paraphrosyne. Bilis ano et cato, aliis lumbrici prodierunt. Sudores largi, foetidi, vibices,

pete-

^{a)} FINKE d. m. bil. anom. p. 56. ^{b)} Hungarica seu castrensis IVNCKER. tab. 73. Hemitritaea p. 116. 1574. vermis cerebri SCHENCKII. p. c. tarrhalis maligna FR. HOFFMANNI: febris castrensis PRINGLE. p. putrida HVXHAMI I. 234. 268. 318. 327. 352. II. 74. WINTRINGHAM. 212. VISSOTI epid. descr. 1759. SAUV. sp. 10 & 22. ^{c)} PRINGLE p. 260. 314. SAUV. sp. 9.

AMPHIMERINA.

petechiae. Sudorem, die 9. orientem, excipiebat tritaea, diarrhoeam, post 3 septimanas comparentem, cathamerina.

γ. *Flaua putrida* d). Vomitus bilis viridis, nigricantis, vniuersa aurigo, haemorrhagiae magnae.

δ. *Mimosa* e). Tribuitur odori santali arborum, et in nostris quoque terris interdum iis, qui ligna santali radunt, oboritur.

TRITAEOPHYA.

1. *Putrida* f). Europaeos, aduenas, paucis ab aduentu diebus corripere solet. Post anorexiam, dyspnoeam suspiriosam, asthenia, cephalalgia, lassitudo, lumbago, pyrexia cum polydipsia, ephidrosi, ardore, deinde nausea, vomitio biliosa, porracea, lingua aspera, brunnea, extrema saepe frigent, agrypnia, paraphrosyne, furor, mors saepe die 3, ephidrosis, epistaxis copiosa, 5 die superueniens, utilis, diarrhoea biliosa crisis optima. Finis ante diem 7.

2. *Biliosa putrida* g) Incipit a cephalalgia, lumbagine, horrore; lassitudo magna, dyspnoea, sitis, pyrexia ardens, meteorismus, gastrodynia, nausea, vomitio biliosa, status morbi intra 24 horas: oculi rubri, lacrimosi, urinae pellucidae, paraphrosyne obscura, anxietas continua, lingua sicca, rubra, raro nigra, quod peius; pulsus antea fortis, plenus, quarto die minuitur, tensus, spasmodicus euadit, si tunc carus accedat, aeger die 5 vel 6 moritur: quodsi pulsus vigeat, nec carus accedat, 4 die crisis exspectanda per sudorem, epistaxin copiosam, et tutius per diarrhoeam biliosam, quae ante diem 5 non est salubris.

SYNO-

d) BRUCE. LIND. p. 225. yellow fever. HILLARY p. 143. BISSET. med. eff. and obs. p. 20 sq. Comm. Lips. XV III. XVIII. 229. MOVLTRIE mal bil. Americ. BALD. diff. Vol. I. p. I.

e) SAUV. sp. 17. BONTIVS de med. Ind. c. 15.

f) Americana peracuta. SAUV. sp. 12. α). Journ. de med. oct. 1762.

g) SAUV. sp. 12. β).

SYNOCHA.

1. *Putrida* ^{h)}). Symptomata maiora, quam in aliis morbis: pulsus magnus, (vehemens) celer, frequens, inaequalis, inordinatus. (Vrina cruda, aut saltem leuiter cocta in principio).

2. *Biliofa putrida*.

SYNOCHVS.

1. *Putrida* ⁱ⁾). Lingua arida, sitis non magna aut nulla, mira animi indifferentia, pulsus non anologus reliquis symptomatis, praecipue lassitudini et sensuum stupori, naturalis et celeritate et robore; aluus infcie reddita, calor quibusdam naturalis. Iacent immote et incondite, deliria placida, vrinae sanorum, subinde croceae, ictericæ, petechiæ, miliaria, inter largos sudores erumpentia, critica. Soluuntur die 14. aut serius.

2. *Biliofa putrida* ^{k)}).

TYPHVS.

1. *Putrida* ^{l)}). Initio horror et calor alternantes, anorexia, noctu sine horrore recrudescencia, calor corporis, somnus interruptus, non reficiens: labor et confusio (stupor et carebaria) in cerebro, syncipite, sitis parua vel nulla, pulsus frequens, a phlebotomia imminutus, et delirium, tremor manuum. In augmento lassitudo summa, nausea, dolor dorsi, cephalalgia, idearum confusio, summa virium et animi deiectio, pulsus velox et plenus, a phlebotomia larga frequentior et minimus, sequente delirio, cruor initio et in progressu spissus. Vrinae turbidae, limpidae, pallidae, in fine, bene procedente morbo, crassae et sedimentosae. A suscepto frigore diarrhoea non laudabilis, in peiori casu faeces colliquatuae, ichorosae, putres. Calor cutis
acer,

h) SAUV. sp. 3.

i) STOLL. III. 135. RIGLER I. c. p. II.

k) NERVCCI hist. febr. epid.

Senensis. Senis 1767. Comm. Lipf. XVI. 616.

l) HUXHAM de aëre p. 82. PRINGLE I. 2. c. 6. SAUV. sp. I. carcerum. RIGLER I. c. p. II.

TYPHVS.

acer, mordax, seu relinquit in digitis tangentis sensationem vrentem per aliquot minuta. Cutis sicca, ephidrosis foetida, sapor prauus in ore, prauus odor, lingua sicca, profunde fulcata, dein flauescens, viridescens. — Letalis ominis sunt subita asthenia, visus debilitas, decubitus supinus, retractis genubus, conatus ad exiliendum e lecto, aphthae nigrae, petechiae liuidae, vibices liuidi per corpus diffusi, diarrhoea violenta, qua materia plumbea vel subnigra, crescente virium debilitate, redditur. Cophosis vero ominosa non est, et conualescentes hac subsequente otalgia purulenta laborant. Vtiles sunt diarrhoea biliosa, vrina crassa, hypostatica, viribus in primis perseverantibus: profunt etiam sudor mitis, leuans, parotidum tumor, aphthae albae: miliaria cum facili expectoratione et vrinae hypostasi boni sunt ominis.

2. *Biliosa putrida* ^m). Icterus, haemorrhagiae largae, vomitus bilis nigricantis.

β *Pituitosa* ⁿ). Lenta nervosa.

HECTICA.

1. *Putrida* ^o).

2. *Biliosa putrida* ^p).

HEMITRITAEA VERA.

1. *Putrida*.

2. *Biliosa putrida*.

TETARTAEA.

1. *Putrida* ^q).

ERRATICA.

II. PASSIONES CAPITIS.

APOPLEXIA.

CARVS.

1. *Putridus*.

2. *Biliosus putridus* ^r).

CATAPHORA.

LE-

m) Fievre jaune d'Amerique. Jour-n. de med Mai. 1758, le Siam HALLER. SAUV. (p. 7.

n) FINKE l. c. p. 101 sq.

o) RIGLER. II 9.

p) FINKE l. c. p. 136. al.

q) Rec. per. T. 6. p. 80.

r) STRACK l. c. p. 41.

LETHARGVS.

1. *Putridus*. 2. *Biliosus putridus* ^s) intermittens.

TYPHOMANIA. ECSTASIS. CATALEPSIS.

PARAPHROSYNE.

1. *Putrida*. 2. *Biliosa putrida* ^t).

PHRENITIS. PARAPHRENITIS.

1. *Putrida*.
2. *Biliosa putrida* ^u). Tribuitur odori santali arborum,
quae oritur in India.

CEPHALITIS.

MANIA.

1. *Putrida*. 2. *Biliosa putrida* ^x).

MELANCHOLIA. *cum speciebus*.

1. *Putrida*. 2. *Biliosa putrida* ^y).

PANOPHOBIA. NOSTALGIA. ATHYMIA.

AMENTIA. SOMNAMBVLISMVS. DAEMONOMANIA.

AMNESIA.

AGRYPNIA.

1. *Putrida* ^z). 2. *Biliosa putrida* ^a).

CEPHALALGIA. CEPHALAEA. CAREBARIA. HEMICRANIA.

1. *Putrida*.
2. *Biliosa putrida*. } perfrequentes.

MENINGORRHOEA.

AMBLYOPIA.

CALIGO.

SYNCHISIS.

1. *Putrida* ^b). Oritur a vitrei dissolutione putrida, apyica: initio dolet oculi fundus, et pars anterior capitis, dein visus obscuratur vel tollitur, crystallinus turbatur, albescit, flavescit, pupilla dilatatur, iris nativum suum

^s) FINKE l. c. p. 57.

^t) STRACK l. c. p. 53. VALCARENGLI med. rat. T. I. p. 163. 168.

TISSOT op. I. p. 49 PRINGLE p. Rec. period. T. 6. p. 463. T. 14.

p. 270. Mem. de l'Ac. des Sc. 1753. p.

^u) BONTIUS. SAUV. sp. 12.

^x) FINKE l. c. p. 150. 151.

^y) FINKE l. c. p. 150. 166.

^z) RIGLER l. c. p. 89.

^a) TISSOT. l. op. 131.

^b) SAUV. catar. sp. I. vera f. a synchisi.

SYNCHISIS.

suum colorem amittit, corrugatur, et cum crystallina in vel extrorsum flectitur vix. Est malum immediate curabile.

2. *Biliofa putrida.*

AMAVROSIS.

1. *Putrida* c).

β. RAMAZZINI d). Foricarii si per 4 horas latrinis expurgandis incumbunt, nisi per 24 horas oculos a luce auerant, et aqua tepida abluant, caeci evadunt. Oculi (in cloacis) rubent, dolent, et paululum obnubilantur. Odor teter solos oculos laedit.

2. *Biliofa putrida.*

OPHTHALMIA. OPTHALMITIS. CHEMOSIS.

1. *Putrida* e).

2. *Biliofa putrida* f). Oculi quasi rosea tela obtegi videbantur.

ANGHILOPS.

1. *Putrida.*2. *Biliofa putrida* ff).

AEGILOPS.

EPIPHORA.

1. *Putrida.*2. *Biliofa putrida* g).

STRABISMVS.

NYSTAGMVS.

DYSECOEA.

1. *Putrida* h).

COPHOSIS.

1. *Putrida* i).2. *Biliofa putrida* k).

PARACVSIS. SYRIGMVS.

OTITIS. OTALGIA.

OTORRHAGIA. OTORRHOEA.

ANOSMIA.

NASI-

c) RIGLER p. 117.

d) RAMAZZINI morb. artif. c. 13. SAUV sp 9.

e) RIGLER p. 7.

f) STRACK aeg. 14. 15. l. c.

ff) FINKE l. c. p. 44.)

g) TISSOT. l. c. l. 82.

h) RIGLER p. 3. 10. al.

i) RIGLER p. 10.

k) STRACK p. 144. HIPPOCRATES IV. 28. aph. FINKE l. c. p. 103.

NASITIS.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida*.

EPISTAXIS. RHINORRHAGIA.

1. *Putrida* ¹⁾). In 2 aut 3 februm stadio contingens mali ominis est.

2. *Biliofa putrida* ^{m)}).

CORYZA.

OZAENA.

1. *Putrida* ⁿ⁾).

RHINOSTEGNOSIS. RHINOCRESMOS.

GELASMVS.

1. *Putridus*. 2. *Bliosus putridus* ^{o)}).

STENOSTEGNOSIS. CHILON.

STOMADYSODIA.

1. *Putrida* ^{p)}).

TRISMVS.

AMASTESIS. BRADYMASTESIS.

PTYALISMVS.

1. *Putridus*. 2. *Bliosus putridus* ^{q)}).

STOMACACE.

1. *Putrida* ^{r)}).

ODONTITIS. ODONTALGIA. PARVLIS. EPVLIS.

PRISIS. AGEVSTIA. PARAGLOSSE.

GLOSSITIS,

1. *Putrida* ^{s)}). Lingua adeo tumida, ut aegri eandem non sufficienter pro voluntate medici exserere possint, eamque diutius teneant: linguae palpitatio. Epigenema.

2. *Biliofa putrida*. Praecedenti similem vidi.

MYTITAS.

APHONIA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida* ^{t)}).

CYNAN-

1) De MERTENS obs. de peste rel. p. 45.

m) STRACK p. 165. 168. Critica. Comm. Lips. XVI. 618.

n) RIGLER p. 94.

o) STRACK. p. 175.

p) RIGLER p. 94.

q) FINKE l. c. p. 145.

r) RIGLER p. 31.

s) RIGLER p. 8.

t) FINKE l. c. p. 142.

CYNANCHE. ANGINA.

PHARYNGITIS.

1. *Putrida* ^{u)}. Inde ab anno 1728 in Anglia compa-
ruit, in Germania rara. Primo die faucium phlogosis:
die 2 vel 3 partes albescunt, signo incipientis gan-
graenae: vox obscura rauca, quasi ab ulcere venereo:
die 4 vel 5 partes liuescunt et putrescunt, et sanies
putrida et corrodens ex ore et naribus promanat. —
Sensus doloris in faucibus quasi a pipere. Partes inflam-
matae ulceribus similes sunt, quorum margines tu-
ment, quasi linea circumdati: crusta crassa, profun-
de colorata partis adfectae: tumor longitudinalis ad
cornua ossis hyoides. Non raro exanthematum genus
aliquod simul erumpit, morbillis, scarlatinae, aphthis
simile, fere criticum. Oritur maxime vere et hieme,
sub tempestate humida et calida, in locis humidis;
corripit infantes et teneras feminas. Ab initio diar-
rhoea, sanguis missus laete ruber et mollis, vox rauca,
debilis, oculi phlegmasia aquosa laborant, languidi, re-
tracti. Exanthema magis rubet, quam reliqua cutis,
mane humida. Anima foetida.

Salus ab antisepticiis calidis, cortice, acidis mineral.
epispasticis ad parotides, rel. non neglectis emeticis.

β. Eadem cum magna excoriata, nec tamen suppuran-
te, nec ulcera excitante superficie, et irregulari mu-
cosa pseudomembrana grisea tecta, cum cutis rubore
et manuum digitorum phlegmatia, *erysipelacea* dici-
tur GRANTIO ^{x)}.

2. *Bi.*

^{u)} Paedanchone SEVERINI absc.
l. 8. ulcerosa FOTHERGILL. tr. ed.
1751. et Journ. de med. 1758. a)
maligna Journ. de Med. Mars 1756.
oct. 1757. et HUXHAMI III. 92. gan-
graenosa Journ. de Med. 1756. var.
b) et WITHERING'S d. in Edinb.
1766. et tr. Lond. 1779. 8. A. A.
f. pr. A. T. 5. p. 250 1q. Suffoca-
tina BARD'S Inq. New-Yorks 1771.

RVTTY hist. of the Wather. epi-
demica RVSSSEL oecon. anim. p. 105.
DOUGLAS pract. hist. Bost. 1736.
TISSOTI §. 117. GRANT. tr. de
febr. p. 570. SELLE p. 182. CVL-
LEN. I. §. 303 1q. MICHAELIS d.
de ang. polyp. p. 138. 143. 147.
165. 161. 169. SAUV. sp. 3. Comm.
Lips. I. 91.

^{x)} l. c. p. 572.

PHARYNGITIS.

2. *Biliofa putrida* ^γ). Signa morbi et passionis. Salus ab emeticis et catharticis.

PAROTITIS.

1. *Putrida* ^z). Signa morbi et passionis: ptyalifinus criticus, anima foetida, vt in angina a mercurio.
2. *Biliofa putrida*.

TONSILLARIS.

1. *Putrida* ^a). Horror lenis, asthenia, pulsus celeres, inaequales, parui, anxietates crebrae, vagi calores, fitis mediocris, lingua tremula, plumbea, oculi tristes, vrina cruda, flocculenta, subfusca, et breui foetens. Primo die in posteriori faucium parte et circa tonsillas maculae apparent latae, purpureae, quae eodem die vesperi, aut die 2. in centro liuidae, nigrae, ichorem fundunt: in ambitu manent profunde rubrae. tensae, dolentes: deglutitio difficilis. Salus ab antisepticiis, excitantibus.
2. *Biliofa putrida*.

DYSPHAGIA.

HYDROPHOBIA.

1. *Putrida* ^b).

TRACHELOPHYMA. OBSTIPITAS.

III. THORACIS PASSIONES.

MASTODYNIA.

SPARGANOSIS. AGALACTIA.

GALACTIRRHOEA. OSCEDO.

SINGULTVS.

1. *Putridus* ^c). Prorsus letalis est vel gangraenae externae, vel

^γ) Maligna HVXHAMI III. 92. Rec. period. T. 7. p. 62. TISSOT. §. 121. GRANT p. 548. SAUV. scarlatina sp. 6. FINKE I c. p. 119.

^z) GRANT. p. 18.

^a) STOERCK II. 141.

^b) Spontanea. Rec. per. T. 7. p. 3.

^c) A gangraena interna. HOFFMANN de Sing. obs. 3. 4. externa HIPPOCR. de fract. §. 12. 38. SAUV. sp. 21.

SINGVLTVS.

vel febribus acutis, doloribus, profluuiis, vt cardialgiae, colicae, dysenteriae, voluulo, accedat.

2. *Biliosus putridus* ^{d)}).

STERNVTATIO.

TVSSIS. ANACATHARSIS.

*Stomachalis.*1. *Putrida* ^{e)}).2. *Biliosa putrida* ^{f)}).

Cum hepatalgia, aut splenalgia, *siti*, vigiliis, surditate, alysmo, sputis cruentis.

THYMOS.

CATARRHVS.

1. *Putridus* ^{g)}).

Materia acrior, vellicans, vesicans.

2. *Biliosus putridus* ^{h)}).

PNEVMONIA.

PLEVRITIS.

1. *Putrida* ⁱ⁾).

Salus ab emeticis, dein diaphoreticis, cardiacis, camphora, alcal. volat. vesicatoriis.

β. *Spasmodica* SARCONE ^{k)}).

Vel ante pleuritidem pyrexia putrida, vel pleuritidem mox sequitur et comitatur febris putrida. Asthenia, anxietas praecordiorum, ephidrosis larga, frigida, diarrhoea frequens: pulsus parui, debiles, lingua humida; respiratio debilis, (urina aquosa, larga), magnus dolor, pectoris partem occupans, decubitus molestus, cutis frigida. Non raro malo omine primus paroxysmus febrilis fortis et acris est, quem excipit febricula mitis, pulsus molles, ephidrosis, vox debilis, rauca, anodynia, tussis et sputorum (id est meri dissolutique sanguinis) euanescentia. — Salus a (vesicatoriis, pectori admotis?) uti et cu-

d) FINKE I. c. p. 143.

e) RIGLER p. 49. 87.

f) FINKE I. c. p. 134.

g) HVXHAM. I. 366. BRVENING p. 18. febris catarrh. maligna germanor.

h) HVXHAM I. 272. 312. 313. 316. RAHN d. p. 45. FINKE I. c. p. 125 sq.

i) HVXHAM II. 230. SCHROEDER de pleurit. differ. p. Rec. per. T. 7. p. 60.

k) §. 186 sq.

PLEVRITIS.

et cucurbitulis acutis, antisepticis, extr. corticis, et huius decocto, fl. chamaem., moscho, camphora.

2. *Biliofa putrida* ¹⁾). Sequitur tritaeophyam, hemittitaeam, amphimerinam.

PLEVROPERIPNEVMONIA.

1. *Putrida* ^{m)}). Anno 1772. in regione Tournaiensi epidemica fuit, erysipelacea dicta. Insultus subitaneus, sputa cruenta, sanguis missus ater cum corio pleuritico tenui: omnium aegrotorum $\frac{2}{5}$ absunxit. Sectione deprehendebantur pulmones $\frac{2}{3}$ imminuti volumine, ichore pleni, cor imminutum, in quibusdam et hepar et diaphragma gangraenosa. Salus a phlebotomia 1. 2. instituta, dein fero lactis, et aceto cum camphora, cortice et acidis mineral.

2. *Biliofa putrida* ⁿ⁾).

PERIPNEVMONIA.

1. *Putrida* ^{o)}). Pyrexia amphimerina vel tritaeophya: post frigus, horrorem, die 1. aut 2. tussis, dolor, aut potius grauitas maior, anhelatio aestuans, saepe syncope, suspirium frequens: lingua, atro veluti muco obducta, vel sicca et prae rubra, colori cort. granati aemula, arida, liuescens, pulsus celeres, exiles, contracti, molles, inaequales, vacillantes, vrina cruda, tenuis, subinde lactea, parca, turbida, subnigra: ephidrosis larga, frigida. Sputa saniosa, nigra, foetida.

2. *Biliofa putrida* ^{p)}). Pulsus parui, debiles, depressi saepe,

1) SCHROEDER l. c. p. 9. ingluuiosa TRILLERI p. 145. Journ. de Med. Sept. 1758. p. 269. De MEYSEREY T. 2. p. 314. KESSLER p. 75 sq. SAUV. sp. 9. FINKE l. c. p. 126 sq.

m) FOREST. l. 1. o. 16. 17. Schol. HVXHAM II. 64. Journ. de Med. Juill. 1766.

n) FOREST. l. 16. obs. 28. 35. TISSOT. op. I. p. CLEGHORN p. 245. SELLE p. 51.

o) HVXHAM. I. 324. 327. II. 63. QVARIN infl. p. 109 sq. SAUV. sp. 2 & 4. pestilens SCHENCKII l. 6. obs. 126. p. 855. erysipel. e. Sch. ad obs. 46. febris crinodes FORESTII. o. 37. sch. HVXHAM. I 326 sq. 333. II. 170 sq. 190 sq.

p) HVXHAM I. 333. CLEGHORN p. KESSLER p. 62. QVARIN p. 109. TISSOT. op. I. p. Journ. de Med. Sept. 1757. SAUV. sp. 5. FINKE l. c. p. 126 sq.

PERIPNEUMONIA.

saepe concentrati et vix frequentes, tussis violenta, sicca, sputa per vim extracta, viscida, tenacia, subflava.

HAEMOPTYSIS.

1. *Putrida*.

β. *Variolosa* q), In variola confluyente ante eruptionem plenariam pustularum accidit, mortis nunciuz. Sæpe ab acido vitriolico, adstringentibus.

2. *Biliofa putrida* r).

PNEUMOPHTHOE.

1. *Putrida* s).2. *Biliofa putrida* t).

ANHELATIO.

1. *Putrida*.2. *Biliofa putrida*.

ORTHOPNOEA u).

CARDITIS. PALPITATIO.

ANXIETAS. CARDIOGMVS. PLEVRORRHOEA.

III. ABDOMINIS PASSIONES.

HEPATITIS.

1. *Putrida* a).2. *Biliofa putrida* v).

SPLENITIS. PANCREATITIS.

PERITONITIS z). EPIPLOITIS.

GASTRITIS.

2. *Biliofa putrida* a).

DYSPEPSIA. APEPSIA. BRADYPEPSIA.

1. *Putrida*.

β. VOMITVRITIO b). Veneri addidit dein castissimus, post 6 menses vomituritione, deinde epilepsia corripitur, moritur.

q) SAUV. sp. 7. SYDENH. p. 95. 597.

r) STOLL. III. 16. FINKE I. c. p. 77. 131. 155.

s) RIGLER p. 119.

t) FINKE I. c. p. 131. 137. n.

u) FINKE I. c. p. 141.

x) FOREST. I. 16. o. 46. SELLE sp. 185.

y) MOVLTRIE I. c. p. WIENHOLT. infl. occ. p. 16. SELLE p. 235. FINKE I. c. p. 127.

z) C. L. N. 1731. p. 125.

a) MOVLTRIE I. c. p. 6.

b) SAUV. sp. 8. BONETTI, sep. obs. 69.

ritur. Nil in cadauere vitii praeter feimen viridescens, in cauo ductus deferentis accumulatum.

2. *Biliofa putrida*. Cardialgia.

CHOLERA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida*.

ENTERITIS. ILIACA. COLICA.

1. *Putrida* c).

β. Gangraenosa d), maxime ex herniis, aut aliis morborum passionibus.

2. *Biliofa putrida* e).

MEENTERICA ET OMENITIS.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida*.

RACHIALGIA. ILEVS.

HAEMATEMESIS. MELAENA.

1. *Putrida* f). Post febres putridas, peripneumoniam, ante conualescentiam melancholicis accidit. Pulsus debilis, intermitt., vires prostratae, facies plumbea a deiectione syncope. Materia reiecta nigra, vnguinosa, saepe foetidissima. Salus ab antisepticiis cardiacis.

2. *Biliofa putrida* g).

HAEMORRHOIS. DYSHAEMORRHOIS. MARISCA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida* h).

PROCTITIS. OBSTIPATIO.

INTERTRIGO. TENESMVS.

DYSENTERIA.

1. *Putrida* i). Ardor abdominis intensissimus, assiduus, contrectationis vel mitissimae impatiens mox primis diebus: anxietas, iactitatio, creberrimae, merae sed ob-

Z 2

sole-

c) MORGAGNI. XIX. 10.

d) SAUV. I. 192.

e) MOVLTRIE l. c. p. 6. SPIGEL de semit. l. I. c. 14. 16. FR. HOFFMANN d. de febr. mal. 1699. epid. Mem. de l'ac. des Sc. de Par. 1753. p. 52.

f) Cholericæ GVARIONII f. 719.

Journ. de Med. Mars & Juill. 1758. obs. 1 & 2. Janv. 1757. Coll. Ac. T. 3. p. 14. SAUV melaena sp. 1.

g) FINKE l. c. p. 77.

h) FINKE l. c. p. 160.

i) Journ. de med. Janv. 1763. p. 42 sq. ZIMMERMANN v. d. Ruhr. 354-359. 369. SELLE p. 188. STOLL. III. 269, 278 sq.

DYSENTERIA.

solete sanguineae deiectiones, pulsus saepe magni, vibrati, modice celeres, subinde tenuissimi: artuum frigus magnum, internus calor intensus, potus gelidus graue desiderium, lingua sicca, hirsuta, frigida. Febris putrida. Vomitus et deiectiones frequentissimae, foetidissimae.

2. *Biliofa putrida* ^k).

DIARRHOEA.

1. *Putrida* ^l). Exacerbantium, malignarum, febrium comes: deiectiones liquidissimae, nigricantes, fuscae, foetidissimae, putres, oleosae, vnde cita emaciatio et mors.

2. *Biliofa putrida*. Febrilis, comes synochi: symptomata vt in praecedenti. Praeuertitur emeticis.

LIENTERIA. COELIACA. HEPATIRRHOEA.

ASCITES. INTERCVS. SPLANCHNODES.

1. *Putridus* ^m). 2. *Biliosus putridus* ⁿ).

TYMPANITES. METEORISMVS.

a. Abdominalis.

1. *Putridus* ^o). Curatio eadem, ac enteritidis: abdomen frigida foueatur, suadente post HIPPOCRATEM TISSOTO.

2. *Biliosus putridus* ^p). Acutorum comes. Curatio eadem.

NEPHRITIS. NEPHRALGIA. VRETERITIS.

CYSTITIS. CYSTOSPASMVS. VRETHRITIS.

HAEMATVRIA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida* ^q).

PYVRIA. DIABETES. ENVRESIS.

DYSV-

k) DEGNER hist. dys. epid. bilios. §. 29. ZIMMERMANN p. 10. 369. SELLE p. 236. STOLL. III. 266 sq. 278 sq.

l) Colliquatiua RIVERII. SENNERTI atrophicorum IVNCKERI. synthexis DODON. p. 102.

m) RIGLER. 112.

n) FINKE p. 131.

o) RIGLER. p. 11. 90.

p) TISSOT. I. p. 115. Comm. Lips. XVI. 619. FINKE l. c. p. 152. rel.

q) FINKE l. c. p. 153.

DYSURIA.

- 1.
- Putrida*
- ^r
-).

ISCHURIA.

- 1.
- Putrida*
- ^s
-), 2.
- Biliofa putrida*
- ^t
-).
-
- α
- .
- Vesicalis*
- .
- β
- .
- Urethrica*
- .

DYSMETRORRHOEA.

- 1.
- Putrida*
- . 2.
- Biliofa putrida*
- ^u
-).

HYSTERALGIA.

- 1.
- Putrida*
- . 2.
- Biliofa putrida*
- . Vidi.

METRITIS.

- 1.
- Putrida*
- ^x
-). A placentae, fetus, aut capitis, retentione et corruptione. Synochus amphimerina, lipyria: lingua nigra, sicca, pulsus inaequalis, extremorum frigus.

 β . *Sphacelus uteri prolapsi* ^y). Extirpatio tolerata, superata.

METRORRHAGIA.

- 1.
- Putrida*
- . Vidi. 2.
- Biliofa putrida*
- ^z
-).

ABORTVS.

- 1.
- Putridus*
- .

- 2.
- Biliosus putridus*
- . Frequens in gravidis, morbo N. correptis.

COLPOSIS.

- 1.
- Putrida*
- ^a
-).

LEUCORRHOEA.

- 1.
- Putrida*
- . 2.
- Biliofa putrida*
- . Vidi.

NYMPHOMANIA.

STERILITAS. Temporaria, durante morbo.

HYDROMETRA. PHYSOMETRA.

GRAVIDITAS.

- 1.
- Putrida*
- .

2. *Bi-*^r) RIGLER. p. 88.^s) RIGLER p. 89.^t) FINKE l. c. p. 61.^u) FINKE l. c. 168.^x) SAUV. sp. 2.^y) Journ. de med. Nov. 1766.
p. 458^z) FINKE l. c. p. 154.^a) Comm. Lips. XVII. 56.

GRAVIDITAS.

2. *Biliofa putrida*. Anceps vtraque, abortus, partus praecox frequens.

β. *Simulata* ^{b)}).

PARTVS.

DYSTOCIA. Ex fetu mortuo, putrido.

DYSLOCHIA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida*. Vtraque occurrit.

PHYSCONIA. HERNIA.

PHIMOSIS PARAPHIMOSIS.

GONORRHOEA.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida*. Vidi.

SATYRIASIS. PRIAPISMVS.

IMPOTENTIA. AEDOEOPSOPHIA.

V. PASSIONES EXTREMORVM ET PERIPHERICAE.

MYOSITIS.

a. *Cephalica*. b. *Pleurodyne*.
c. *Spasma*. 2. *Biliofum putridum*. Vidi.
d. *Myocoilitis*.

LUMBAGO. 2. *Biliofa putrida*. Vidi.

RHEVMA.

1. *Putridum*.
2. *Biliofum putridum* ^{c)}). Post febrim die 2. aut 3. articuli manus aut pedis tuebant, vt phlegmatia simularetur, dein ephidrosis larga, cum dolore fixo, vago.

ISCHIAS.

1. *Putrida nervosa postica* ^{d)}).

PYDENDAGRA. PARONYCHIA.

OSTEOCOPVS. GONGRONA. MYOPALMVS.

TREMOR.

1. *Putridus* ^{e)}). Typhum carcerum ab initio praecedit, eandemque ab aliis distinguit, maxime si a phlebotomia superueniat delirium et summa asthenia.

CAR-

b) FINKE l. c. p. 168. 19.

c) FINKE l. c. p. 170 sq.

d) RIGLER p. 115.

e) PRINGLE p. — v. SWIETEN.
v. d. Krankh. d. Armees p. — SAUV.
sp. 19.

CARPHOLOGIA.

1. *Putrida*.2. *Biliosa putrida*. Vtraque non rara.

PANDICVLATIO. LASSITVDO.

STVPOR.

1. *Putridus*. 2. *Biliosus putridus* ^{f)}.

TARANTISMVS. BERIBERIA.

SCELOTYRBE. LORDOSIS.

CONTRACTVRA. CLAVDICATIO. ECTOPIA.

EXARTHREMA. DIASTASIS. LOXARTHVS.

INTVMESCENTIA. ANASARCA.

PHLEGMATIA.

1. *Putrida* ^{g)}.

PHYMATA.

PHLEGMONE.

1. *Putrida* ^{h)}. Videtur primo adspectu erysipelacea, parum tumida, tactu frigida, et veluti dura, sine elasticitate aut tensione, anodynia ad scalpellum, dein pustulae liuidae, pulsus minuuntur, mors.

EVBO.

1. *Putridus* ⁱ⁾ criticus.PAROTIS ^{k)}.

FVRVNCVLVS.

1. *Putridus* ^{l)}.ANTHRAX ^{m)} malum ardentium.

1. *Putridus* ⁿ⁾. Escharae siccae et nigrae "corruptio usque ad ossa, nisi suppuratio iuuat.

EXANTHEMATA.

ERYSIPELAS.

1. *Putridum* ^{o)}. Horror, aestus, delirium, virium prostrata-

f) FINKE l. c. p. 148.

g) RIGLER p. 111.

h) SAUV. II. 617. QUESNAY 2. 4. mortua, maligna.

i) SAUV. sp. 7. RIGLER p. 91.

k) RIGLER.

l) RIGLER catb. p. 92.

m) SAUV. II. 617.

n) RIGLER p. 93.

o) Pestilens FOREST. I. r. obs. 17. Schol. ignis sacer f. S. Antonii MEZERAY hist. de Francej 2. 1090. mal. des ardens en 1130. sous Louis VII. SENNERT. SYDENH. F. HOFFMANN n. 2. STOLL. III. 122.

ERYSIPELAS.

stratio, vehemens dorsi capitisque dolor, intra diem 3. v. 4. ad glandulas inguinales vel axillares materiae adurentes erumpunt, quae in igne sacro ad pedes usque descendunt. Haec materies in glandulis abscessum facit, et partibus extremis gangraenam inducit: quibusdam facies, aliis manus, pedes, exesa. Affinitatem cum peste habet.

β. *Putridum anginodeum* p). Tumoris corruptio putrida: cynanche, rel.

γ. *Macula lata* q). Erysipelas sub papilla et in cordis regione, vel etiam manibus, aliisque locis prodit, mox liuidum, atrum, cito letale.

δ. *A fetu mortuo* r). Erysipelas intra umbilicum et spinam ossis ilei sinistri cum amphimerina.

ε. *Gangraenodeum* s). Synochus, die 8. erysipelas colli, capitis, die 8. coma vigil, gangraena erysipel. Salus ab emet. cathart. vesicator. antiseptis.

ζ. *Biliosum putridum* t). Pyrexia, initio typhodes, dein biliosa, tritaeophya, amphimerina, hemitritaea, delirium, asthenia (summa), tertio die erumpit erysipelas faciei, vel humeri, brachii, colli, febris tum viuida, ardente: in nonnullis epistaxis, cynanche, dysphagia. In paroxysmo delirium, subsultus tendinum, dein deiectiones biliosae viridescences, etiam ascaridibus refertae, vrina tumida crassa. Salus ab emeticis et purg. et fudore foetido, viscido.

VARIOLA.

I. *Putrida.*

α. *Discreta, anomala, sanguinea.*

β. *Con-*

p) FOTHERGILL. l. c. praef. p. 5. et l. p. 33. HUXHAM III. 105. TISSOT. §.

q) F. PLATERI opp. t. 2. p. 23.

r) SAGAR sp. 2.

s) Journ. de med. Aout. 1767. p. 121.

t) Journ. de med. T. 7. p. 55 sq. T. 10. p. 449. t. 12. p. 354. SELLE p. 238. SAUV. sp. 2. FINKE l. c. p. 55.

VARIOLA.

β. *Confluens, anomala, nigra* u). Salus a purgantibus, sialagogis, acido vitrioli, cortice, camphora.

2. *Biliofa putrida* x). Interualla petechiae occupant: suppurant.

β. *Anomala miliaris* y).

γ. *Dysenteriodes* z).

3. *Putrida verminosa*. (BEYREIS d. de febr. et variol. vermin.) nullas cicatrices relinquit, non contagiosa est iis, qui iam sustinuerunt veram dictam.

VARICELLA.

RVBEOLA.

1. *Putrida anomala* a). Eruptio difficilis, ab humero et trunco incipiens, facile liuescens, angina (putrida). Flava, brunnea, laete rosea, obscure rubra, castanei coloris, liuida, rosea.

2. *Biliofa putrida* b).

SCARLATINA.

1. *Putrida* c). Eruptio lenta, color exanthematum purpureus vel liuidus, angina maligna.

2. *Biliofa putrida* d).

URTICARIA.

ESSERA.

MILIARIS.

1. *Putrida* e). Pustulae liuescentes cum ephidrosi oleosa, petechiae interspersae.

2. *Bi-*

u) FOREST. l. i. obs. 17. Schol. HVXHAM I p. 37. II. 58. 121. ELLER l. c. p. 136. 144. MEAD de var. p. 37. SCHROEDER de var. distrib. p. 34. SYDENH. l. 124. HELVETII sp. 3. p. 213. SELLE p. 190. SAUV. sp. 12.

x) HVXHAM II. 134. CLEGHORN p. 276. SELLE p. 237. FINKE l. c. p. 55.

y) HELVETII sp. 3. p. 204. SAUV. sp. 8.

z) SYDENHAM 2. 1670. l. p.

a) FOREST. l. i. obs. 17. HVX-

HAM. l. 216. 273. 277. 319. SAUV. l. 433. sp. i. 2. anom. STOLL. III 129.

b) QVARIN p. 103.

c) MORTON. pyr. ex. 3. c. 3. PLENCIZ in de WASSERB. op. T. 3. p.

d) BRVENING hist. const. epid. Essend. p. 28. FINKE l. c. p. 115 sq.

e) ELLER l. c. p. 115. STOERCK, l. 48. ALLION §. 105. 209. SCHVLZENHEIM Pr. v. Friesel. p. 18 sq. PRINGLE p. LVDWIG clin. inlt. n. 150. HVXHAM l. 82. SELLE p. 193. SAUV. l. 445. n. h). RIGLER p. 8.

MILIARIS.

2. *Biliofa putrida* ^f). Pustulae rubrae, raro albae, interdum petechiae.

PEMPHIGVS.

1. *Putridus* ^g).
2. *Biliosus putridus* ^h). Phlyctænae pellucidae, pallescentes, tenacem humorem profundentes.

APHTHA.

1. *Putrida* ⁱ). Fusca, liuida; cinericia et nigrescens.
2. *Biliofa putrida* ^k).

PETECHIAE.

1. *Putrida* ^l). Maculae purpureae, liuescentes; (pottissimum et fere omnes in pede RIGLER vidit).
2. *Biliofa putrida* ^m). (Leuamen a diarrhoea spontanea).

PESTIS.

1. *Putrida* ⁿ). Eruptio exanthematum pestis, maxime anthracum nigrescentium in gangraenam admodum pronorum.
2. *Biliofa putrida* ^o).

EFFLORESCENTIAE.

PHLYCTAENAE.

1. *Putridae* ^p).

PVSTV-

f) GLASS. comm. p. 98. BRVENING l. c. LVDWIG adv. t. 1. p. 1. p. 39. SELLE p. 238. Journ. de med. 1779 et Med. chir. Auszüge I. 98.

g) BONTIVS de med. Ind. obs. ult. MORTON pyr. app. p. 163. maligna VOGELII §. p. 116. SELLE p. 193. SAUV. sp. 4

h) FINKE l. c. p. 110 sq

i) VOGEL §. p. 119. SAUV. sp. 3. RIGLER p. 8.

k) HVXHAM I. 313.

l) LVDWIG inst. clin. n. 146. Adv. m. pr. vol. 1. p. 1. p. 33. IVNCKER . 72. pur. urata SENERTI l. 4. c. 11. RIVERII c. 1.

obs. 31. peticularis R. FORTIS. SAUV. sp. 2. STOLL. III. 122 Ast. Suec. XXVIII. 322. 326. RIGLER p. 8. 9.

m) STRACK l. c. cap. 6. 7. p. 133 sq. GLASS. l. c. p. 110. LVDWIG l. c. p. 38. HVXHAM febris nautica I. 134. Hist. morb. Vratish. 1700. p. 3. sq. BROCKELSBY p. 134. et praef. SELLE p. 239.

n) Traité de la peste p. 38. 250. 318 CHENOT. p. 64. SCHREIBER p. 41. de MERTENS p. SELLE p. 190.

o) SCHREIBER p. 10 sq. CHENOT. l. c.

p) LORRY de m. cut. p. 256.

PVSTVLAE. PAPVLAE. VARI.

EPINYCTIS. PSYDRACIA. HYDROA.

HERPES. IMPETIGO.

PSORA. (*Scabies* 9).

Scabie humida antea laborantes, in morbum *incipientes* putridum, & ab hoc resurgentes, ostendunt vesiculas crystallinas, admodum ardentes et prurientes, sensim in inflammationem abeuntes, et dein in vlcera magnam copiam puris fundentia: eruperunt per vniuersum corpus, facie ipsa non excepta, quae sensim in crustas ex viridi cineritias abierunt: cephalalgia, febris vespertina.

MACVLAE. LICHEN. PORRIGO.

VITILIGO. GVTTA ROSEA.

EPHELIS. ECCHYMOMA.

PHRICASMVS.

ARDOR.

1. *Putridus*. Epigenema. Calor non tantus, vt de eo conquerantur aegri, sed diutius tangentibus digitis molestus, vt sensum acrior et viuidior e profundo veluti exfurgat, atque aciculis quasi digiti pungantur.
2. *Biliosus putridus* ^r). Aestus sepi acrior, vrens, perdurans aliquamdiu in digitis tangentis,

PHLOGOSIS.

PRVRITVS. CELSA.

ADIAPNEVSTIA.

1. *Putrida*. Salus a balneis aut spontanea ephidrosi.

2. *Biliosa putrida* ^s).

EPHIDROSIS.

1. *Putrida*. 2. *Biliosa putrida*.

DYSODIA.

1. *Putrida*. Iam pluribus ante mortem diebus, instar cadaueris, aegroti saepe olent.

CACHEXIAE.

AVRI-

9) RIGLER p. 118.

r) SELLE p.

s) LENTIN. memor. p. 24.

MYRIGO.

1. *Putrida* ^t). Summa ad haemorrhagiam proclivitas.
2. *Biliofa putrida*. Vidi. *Critica* ^u).

MELASICTERVS. PHOENIGMVS.

CHLOROSIS.

PNEVMATOSIS. EMPHYSEMA ^x).

Ex febris putrida faciei et colli emphyf. foment. spir. camph.
et aceti cedens. Scorbutus sempiternus relictus.

ALOPECIA. OSTEOCACHEXIA.

ELCOSIS.

CANCER. CARCINOMA.

GANGRAENA.

1. *Putrida* ^y). Partis anodynia, emphysema intense rubrum vel coccineum, quasi erysipelatosum, mors post paucos dies. Cutis pressa stillat humorem sanguinolentum, ex scarificatione haemorrhagiae non coercibiles. In variolosa, per totum corpus diffusa, visa E. N. C. l. c.
- β. A contusione. ^z). Salus post phlebotomiam a temperantibus antiseptis.
- γ. A phlegmasia ^a). Salus post phlebotomiam ab antiseptis, emollientibus.
- δ. Ab ambustione ^b). Dolor atrox, erysipelas, pustulae, gangraena.
- ε. A gelu ^c). Dolor atrox, stupor, pallor, aridura partis, tumor oedematosus, motus impotentia, demum gangraena. Salus a constringentibus, stimulantibus, antiseptis, gelida, niue, rel.
- ζ. Spontanea ^d). A calore nimio et aëre humido, paludosis locis. Contractio partium spasmodica, febris

^t) HUXHAM T. 1. p. 158.

^u) Comoi. Lips. XVI. 618.

^x) Mel. obs. and inq. III. 33.
(a HUXHAM)

^y) QUESNAY c. 20. E. N. C. cent. 6. ... 8). SAUV. sp. 8

^z) QUESNAY c. 2. p. 1. SAUV. sp. 1.

^a) QUESNAY c. 4. SAUV. sp. 5.

^b) QUESNAY c. 16. SAUV. sp. 6.

^c) QUESNAY c. 18. Journ. de Med. Juin 1758. TISSOT. §. SAUV. sp. 7.

^d) Journ. de med. Oct. 1762 p. 327 Nov. 1762. p. 396. Dec. ibid. 404.

CACHEXIAE.

bris remittens, stupor, horror, membri, anodynia, pustulae, membrorum, potissimum inferiorum, gangraena, sphacelus, secessio. Salus ab antispasmi, antisepticiis.

NECROSIS.

1. *Putrida* ^e). Post dolores maximos extremorum tumidorum, carniū consumptio, ossium denudatio, partium, membrorum delapsus in subiectis pluribus. Causae, morbus latent.

β. *Scorbutica* ^f). Circa initium periodi tertiae morbi N. gingivae inflammabantur ad minimum ipsius linguae attactum sanguinem fundebant, stomadyfodia tanta, ut adstantes animo linquerentur, ichor perpetuo ex ore effluebat, corpusque hinc inde, praecipue in femoribus furisque, vlceribus liuidis obsessum erat, venae rariniae varicosae erant, dentes fere omnes excidebant, intra aliquot dies ossa maxillaria et palatum arrosa erant; lipothymiae frequentes erant.

2. *Biliofa putrida*.

VVLNVS.

MARCORES.

TABES.

1. *Putrida*. 2. *Biliofa putrida* ^g).

ATROPHIA.

e) Phil. Trans. VII. p. 523. 526.

g) FINKE l. c. p. 168.

f) RIGLER p. 94.

I N D E X.

NB. Numerus indicat paginam : *) Notas.

A.

- Abortus** 124.
Abcessus 198. ad nervos 32. max-
 teriales veterum 27. 33.
Abcissio aegritud. 28.
Abdominis passiones 112 sq.)
Accessio 22.
Acerbum 13.
Acida cacochymia 13.
Acme 22.
Actio GALENO quid 5.
Actiuae aegritud. 19.
Acutae aegritud. 20. 21.
Addephagia 114.
Adfecta pars 5.
Adfectus 5.
Adiapneustia 165.
Adiposa polysarcia 14.
Adipsia 114.
Adquisitae aegritud. 16.
Adscensus aegrid. 21.
Adstrictio 32.
Aduentitiae aegritud. 16.
Aedoeopsophia 128.
Aegritudo 1. 2. subiecta 6. 28. sy-
 stema 1.
Aegrotatio 28. subiecta 31 sq.
Aegilops 92.
Aetiologia 41.
Affinitas aegritudinum 1. 6.
Agalactia 98.
Ageustia 95.
Agalactatio v. Agalactia.
Agomphiasis 95.
Agrypnia 88.
Algor 163.
Alopecia 167.
Alphitidon. 11.
Alphus 162.
Alteratio 32.
Alysmus 111.
Amastesis 95.
Amaurosis 92.
Amblyopia 88.
Amblyosmus ib.
Amblytes ib.
Amentia 87.
Ammonizcalis cacochymia 14.
Amnesia 88.
Anabaticae aegritud. 21.
Anacatharsis 33. 100.
Anaesthesia 9. 68.
Anaimia 15. 180.
Anasarca 132.
Anastomosis 10.
Anatrope 114.
Anchilops 92.
Anchylomerisma 264.
Anchylosis 132.
Aneurysma 254 sq.
Angina 96. nasalis 97. pectoris 110 *)
 pharyngis 96. trachealis 96.
Angustia 10.
Anhelatio 110.
Anima 2. STAHLII 28.
Animus 2.
Anodynina 69.
Anomalae aegrit. 18.
Anorexia 114.
Anosmia 94.
Anthrax 133. 153.
Anxietas 111.
Apepsia 114.
Aphonia 96.
Aphthae 148.
Apnoea 111.
Apocenosia 71.
Apocope 28.
Apomyotosis 98 *)
Apoplexia 85.
Aposcemmata 27.
Aposcepses 27.
Apostema 199.
Apyrexia 70.
Aquositas 12. Aquosi morbi v. ca-
 tarrh.
Ardor 163.
Area 167.
Aridura 173.
Arthritis 230. 31.
Ascites 119.
Asphyxia 9. 68.
Assimilatio aegr. 31.
Asthena 68.
Asthma 110.
Atheroma 257.
Athymia 87.

INDEX.

Atonia 18. 68.
 Atra bilis 12. 225.
 Atrophia 173.
 Attenuatio 12.
 Attritio 11.
 Ausilio aegrit. 21.
 Augmentum aegrit. 21.
 Aurigo 165. v. icterus.

B.

Barycoia 93.
 Batrachus PAVLLI v. Ranula.
 Benignae aegrit. 18.
 Beriberia 132.
 Biliofa cacochymia 13.
 Bilis atra 12. 225.
 Blepharoptosis 265.
 Bradymastetis 95.
 Bradypepsia 114.
 Bradysuria 122.
 Breues aegrit. 20.
 Bronchocele 98.
 Bubo 133. 152.
 Bulimia 114.

C.

Cachexiae 165 sq. 205 sq.
 Cacochylia 14.
 Cacochymia 12. biliosa 13. can-
 crofa 14. ichorosa 13. nidorosa
 13. muriatica 14. oleosa 13. pu-
 trida 13. serosa 12. syphilitica
 14. venerea ib. vrinosa ib.
 Cacostia 114.
 Caecitas 92.
 Calculosa spissitudo 12. v. lithias.
 Caligo 88.
 Callositas 258.
 Caluities 167.
 Callus 22.
 Cancer 170 sq.
 Cancrofa cacochymia 14.
 Capitis passiones 85.
 Carbunculus 152.
 Carcinoma 172.
 Cardiacele 271.
 Cardialgia 114.
 Cardiognus 112.
 Carditis 111.
 Carebaria 88.
 Caries 33. 169.

Carphologia 131.
 Cartilago 258.
 Carus 85.
 Catagma 11.
 Catalepsis 8. 86.
 Cataphora 85.
 Cataracta 88 sq.
 Catarrheuma 203. biliosum 190.
 ferofum 204.
 Catarrhus 100. suffocativus 110*.
 Catarrhales morbi v. catarrheuma.
 Catastasis 17.
 Catharsis 22.
 Catochus 69.
 Causa aegritudinum 5. 41. ante-
 cedens 41. continens 40. inter-
 cedens 45. intermedia 45. occa-
 sionalis 42. per se agens 40. prae-
 disponens 40. proëgumena 41.
 prophasis 42. proxima 40. pri-
 ma 40. remotae 40. secundae 40.
 Causa morbi continens 44. dispo-
 sitio 47. formalis 44. 47. mate-
 rialis 44. 47. prophasis 47. pro-
 xima 44. 47.
 Causa passionum formalis 44. ma-
 terialis 44. proxima 44.
 Causa symptomatum formalis 44.
 materialis 44.
 Cedma 130.
 Celeres aegrit. 20.
 Celsa 165.
 Cephalaea 88.
 Cephalica (myositis) 132.
 Cephalitis 86.
 Cephalalgia 88.
 Ceratocoele 269.
 Cheilocace v. chilon.
 Chemosis 92.
 Chilon 94.
 Chirrhœuma 130.
 Chlorosis 167.
 Cholera 115.
 Chronicæ aegrit. 20.
 Cionis 97.
 Circuitus aegrit. 22.
 Claudicatio 132.
 Clauus 258.
 Coagulum 13.
 Coalitus 10. 11.
 Coctae aegrit. 28.
 Coctio 31.

INDEX.

Coeliaca 118.
 Cohæſionis aegrit. 6.
 Coindicantes aegrit. 36.
 Colica 115. pîctonum v. rachialgia.
 Collapsus. 10.
 Colli paſſiones 85 ſq.
 Colliquatio 12.
 Colpoptoſis 281.
 Colpoſis 125.
 Comitatae aegrit. 20.
 Complexae aegrit. 20.
 Complicatae aegrit. 20.
 Compoſitae aegrit. 20.
 Compreſſio 10.
 Concrementum 13.
 Condyloma 258.
 Conformatio vitioſa 11.
 Confuſae aegrit. 20.
 Congenitae aegrit. 16.
 Coniunctio 224.
 Conſecutiuae aegrit. 20.
 Conſtipatio 10.
 Conſtitutio aegrit. 19. epidem. v.
 epid.
 Contagioſae aegrit. 16. Contagium
 16. in diſtans ib. per contactum ib.
 Continentes aegrit. 22.
 Continuae aegrit. 22.
 Continui ſolutio 10.
 Contractilis vis aegrit. 8.
 Contractilitas 181.
 Contractio 10.
 Contractura 132.
 Contraſſura 11.
 Contritio 11.
 Convaleſcentiae tempus 28.
 Conuulſio 8. 68.
 Cophoſis 93.
 Copos 131.
 Cornua 251.
 Corpora GALENI 5.
 Correctio 32.
 Correpugnantes aegrit. 36.
 Corruptae aegrit. 19.
 Coryza 94.
 Crampus 130.
 Criſis 28. 33.
 Critici dies 33 ſq. motus 28.
 Crocidifinus 131.
 Crudae aegrit. 28
 Cruditas primarum viarum 14. v.
 Saburra.

Curatio 37.
 Cyananche 96. v. et angina.
 Cyſthaemorrhoids 121.
 Cyſtides 254.
 Cyſtitis 121. SABATIER 112.
 Cyſtocele 278.
 Cyſtoſpaſmus 121.

D.

Daemonomania 38.
 Debilitas 6.
 Declinatio aegrit. 22.
 Decrementum aegrit. 22.
 Decretorii dies 33.
 Delirium v. paraphroſyne.
 Detrimentofae aegrit. 16.
 Deuteropathicae aegrit. 16.
 Diabetes 122.
 Diabroſis 10.
 Diachalaſis 268.
 Diadexia 27.
 Diadeſche 27.
 Diaereſis 10.
 Diapedeſis 40.
 Diaphoreſis 32.
 Diaphragmitis (pleuritis) 102.
 Diaphthora 115.
 Diapnoe 32.
 Diarrhoea 118.
 Diaſteſis 132.
 Diatheſis 41.
 Dilatatio 10.
 Diplopia 89.
 Diſiunctio 11.
 Diſtorſio 132.
 Dolor 69.
 Durities 6.
 Dysarthritiſ 230.
 Dyscrasia 12. 205 ſq.
 Dyſecoea 93.
 Dyſenteria 118.
 Dyſthaemorrhoids 126.
 Dyſlochia 126.
 Dyſmetrorrhoea 125.
 Dyſodia 165.
 Dyſpepſia 114.
 Dyſphagia 97.
 Dyſphobia 88.
 Dyſphoria 111.
 Dyſpnoea 110.

Dyſto-

INDEX.

Dystocia 126.
Dystrophia 251.
Dysuria 122.

E.

Ecchymoma 163.
Ecchymosis 163.
Eclampsia 69.
Eclipsis 9. 179.
Ecstasis 8. 85.
Ectopia 11. 132. 267 sq.
Ectropium 269.
Efflorescentiae 159.
Elcosis 170.
Elephantiasis. Elephantia 216.
Emphraxis 10. 227 sq.
Emphysema 167.
Empyothorax 69.
Encephalocele 267.
Endemiae. Endemicae aegrit. 17.
Endemica constitutio 17.
Energia naturae 28.
Enormitas 11.
Enteremphraxis 229.
Enteritis 115.
Enterocoele 276.
Enuresis 32. 122.
Epacmaeicae aegrit. 22.
Ephelis 162.
Ephidrosis 165.
Epichoriae aegrit. 17.
Epigeneina 4.
Epigenesis aegrit. 27.
Epilepsia 69.
Epiphora 92.
Epiplocele 276.
Epiploitis 113.
Epistaxis 94.
Epulis 95.
Epyneitis 159.
Erethismus 8. 9. 178.
Erysipelas 132.
Erythema v. erysip.
Eflera 145.
Exacerbatio aegr. 22.
Exanthemata 133. sq. affinit. 154 sq.
Exarthrema 132.
Exarthrosis 132.
Excitatio 31.
Exerythron 162.

Exfoliatio 33.
Exocyste 279.
Exoneurosis 127.
Exophthalmia 92. 269.
Exquisitae aegrit. 18.
Exostosis 167.
Evacuatio 32.
Euryema 10.

F.

Fagitatio 131.
Facultas 87.
Faucium passiones 95 sq.
Febri 71. actiua ib. ardens 164.
causae ib. partialis 72. particularis ib. passiva 71. topica 72.
vniuersalis ib. Cf. tritaeam.
Finis aegrit. 22.
Firmitas insuperabilis 7.
Fissilitas 7.
Fissura 11.
Fixae aegrit. 17.
Flatulentia 114.
Flexilitas 7.
Fractura 11.
Fragilitas spongiosa 7. vicia GAY.
BII ib.
Frigus 163.
Fungus 252.
Furunculus 132.

G.

Galaetirrhoea 33. 98.
Ganglion 257.
Gangraena 172.
Gastremphraxis 229.
Gastritis 113 sq.
Gastrocele 276.
Gastrodynia 114.
Gelasmus 94.
Genitalium passiones 127.
Genuinae aegrit. 18.
Gibbositas 271.
Glaucoma 92.
Glossitis 95.
Glutinositas 12.
Gongrona 130.
Gonorrhoea 130.
Gonorrhoea 33. 127.

A a

Gra-

INDEX.

Gracilitas 7.
Grassantes aegrit. 16. grassatio ib.
Grauedo v. coryza.
Graues aegrit. 18.
Grauiditas 125.
Grumofitas. Grumus 13.
Gummi 167.

H.

Habituales aegrit. 19. *).
Haematemesis 116.
Haemathorax 110.
Haematuria 121.
Haemoptoe 107.
Haemoptysis 104 sq.
Haemorrhagia 33. 71.
Haemorrhoids 116.
Haereditariae aegrit. 15.
Haetica 81.
Hemeralopia 88.
Hemicrania 88.
Hemiplegia 67.
Hepatalgia 113.
Hepatempbraxis 227.
Hepatirrhoea 119.
Hepatitis 112.
Hepatocele 275.
Herniae 127. 272 sq.
Herpes 159.
Hieropyr 134.
Himantion. Himantosis. Himas 97.
Homotoniae aegrit. 21.
Horror 163.
Hydroa 159.
Hydrometra 125.
Hydrophobia 97.
Hydropici morbi v. catarrheuma.
Hygroma 257.
Hyperostosis 168.
Hypochondriasis 69.
Hyponychon 163.
Hypophthalmia 163.
Hypostaphyle 97.
Hysteralgia 123.
Hysteria 69.
Hysterocele 281.
Hysteroptosis 280.

I.

Iactatio 111.
Ichorola cacochymia 13.

Icterus 165.
Idiopathicae aegrit. 17.
Ileus 115.
Iliaca 115.
Impares dies 35.
Impetigo 161.
Impetus 32. 42.
Impotentia 128.
Inanitas 15.
Incrassatio 32.
Incrementum aegrit. 21.
Incubus 110.
Incurabiles aegrit. 19.
Indices dies 33 sq.
Indicata 37.
Indicantia 36.
Indicatio 37.
Inertia humorum 14. solidorum. 7.
Infarctus 71. cerebri 227. hepatis
ib. intestinorum 229. lienis 228.
mesenterii 229. pulmonum 227.
ventriculi 229. vteri ib.
Inflammatio 70. Cf. anginam, ce-
phalitidem, cynanchen, enteri-
tidem, gastritidem, hepatitidem,
metritidem, nephritidem, pan-
creatitidem, phrenitidem, pleu-
ritidem, pneumoniam, spleniti-
dem, rel.
Inflammatoria crusta 12. constitu-
tio ib.
Initium aegrit. 21.
Inquies 111.
Insanabiles aegrit. 19.
Insensibilitas 9.
Insidiosae aegrit. 19.
Insultus aegrit. 22.
Intercurrentes aegrit. SYDENH.
17.
Intercus 119.
Intermissio aegr. 22.
Intermittentes aegrit. 22.
Intertrigo 117.
Intumescencia 132.
Inuasio aegrit. 22.
Irregulares aegrit. 8.
Irritabilitas (aucta) 8. 181.
Irruptio aegrit. 21.
Ischias 129.
Ischuria 122 sq.
Iudicium aegrit. 22.

INDEX.

K.

Keneangia 15.

L.

Labrofulcium v. chilon.
Lactei morbi v. catarrh. et pleth.
Lagophthalmus 268.
Languor 180.
Laryngitis 96.
Lassitudo 131.
Laxitas 7.
Lentae aegrit. 20.
Lentor 12.
Lepra 213 sq.
Letales aegrit. 19.
Leuce 162.
Leucophlegmatia 132.
Leucorrhoea 125.
Lentis aegrit. 18.
Lichen 162.
Lienteria 118.
Lipoma 257.
Lithiasis 234 sq.
Longae aegrit. 20.
Lordosis 132.
Loxarthrus 132.
Lumbago 129.
Lupia 257.
Luxatio 132.

M.

Macies 15. 173.
Macropnoea 110.
Maculae 161.
Mador 165.
Magnae aegrit. 18.
Malignae aegrit. 18.
Mania 87.
Marasmus 173.
Marcor 173.
Mastodynia 98.
Maturatio 30.
Melaena 116.
Melancholia 87.
Melas 162.
Melasiæterus 165.
Melasma 163.
Meligeris 257.
Melioma 163.

Meningorrhoea 88.
Mesenteritis 115. et omentitis ib.
Metabola aegr. 27.
Metaptosis aegrit. 27.
Metaschematismus aegrit. 27.
Metastasis aegrit. 27.
Metathesis 32.
Meteorismus 120.
Metremphrax 229.
Metrocele 279.
Metroptosis 280.
Metrorrhagia 280.
Metritis 125.
Mictus cruentus 121.
Miliaris 145.
Mites aegrit. 18.
Mitificatio 30.
Morbi causae v. causae.

- deuropathici recentior. 4.
- differentiae accident. 48 sq.
- naturæ 4. 47.
- niger 116.
- sympathici recent. 4.
- symptomatistici recent. 4.

Morbilli v. rubcola.
Morphaea 162.
Mors 2. 173.
Mucositas 12.
Muriatica cacochymia 14.
Mutilatio 11.
Mutitas 96.
Mydriasis 89.
Myocœlitis 128.
Myopalmus 130.
Myopia 89.
Myolitis 70. species 101. 128.

N.

Naeuus 162.
Narium angustia v. rhinostegn.
Narium haemorrhagia v. rhinorrh.
et epistaxin. --- obstructio v. rhinostegnosin. --- pruritus v. rhinocresmus.
Nasalis cynanche v. angina 97.
Nasitis 94.
Nausea 114.
Necrosis 173.
Nephralgia 121.
Nephritis 120.
Neurosis 137.

INDEX.

Nidorosa caecochymia 13.
 Nostalgia 87.
 Nyctalopia HIPPOCR. 89. recent.
 88.
 Nymphomania 125.
 Nyctagnus 92.

O.

Obesitas 14.
 Obstipatio 117.
 Obtusitas 98.
 Obstructio 10. alui 117. ductus fa-
 lualis stenoniani v. stenostegn.
 Odontalgia 95.
 Odontitis 95.
 Oedema 133.
 Oligocholia 15.
 Oligochylia 15.
 Oligochymia 14.
 Omentitis 113.
 Ophiasis v. Alopecia.
 Ophthalmia 92.
 Ophthalmites 92.
 Opisthoronus 69.
 Orgasmus 15.
 Oscedo 98.
 Ossium mollities 168.
 Osteocachexia 167.
 Osteocopus 130.
 Osteopyr. 169.
 Osteosarcosis 168.
 Otalgia 93.
 Otitis 93.
 Otorrhagia 94.
 Otorrhoea 94.
 Oxycolia 93.
 Ozaena 94.

P.

Palindrome aegrit. 27.
 Palmus 8.
 Palpitatio 8.
 --- cordis 111.
 Panaritium 130.
 Pancreatitis 113.
 Pandemicæ aegrit. 16.
 Pandiculatio 131.
 Panophobia 81.
 Papulae 159.
 Paracasticæ aegrit. 22.

Paracusis 93.
 Paraglosse 95.
 Paralysis 9. 67. imperfecta auct. v.
 anaesth. et paret.
 Paraphimosis 127.
 Paraphonia 96.
 Paraphrenitis 86.
 Paraphrosyne 86.
 Paraplegia 9. 67.
 Pares dies 35.
 Paresis 9. 67.
 Paronychia 130.
 Parorchidium 282.
 Parotides 152.
 Parotitis 96.
 Paroxysmus 22.
 Particulares aegrit. 17.
 Partus 33. 125.
 Passio 5. 54.
 Pathema 5. 67.
 Pathologia 54.
 Pathos 5.
 Pemphigus 147.
 Pepasmus 30. 32.
 Pepsis 30. 31.
 Pericardina (pleur.) 102.
 Periculosa aegrit. 19.
 Periodicae aegrit. 23.
 Periodus aegrit. 23. 181.
 Peripneumonia 103.
 Peritonaeocele 127.
 Peritonitis 113.
 Perseuerantes aegrit. 19.
 Pertinaces aegrit. 19.
 Pestis 151.
 P. techiae 149.
 Pharyngitis 96.
 Phimosis 127.
 Phlegma 12.
 Phlegmasia 70. 73.
 Phlegmatia 132.
 Phlogistica crusta 12.
 Phlogisticus sanguis 12.
 Phlogosis 164.
 Phlyctænae 159.
 Phoenigimus 167.
 Phricasimus 163.
 Phrenitis 86.
 Phthisis v. species hepatophthoe.
 pneumophth. cer.
 Phyma 133.
 Physconia 126.

Physo-

INDEX.

Phryometra 125.
 Pica 114.
 Pityriasis 165.
 Pinnita 12. 205. gypsea 205. vitrea
 205. vsta et supra modum cocta
 12.
 Piritofitas 12.
 Plethora 14. 193. caelibatus 195.
 lactea 195. obesa 14. 195. polyai-
 mia 195. serosa 12. v. catarrh.
 Pleuriticum corium 12.
 Pleuritis 102.
 Pleurodyne 101. 128.
 Pleuroperipneumonia 103.
 Pleurorrhoea 110.
 Pleurospasmus 101.
 Plica Polonica v. Trichoma.
 Pneumatosis 167.
 Pneumomphraxis 227.
 Pneumocoele 271.
 Pneumonia 100.
 Pneumophthoe 108.
 Podorheuma 130.
 Polycholia 14.
 Polychylia 14.
 Polychymia 14.
 Polydipfia 114.
 Polypus 252. bronchiorum 253. cor-
 dis 253. intestinorum 253. va-
 ginae, vesicae, vrethrae 254. vte-
 ri ib.
 Polysarcia adiposa 14.
 Porrigo 162.
 Potentia nocens 43.
 Presbyopia 89.
 Priapismus 128.
 Primariae aegrit. 16.
 Primogeniae aegrit. 16.
 Principium aegrit. 21.
 Prisis 95.
 Procidentia 11.
 Proctalgia 117.
 Proctitis 117.
 Profluuium 71.
 Prophasia 43.
 Proptosis 11.
 Protopathicæ aegrit. 16.
 Pruritus 165.
 Psellismus 96.
 Psora, Psoriasis 161.
 Psudracia 159.
 Pterygodes 104.

Profis 268.
 Pryalifinus 33. 95.
 Purpura v. miliar. et petech.
 Purulenta cacochymia 12. mate-
 ria 13. v. pyogenia.
 Pus 13.
 Pustulae 159.
 Putredo 13. v. Sepsis.
 Putrida cacochymia 13.
 Pyogenia 197.11
 Pyorrhoea 33.
 Pyrexiae 70.
 Pyrosis 114.

Q.

Quartana v. tritaeam.
 Quotidiana v. tritaeam.

R.

Rabies 97.
 Rachialgia 115.
 Rachirheuma 130.
 Rachitis 168.
 Rancida cacochymia 13.
 Ranula 95.
 Rarefactio humorum 12.
 Reactio CVLLENI 28.
 Recidivæ aegrit. 23.
 Recurrentes aegrit. 23.
 Recursus aegr. 27.
 Refractariae aegrit. 19.
 Regulares aegrit. 18.
 Relaxatio 32.
 Remissio aegrit. 22.
 Remittentes aegrit. 22.
 Repletio 32.
 Resolutio humorum 12. 32.
 Restauratio 82.
 Retrogradæ aegrit. 17.
 Reuocatae aegrit. 23.
 Reuolutio aegrit. 27.
 Rhegma 10.
 Rheuma 129.
 Rheumatismus, acutus, calidus, fri-
 gidus 70. 128. 129.
 Rheumatici morbi v. catarrheuma.
 Rhexis 10.
 Rhinocresmus 94.
 Rhinorrhagia 94.
 Rhinostegnosis 94.

Rhoch-

INDEX.

Rhochmus 111. *).
 Rhooos 129.
 Rhus 129.
 Rhyfis ib.
 Rigiditas 7.
 Rigor 163.
 Ritus fardonius v. Gelasmus.
 Ronchus 111. *).
 Rosa 134.
 Rosacea gutta 162.
 Rubeola 140.
 Ruētus 1 4.
 Ruminatio 114.
 Ruptio 10.

S.

Saburra 14. 187. verminosa 191.
 Salutares aegrit. 19.
 Salius CAELII 8.
 Sanabiles aegrit. 19.
 Sarcoma 252.
 Satyriasis 127.
 Scabies 212. crustosa 162.
 Scarlatina 142.
 Scelotyrbe 132.
 Scirrhusa spissitudo 12.
 Scirrhus 133. 260 sq.
 Scorbutus 207 sq.
 Scrophulae 258 sq.
 Scrophulosa spissitudo 12.
 Secundariae aegrit. 16.
 Seminia aegr. 41. 42.
 Sensibilitas 9. 178.
 Sepsis 13. 182. biliosa 185. pituitata 186. simplex 184. vermin. 186.
 Serosi morbi v. catarrh.
 Serositas 12.
 Simplicēs aegrit. 20.
 Singultus 98.
 Solutio aegrit. 27.
 Somnambulismus 87.
 Sparganosis 98.
 Sparsae aegrit. 16.
 Spasma 128.
 Spasmus 8. 68.
 Sphacelus 173.
 Spina ventrosa v. teredo.
 Spiritus morbor. 43.
 Spissitudo 12.
 Splenemphraxis 228.
 Splenitis 113.

Splenocèle 275.
 Sporadicæ aegrit. 16.
 Staphyloma 270.
 Stationariae aegrit. SYDENH. 17.
 Status aegrit. 22.
 Steatoma 257.
 Stegnosis 264.
 Stenostegnosis 94.
 Stenothoraces 104.
 Sternutatio 98.
 Stertor 110.
 Stomacace 95.
 Stomadyfodia 95.
 Strabismus 93.
 Stupor artuum 132.
 Subfultus 8.

--- tendinum 131.

Successio aegrit. 27.
 Sucht 5.
 Sudor 165.
 Suffusio 89.
 Suppressae aegrit. 23.
 Suspirium 98.
 Symblepharosis 264.
 Sympathicae aegrit. 17.
 Symphisis 10.
 Symptoma 4. 59. GALENI in sensu latiori 1. insignia 4. synedre-
 uonta 4.
 Symptomaticae aegrit. 16.
 Syncope 9. 68.
 Syndrome 5.
 Synechia 264.
 Synicesis 10.
 Synisefis 264.
 Synocha 22. 81.
 Synochus 22. 81.
 Syphilis 217 sq.
 Syphilitica cacochymia 14.

T.

Tabes 173.
 Tabitudo solidorum 7.
 Tarantismus 132.
 Tardae aegrit. 20.
 Tempora aegrit. 21. intermedium,
 intercalar. 23. nascentis aegrit.
 21. conualescent. 28.
 Tenacitas 7. 12.
 Tenesmus 117.
 Teneritudo 7.
 Teredo 169.

Terren-

INDEX.

Terrentia morbi CELSI 21.

Tetanus 8. 69.

Thlipsis 10.

Thoracis passiones 98 sq.

Thrombus. Thrombosis 13.

Thymica (angina) 97.

Thymos 100.

Tonsillaris (angina) 97.

Tophi 250.

Tophus 167.

Topicae aegrit. 17.

Torpor 9. 179.

Trachealis (angina) 96.

Trachelophyma 98.

Transpositio 32.

Tremor 131

Tremos 8.

Trichiasis 269.

Trichoma 223.

Trismus 95.

Tritaea 76. amphimerina 81. Cathamerina 80. deminana 83. duplex 80. duplicata regularis 80. exquisita 79. Frigeraria 81. Helvetica 81. hemitritaea notha 80. vera 82. Humoraria 81. Notha 80. duplicata anomala 80. Quartana 82. Quintana 83. Quotidiana 80. Tardans 82. Terartaea 82. Tetartophya ib. Tritaeophya 81.

Tromos 8.

Tumor 11.

Tossis 98 sq.

Tympanites 119.

Typhomania 85.

Typhus 81.

Typus aegrit. 25 sq.

V.

Vagae aegrit. 17.

Vari 159.

Varicella 140.

Variola 135 sq.

Venerea cacochymia 14. lues 222.

Vermes. Verminosa saburra 191.

Verruca 257.

Vertigo 89.

Vesania 67.

Vibex. Vibices 163.

Vigor aegrit. 22.

Visciditas 12.

Visus passiones 88 sq.

Vitae vis in morbis superstes 28.

Vitalis vis 2.

Vitiligo 162.

Vniuersales aegrit. 17.

Vomituricio 114.

Vomitus 115. cruentus 116.

Vreteritis 121.

Vrethritis 121.

Vrinae viarum passiones 121 sq.

Viticaria 145.

Vteri retrouersio 279.

Vulnus 11. 173.

Z.

Zoster 134.

C O R R I G E N D A.

Pag. 39. lin. 18 chaſtraerum l. *characterum*. p. 70. l. 4. colore l. *calore*. p. 76. l. 6. haſtenus l. *huc uſque*. l. 14. adde: *Inſert ſtadia tria*. p. 77. l. vlt. quos l. *quos*. p. 82. l. 1. triatea. l. *tritaea*. p. 87. l. 2. adianeuſtia l. *adiapneuſtia*. p. 90. l. 10. diſtatina. l. *diſtantia*. l. 34. iridis te l. *iridis eſt*. p. 91. nota p) Haec l. *Hae*. p. 105. l. 12. oriuntur l. *oritur*. p. 111. l. 24. arteriae pulmonalis adde ramos ſ. l. *arterias pulmonales*. p. 115. l. 2. s. l. *os*. p. 119. l. 17. tympanitide l. *sympanite*. p. 123. l. 18. variae l. *verae*. p. 126. l. 28. albi l. *alui*. p. 128. l. 10. aedopſophia l. *aedaeopſophia*. p. 135. l. 12. eam l. *ea*. l. 19. tribuendae l. *tribuenda*. p. 139. l. 2. ab l. *ob*. l. 4. l. *qua magis*. p. 159. l. 20. l. *confertae pler. fugaces, non cohaerentes*. p. 169. l. 29. Osteorpyr l. *Osteopyr*. p. 171. l. 1. nullus ſit certus l. *nulla ſit certa*. p. 192. l. 28. inprimis l. *in primis*. p. 204. l. 5. l. *linguam mollem, non ſapientem, ſaliuam dulcem*. l. 22. aegro l. *aegre*. p. 205. l. 8. praeuia l. *praeuiio*. p. 238. l. 2. l. 2. *α*. p. 268. l. vlt. vel et l. *vel ob*. p. 287. l. 5. indicantur. l. *iudicantur*.

